



LABORATORIO LAMAR S.R.L.

Vademécum

Medicamentos veterinarios para perros y gatos · Septiembre 2026

Monteagudo 2113, San Fernando, Buenos Aires, Argentina · +54 11 4714-4423 / 4856
· www.laboratoriolamar.com

Productos de uso veterinario. La información de esta publicación está dirigida a profesionales; consulte siempre a su médico veterinario.

01 Antiinfecciosos

Antibióticos y antibacterianos de amplio espectro.

ANTIBIÓTICO

Amoxicilina

Perros y gatos

Comprimidos 100, 250 y 500 mg

Suspensión

DESCRIPCIÓN

Antibiótico bactericida derivado semisintético de la penicilina, de espectro ampliado y con mayor resistencia al jugo gástrico, mejor absorción intestinal y vida media mayor que la ampicilina. Estas características permiten un mayor intervalo entre dosis y la administración con la ración.

PRESENTACIÓN

Presentación en comprimidos de 100, 250 y 500mg o en suspensión extemporánea. Cajas de 10, 100 y 500 comprimidos o frasco para preparar 100ml.

INDICACIONES

Infecciones por microorganismos sensibles de los sistemas respiratorios, digestivo y genitourinario, huesos y articulaciones, piel y tejidos blandos. Preventivo de infecciones postquirúrgicas y traumáticas.

Su espectro de acción incluye los géneros Actinomices, Bacillus, Clostridium, Corinebacterium, Erysipelothrix, Leptospira, Listeria, Pasteurella, Streptococcus, Staphylococcus no resistentes a la penicilina, Proteus, Hemophilus, Salmonellas, Escherichia, Shigella, Klebsiella, Aerobacter y Borrelia. Posee efecto sinérgico con estreptomycin sobre Listeria, y con cefalosporinas contra Pseudomona.

ANTIBIÓTICO · CEFALEXINA

Celam

Perros y gatos

Comprimidos 500 y 1.000 mg

Suspensión

DESCRIPCIÓN

Es un antibiótico bactericida de amplio espectro, de la familia de los β -lactámicos, perteneciente al grupo de las cefalosporinas de 1º generación. Es activo contra un amplio rango de bacterias Gram + y Gram -. Es eficaz contra cepas de S aureus que son resistentes a la penicilina, amoxicilina o ampicilina. Es también activo contra la mayoría de las E. coli resistentes a amoxicilina. Su espectro de acción incluye la mayoría de los aislamientos de P. mirabilis, K. Pneumoniae; y anaerobios Pseudomona aeruginosa y Campylobacter spp.

PRESENTACIÓN

Presentación en comprimidos de 500 y 1.000mg o en suspensión extemporánea.

Celam 500mg viene en cajas de 8, 80 y 200 comprimidos.

Celam 1000mg viene en cajas de 4, 40 y 100 comprimidos.

Celam suspensión viene en frasco para preparar 50ml.

INDICACIONES

La cefalexina está indicada para el tratamiento de infecciones respiratorias, de las vías genitourinarias, gastrointestinales, huesos y articulaciones, tejidos blandos, heridas y de la piel y del conducto auditivo, especialmente cuando se trata de piodermitis resistentes a otros antibióticos o recidivantes.

ANTIBIÓTICO

Clindamicina

Perros y gatos

Comprimidos 110, 220 y 440 mg

DESCRIPCIÓN

Antibiótico semisintético del grupo de las lincosamidas. Inhibe la síntesis de proteínas de Gram positivos, anaerobios y micoplasmas, uniéndose a los ribosomas bacterianos. Es bacteriostático a dosis bajas, y bactericida en las concentraciones que alcanza en los tejidos cuando se administran dosis altas. Por su mecanismo de acción es de elección en las infecciones resistentes a β -lactámicos, cefalosporinas, tetraciclinas y sulfas potenciadas. Posee un gran volumen de distribución en piel y tejidos blandos, pulmones, bazo, hígado, próstata, útero y hueso, obteniéndose concentraciones varias veces superiores a las séricas; por lo que obtiene gran eficacia en infecciones localizadas; y permite su administración cada 12 horas.

PRESENTACIÓN

Presentación en comprimidos de 110, 220 y 440mg.

Cajas de 10, 100 y 500 comprimidos.

INDICACIONES

En caninos y felinos, para infecciones producidas por Gram positivos, anaerobios y micoplasmas. De primera elección en enfermedad periodontal, heridas infectadas, osteomielitis, abscesos, piodermitis profundas, etc. Antibiótico de alternativa en piodermias superficiales o resistentes a los antibióticos de primera elección, infecciones pulmonares, y otitis. Su espectro incluye los géneros Staphylococcus (incluso productores de β -lactamasa), Streptococcus, Actinomyces, Nocardia, Mycoplasma y Toxoplasma; y los anaerobios B. Fragillis, Fusobacterium, Peptoestreptococcus y Clostridium (con excepción de C. difficile).

QUIMIOTERÁPICO

Enrofloxacin

Perros y gatos

Comprimidos 50, 150 y 250 mg

DESCRIPCIÓN

Quimioterápico bactericida, eficaz sobre Gram negativos, Gram positivos, clamidias y micoplasmas, que actúa inhibiendo la ADN girasa bacteriana, mecanismo original que explica su utilidad en infecciones multi-resistentes a otros antimicrobianos como betalactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas y trimeto-prim/sulfas. Extremadamente activo contra microorganismos Gram negativos (E. coli, Klebsiella, Pasteurella, Enterobacter, P. mirabilis, Proteus, P. aeruginosa, Citrobacter y S. marcescens); Chlamidia, Haemophilus y Mycoplasma. De los Gram positivos, son sensibles la mayoría de los Corynebacterium y algunos Streptococcus

PRESENTACIÓN

Presentación en comprimidos de 50, 150 y 250mg.

Cajas de 12, 120 y 360 comprimidos (enrofloxacin 50mg).

Cajas de 10, 100 y 500 comprimidos (enrofloxacin 150 y 250mg).

INDICACIONES

En infecciones respiratorias, digestivas, génito-urinarias, osteoarticulares, de la piel, tejidos blandos y heridas y del conducto auditivo; especialmente aquéllas multi-resistentes a otros antibacterianos, o recurrentes.

ANTIBACTERIANO

Sulfatrim

Perros y gatos

Comprimidos

DESCRIPCIÓN

Combinación de sulfametoxazol y trimetoprim en relación 5:1, que actúa con sinergismo de potenciación, de efecto bactericida de amplio espectro que incluye Gram + como *Streptococcus* alfa y beta hemolíticos, *Enterococos*, *Staphylococos*, *Neumococos*, *Corynebacterium*; y Gram - como *Gonococos*, *Meningococos*, *Escherichia*, *Klebsiella*, *Brucella*, *Hemophyllus* y *Rickettsias*. Es además un eficaz coccidicida.

PRESENTACIÓN

Presentación en caja de 100 comprimidos.

INDICACIONES

Se indica para infecciones de riñón y vías urinarias, de la piel y respiratorias por agentes sensibles, e inespecíficas asociadas con el virus del Moquillo canino; y neumonías felinas producidas por *Hemophyllus* y *Rickettsias*. Parasitosis por coccidios.

ANTIBACTERIANO

Sulfatrim F

Perros y gatos

Comprimidos

DESCRIPCIÓN

Combinación de sulfametoxazol y trimetoprim en relación 5:1, que actúa con sinergismo de potenciación, de efecto bactericida de amplio espectro que incluye Gram + como *Streptococcus* alfa y beta hemolíticos, *Enterococos*, *Staphylococos*, *Neumococos*, *Corynebacterium*; y Gram - como *Gonococos*, *Meningococos*, *Escherichia*, *Klebsiella*, *Brucella*, *Hemophyllus* y *Rickettsias*. Es además un eficaz coccidicida.

PRESENTACIÓN

Presentación en cajas de 10, 100 y 500 comprimidos.

INDICACIONES

Se indica para infecciones de riñón y vías urinarias, de la piel y respiratorias por agentes sensibles, e inespecíficas asociadas con el virus del Moquillo canino; y neumonías felinas producidas por *Hemophyllus* y *Rickettsias*. Parasitosis por coccidios.

ANTIDIARREICO · COCCIDICIDA

Entero Sulfatrim

Perros y gatos

Suspensión

DESCRIPCIÓN

Suspensión antidiarreica adsorbente quimioterápica bactericida y coccidicida. El sulfametoxazol y el trimetoprim actúan con sinergismo de potenciación de efecto bactericida sobre las bacterias patógenas intestinales. El caolín tapiza la mucosa intestinal impidiendo su irritación y adsorbe las toxinas bacterianas.

PRESENTACIÓN

Presentación en frasco de 100ml.

INDICACIONES

Gastroenteritis en general, especialmente las de origen bacteriano, tóxico alimentario o por coccidios. En las de origen viral y parasitario, por su actividad paliativa sintomática y preventiva de las sobreinfecciones bacterianas.

02 Antiparasitarios

Control interno y externo: pulgas, garrapatas y helmintos.

PULGUICIDA · GARRAPATICIDA

Knock Out Perros

Perros

Pipetas

Multidosis

DESCRIPCIÓN

Es un potente garrapaticida, pulguicida, piojicida y repelente de moscas y mosquitos para perros formulado en base a 2 principios activos Imidacloprid y Permetrina. El imidacloprid es un pulguicida de gran poder de volteo. Elimina el 100% de las pulgas en 24 horas luego de aplicado. Posee una rápida y eficaz acción adulticida y larvicida lo que permite cortar el ciclo de vida, eliminándolas antes que comiencen a poner huevos. La permetrina posee un eficaz efecto garrapaticida (buen poder de volteo, excelentes acción residual y tendencia a la negatividad) sobre todos los estadios del ciclo (larva, ninfa, neogina, partenogina, teleogina y machos). Es un eficaz piojicida y posee muy bajo nivel dermatotóxico. Por su efecto repelente, el producto es preventivo de las infecciones transmitidas por mosquitos y moscas (dirofilariasis, leishmaniasis).

PRESENTACIÓN

Pipetas de 0,5 ml para perros hasta 4 kg, pipetas de 1 ml (perros de 4 a 10 kg), pipetas de 2,5 ml (perros de 10 a 25 kg), de 4 ml (perros de 25 a 40 kg) y de 6 ml (perros de 40 o más kg de peso).

DOSIFICACIÓN

Perros hasta 4 kg de peso: pipeta de 0,5 ml; de 4 a 10 kg: pipeta de 1 ml; de 10 a 25 kg: pipeta de 2,5 ml; de 25 a 40 kg: pipeta de 4 ml y de 40 kg o más: pipeta de 6 ml.

PULGUICIDA

Knock Out Gatos

Gatos

Pipetas

Multidosis

DESCRIPCIÓN

Es un potente pulguicida para gatos formulado en base a imidacloprid; que se aplica tópicamente sobre la piel. El imidacloprid se caracteriza por poseer un gran poder de volteo: los ensayos han demostrado que elimina el 98 % de las pulgas en las primeras 48 horas luego de aplicado; muy alta eficacia: 98 % 30 días después de tratamiento; con una excelente tasa de transición a la negatividad: 83% de los felinos tratados permanecen libres de pulgas 30 días después de la aplicación. Posee una rápida y eficaz acción adulticida y larvicida lo que permite cortar el ciclo de vida de las pulgas, eliminándolas antes que comiencen a poner huevos. Constituye una importante herramienta de control del *Dipylidium caninum*, parásito interno de perros y gatos, que es transmitido por las pulgas. Puede utilizarse en hembras preñadas y en lactación.

PRESENTACIÓN

Gatos hasta 4 kg: pipetas de 0,4 ml y de 4 a 8 kg: pipetas de 0,8 ml

DOSIFICACIÓN

Gatos hasta 4 kg de peso: una pipeta de 0,4 ml; Gatos de 4 a 8 kg de peso: una pipeta de 0,8 ml. Para prevenir la reinfestación de pulgas aplicar cada 30 días.

PULGUICIDA ORAL

Strong

Perros

Comprimidos 10, 20, 40 y 60

DESCRIPCIÓN

Pulguicida de administración oral para caninos, efectivo contra Ctenocephalides canis y ctenocephalides felis. El spinosad está compuesto por una mezcla de dos sustancias pertenecientes a la química de las lactonas. Cada componente, denominado ESPINOSINA A y ESPINOSINA D, es un éster tetracíclico insaturado con dos derivados de azúcares (forosamina y rhamnosa) unidos a través de uniones éteres.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIONES

Strong 10: Spinosad 300mg, excipientes c.s.p. un comprimido de 750mg.

Contiene un comprimido para perros que pesen de 5,1 a 10 kg de peso.

Strong 20: Spinosad 300mg, excipientes c.s.p. un comprimido de 750mg.

Contiene dos comprimidos para perros que pesen de 10,1 a 20 kg de peso.

Strong 40: Spinosad 300mg, excipientes c.s.p. un comprimido de 750mg.

Contiene cuatro comprimidos para perros que pesen de 20,1 a 40 kg de peso.

Strong 60: Spinosad 300mg, excipientes c.s.p. un comprimido de 750mg.

Contiene seis comprimidos para perros que pesen de 40,1 a 60 kg de peso.

DOSIFICACIÓN

30 a 60 mg por kg de peso de acuerdo a la indicación del veterinario. Recomendamos administrar la dosis mínima efectiva: 30mg/kg de peso, equivalente a 1 comp/10kg de peso de STRONG 10, 20, 40 o 60, excepto indicación en contrario del profesional.

ANTIHELMÍNTICO

Sin Par Perros

Perros

Comprimidos 10, 20, 40 y 60

DESCRIPCIÓN

Antihelmíntico de amplio espectro eficaz contra los nematodos, cestodes y giardias del canino. Combate los géneros Toxocara, Toxascaris, Uncinaria, Ancylostoma, Dipylidium, Taenia, Trichuris, Giardia; y al agente etiológico de la hidatidosis Echinococcus granulosus.

PRESENTACIÓN

SINPAR 10: Estuche individual x 2 comprimidos. Exhibidor con 10 estuches.

SINPAR 20: Estuche individual x 2 comprimidos. Exhibidor con 10 estuches.

SINPAR 40: Estuche individual x 4 comprimidos. Exhibidor con 10 estuches.

SINPAR 60: Estuche individual x 6 comprimidos. Exhibidor con 10 estuches.

DOSIFICACIÓN

SINPAR 10: Un comprimido de 300 mg cada 5 kg de peso, un solo día. En infestaciones por Giardia y Trichuris, debe realizarse la administración durante dos días consecutivos. Puede administrarse directamente o triturado y mezclado con el alimento.

SINPAR 20,40,60: Un comprimido de 600 mg cada 10 kg de peso, un solo día. En infestaciones por Giardia y Trichuris, debe realizarse la administración durante dos días consecutivos. Puede administrarse directamente o triturado y mezclado con el alimento.

ANTIHELMÍNTICO

Sin Par Gatos

Gatos Comprimidos

DESCRIPCIÓN	Antihelmítico de amplio espectro eficaz contra los nematodos y cestodes del felino. Combate los géneros Toxocara, Toxascaris, Uncinaria, Ancylostoma, Dipylidium, Taenia, Trichuris y Echinococcus.
PRESENTACIÓN	Estuche individual x 2 comprimidos. Exhibidor con 10 estuches.
DOSIFICACIÓN	Un comprimido cada 4 kg de peso, durante dos días. Puede administrarse directamente o triturado y mezclado con el alimento o un electuario como dulce de leche o queso crema.

CESTODICIDA

Praziquantel

Perros y gatos Comprimidos 50 y 100 mg

DESCRIPCIÓN	Antiparasitario cestodicida, eficaz contra todo los helmintos chatos de caninos y felinos, especialmente indicado en las campañas sanitarias contra la hidatidosis.
PRESENTACIÓN	Praziquantel 50mg: Cajas de 2, 20 y 200 comprimidos. Praziquantel 100mg: Cajas de 500 comprimidos.
INDICACIONES	Para eliminar parásitos del géneros Taenia, Dipylidium caninum y Echinococcus granulosus.

ANTIPARASITARIO · INMUNOESTIMULANTE

Levamisol

Perros y gatos Comprimidos

DESCRIPCIÓN	Antiparasitario interno contra vermes gastrointestinales (adultos y larvas) y contra microfilarias de D. immitis. Estimulante del sistema inmune: aumenta la producción y diferenciación de linfocitos T y macrófagos.
PRESENTACIÓN	Cajas de 10 y 100 comprimidos.
INDICACIONES	Parasitosis por los géneros Ancylostoma, Uncinaria, Toxocara, Toxascaris y Dirofilaria en caninos y felinos. Animales con inmunodeficiencia, tumores, infecciones crónicas y enfermedades inflamatorias.

ANTIPARASITARIO · INMUNOESTIMULANTE

Levamisol Gotas

- Perros y gatos
- Gotas

DESCRIPCIÓN	Antiparasitario interno contra vermes gastrointestinales (adultos y larvas) y contra microfilarias de D. immitis. Estimulante del sistema inmune: aumenta la producción y diferenciación de linfocitos T y macrófagos.
PRESENTACIÓN	Gotero conteniendo 15 ml. Pack exhibidor x 20 goteros.
INDICACIONES	Parasitosis por los géneros Ancylostoma, Uncinaria, Toxocara, Toxascaris y Dirofilaria en caninos y felinos. Animales con inmunodeficiencia, tumores, infecciones crónicas y enfermedades inflamatorias.

03 Antiinflamatorios y antialérgicos

Corticoides y antihistamínicos de uso clínico.

GLUCOCORTICOIDE

Prednisolona

Perros y gatos Comprimidos 10, 20 y 40 mg

DESCRIPCIÓN	Glucocorticoide antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor. Por su duración de actividad farmacológica media (aproximadamente 24 a 36 horas) es ideal para la terapéutica en días alternos, a fin de evitar la anulación del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal en afecciones subagudas y crónicas.
PRESENTACIÓN	Presentación en comprimidos de 10, 20 y 40mg. Cajas de 10, 200 y 500 comprimidos.
INDICACIONES	En caninos y felinos: cuando se requiera acción antialérgica, antiinflamatoria, o inmunosupresora. Alergias: dermatitis alérgica (a la picadura de pulgas, ato-pía, alimentaria, por hipersensibilidad bacteriana, reacciones a medicamentos), dermatitis por contacto, seborreica, granuloma eosinofílico, bronquitis, etc.; artritis, bursitis y tenosinovitis traumáticas. Enfermedades autoinmunes: lupus, pénfigo, artritis reumatoidea, púrpura. Oncología: tumores del sistema inmune y sarcomas en sus estadios terminales, para mejorar el apetito y la calidad de vida de los pacientes.

CORTICOIDE

Dexametasona

Perros y gatos Comprimidos 0,5 y 1 mg

DESCRIPCIÓN	Antiinflamatorio corticoide, muy eficaz en inflamaciones agudas, alergias y enfermedades autoinmunes.
PRESENTACIÓN	Dexametasona 0,5mg: cajas de 20, 100 y 500 comprimidos Dexametasona 1mg: cajas de 100 y 500 comprimidos.
INDICACIONES	inflamaciones, alergias y enfermedades autoinmunes en general de caninos y felinos. En estadios terminales de enfermedades oncológicas.

CORTICOIDE

Dexametasona Inyectable

Perros y gatos Inyectable

DESCRIPCIÓN	Antiinflamatorio corticoide, muy eficaz en inflamaciones agudas, alergias, enfermedades autoinmunes y shock en todas las especies y en trastornos metabólicos de los rumiantes.
PRESENTACIÓN	Envase conteniendo 2 frascos ampolla de 20 ml c/u.

INDICACIONES

Shock, inflamaciones, alergias y enfermedades autoinmunes en general de caninos, felinos, equinos y bovinos. Cetosis y otras alteraciones metabólicas de los vacunos. La solución inyectable puede ser usada vía SC, IM, EV, intraarticular, intrasinovial, etc.

ANTIISTAMÍNICO

Hidroxicina

Perros y gatos

Comprimidos 50 mg

DESCRIPCIÓN

La hidroxicina es un antihistamínico piperacínico moderno, indicado especialmente para dermatitis alérgicas (a las pulgas, por contacto, atopía, prurito, etc.) pero también eficaz en todos los otros fenómenos en que se requiere acción antihistamínica. Inhibe tanto los fenómenos de hipersensibilidad inmediata, como los producidos a las 24 horas de la acción del alérgeno. Una cuarta parte de todos los casos de dermatitis alérgica que se presentan en el consultorio, se pueden tratar eficazmente con hidroxicina sola, sin glucocorticoides. En caso contrario, la utilización de la combinación hidroxicina/glucocorticoides permitirá disminuir la dosis de éstos, con consecuentes menores efectos secundarios.

PRESENTACIÓN

Presentación en cajas de 30, 150 y 600 comprimidos.

Cajas de 30, 150, y 600 comprimidos.

DOSIFICACIÓN

Si bien la dosis es variable de acuerdo al individuo y a la causa, la orientativa es de: 2 mg/kg/8 horas. El rango es de 1 a 3 mg/kg/8 horas. El tratamiento debe mantenerse mientras persista la causa, y la dosis ajustarse a la menor que permita controlar los síntomas. Debe intentarse eliminar la causa de la alergia.

04 Endocrinología y reproducción

Hormona tiroidea y control del celo.

HORMONA TIROIDEA

T4

Perros y gatos Comprimidos 0,3 mg

DESCRIPCIÓN	Hormona tiroidea obtenida por síntesis, idéntica a la natural. Aminoácido modificado e iodado indicando para el tratamiento de substitución en el hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Al ser obtenido por síntesis química y no por extracción de glándulas bovinas, se asegura su pureza, cantidad y actividad farmacológica homogénea en los comprimidos de las distintas partidas.
PRESENTACIÓN	Levotiroxina 0,3 mg/comprimido. Cajas de 10, 100 y 500 comprimidos.
INDICACIONES	Hipotiroidismo primario, secundario y terciario. En algunos tumores tiroideos, para suprimir la estimulación debida a tirotrófina y factor liberador hipotalámico de tirotrófina.

HORMONA TIROIDEA

T4 F

Perros y gatos Comprimidos 0,9 mg

DESCRIPCIÓN	Hormona tiroidea obtenida por síntesis, idéntica a la natural. Aminoácido modificado e iodado indicando para el tratamiento de substitución en el hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Al ser obtenido por síntesis química y no por extracción de glándulas bovinas, se asegura su pureza, cantidad y actividad farmacológica homogénea en los comprimidos de las distintas partidas.
PRESENTACIÓN	Levotiroxina 0,9 mg/comprimido. Cajas de 10, 100 y 500 comprimidos.
INDICACIONES	Hipotiroidismo primario, secundario y terciario. En algunos tumores tiroideos, para suprimir la estimulación debida a tirotrófina y factor liberador hipotalámico de tirotrófina.

INHIBIDOR DEL CELO

Clormadinona

Perros y gatos Comprimidos 2 y 4 mg

DESCRIPCIÓN	Hormona sintética de estructura y actividad similar a la progesterona, de mayor potencia y actividad por vía bucal que ésta. Eficaz inhibidor del celo y anticonceptvo para perras y gatas, modificador de la conducta en machos, de utilidad en otros procesos patológicos en hembras y machos.
PRESENTACIÓN	Presentación en comprimidos de 2 Y 4mg. Cajas de 100, 500 Y 1.000 comprimidos.

INDICACIONES

Posposición o prevención del estro. Interrupción o supresión del estro. Abortos repetidos no infecciosos. Metrorragia postparto. Hipersexualidad, agresividad. Hiperplasia de próstata y glándulas anales. Automutlación, dermatitis por lamido, prurito. Formas leves de elepsia. Excesivo acicalamiento.

INHIBIDOR DEL CELO

Megestrol Perras

Perros

Comprimidos

DESCRIPCIÓN

Hormona sintética de estructura y actividad similar a la progesterona, de mayor potencia y actividad que ésta. Eficaz inhibidor del celo y la ovulación para perras y gatas. Modificador de la conducta en machos agresivos.

PRESENTACIÓN

Cajas de 8, 80 Y 400 comprimidos.

INDICACIONES

Como inhibitorio del celo y ovulación, para interrumpir (suprimir) el celo ya manifiesto de una hembra o para prevenir (impedir) la aparición del celo. Como modulador de la conducta, para disminuir la agresividad de los machos debidas a territorialidad, y los destrozos causados por ansiedad. En el granuloma prurítico acral felino, por su doble acción sedante y antiinflamatoria. En hiperplasia/hipertrofia de las glándulas anexas del sistema reproductor del macho.

INHIBIDOR DEL CELO

Megestrol Gatas y Razas Toy

Gatos

Comprimidos

DESCRIPCIÓN

Hormona sintética de estructura y actividad similar a la progesterona, de mayor potencia y actividad que ésta. Eficaz inhibidor del celo y la ovulación para gatas y perras de razas toy. Modificador de la conducta en machos agresivos.

PRESENTACIÓN

Cajas de 8 y 80 comprimidos.

INDICACIONES

Como inhibitorio del celo y ovulación, para interrumpir (suprimir) el celo ya manifiesto de una hembra o para prevenir (impedir) la aparición del celo. Como modulador de la conducta, para disminuir la agresividad de los machos debidas a territorialidad, y los destrozos causados por ansiedad. En el granuloma prurítico acral felino, por su doble acción sedante y antiinflamatoria. En hiperplasia/hipertrofia de las glándulas anexas del sistema reproductor del macho.

05 Sistema nervioso

Tranquilizantes, preanestésicos y anticonvulsivantes.

TRANQUILIZANTE · ANTICONVULSIVANTE

Diazepan

Perros y gatos

Injectable

DESCRIPCIÓN

Tranquilizante, miorrelajante, preanestésico y anticonvulsivante en solución al 5/1000. Actúa deprimiendo el SNC sobre la formación reticular del tallo cerebral, sistema límbico, la corteza, y la médula espinal (en su acción miorrelajante). Posee un altísimo índice terapéutico y está prácticamente libre de efectos adversos. Es la droga de primera elección para los ataques convulsivos en el perro, y para la medicación preanestésica en animales viejos o con trastornos cardíacos o renales.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 2 frascos ampolla de 10 ml c/u.

DOSIFICACIÓN

Como tranquilizante: en perros: 0,5-2 mg/kg, SC, IM o EV; en felinos: 2 mg/kg, SC, IM o EV; en ovinos, caprinos y bovinos: 0,5-1,5 mg/kg, IM o EV. Como preanestésico y relajante muscular en felinos y caninos: 0,2-0,6 mg/kg, SC, IM o EV; en equinos: 0,02-0,1 mg/kg. IM o EV. Como potenciador de anestesia ya instaurada en perros: 0,5-2 mg total EV. Como anticonvulsivante en caninos: 10 mg EV. Si no hay mejoría repetir c/2 minutos, hasta efecto. En felinos: 10 mg vía EV; si no hay mejoría repetir hasta 20 mg totales. En aquéllos pacientes que están en tratamiento ambulatorio, en caso de desencadenarse una crisis, puede instruirse al propietario para que administre 2 ml totales vía rectal, mientras espera el arribo del médico veterinario.

TRANQUILIZANTE · ANTIEMÉTICO

Sedagotas

Perros y gatos

Gotas

DESCRIPCIÓN

Tranquilizante fenotiacínico. La droga más utilizada en sedación de perros y gatos. Antiemético anticinetótico.

PRESENTACIÓN

Gotero conteniendo 10 ml. Pack exhibidor por 24 goteros.

INDICACIONES

Tranquilizante preventivo de estados de stress, como viajes en automóvil, ausencia del propietario, tormentas eléctricas, detonaciones de fin de año, etc. Para permitir maniobras semiológicas o tratamientos en animales timoratos, agresivos o que no responden a las indicaciones del propietario. Para inhibir la excitación, la exploración y el marcaje territorial debido a la sexualidad. Antiemético de acción central y anticinetótico, ideal para impedir los vómitos producidos por el movimiento del automóvil. Como preanestésico, especialmente cuando la agresividad del paciente impide la administración inyectable.

06 Aparato digestivo

Antieméticos, antidiarreicos y laxantes.

ANTIEMÉTICO

Metoclopramida Gotas

Perros y gatos

Gotas

DESCRIPCIÓN

Antiemético y modulador de la motilidad intestinal, en solución oral. Estimula el vaciamiento fisiológico del estómago y las contracciones peristálticas del intestino normalizando el funcionamiento de los esfínteres, tanto en casos de constipación como de enteritis.

PRESENTACIÓN

Gotero conteniendo 15 ml. Pack exhibidor x 20 goteros.

INDICACIONES

Vómitos y náuseas de cualquier etiología debido a su efecto antiemético de acción central y periférico sobre estómago, píloro, duodeno e íleon. En casos de constipación por falta de estimulación motriz (íleo paralítico) y en las diarreas compensatorias posteriores a estos cuadros por su actividad normocinética estimulante del peristaltismo gástrico e intestinal. En todas las cirugías del sistema digestivo, tanto antes como después y en casos en que se utilizan fármacos que producen náuseas (citostáticos). Náuseas y vómitos asociados con patologías estimulantes de la zona quimiorreceptora gatillo (insuficiencia renal, diabetes, quimioterápicos, etc.).

ANTIEMÉTICO

Metoclopramida Inyectable

Perros y gatos

Inyectable

DESCRIPCIÓN

Antiemético y modulador de la motilidad intestinal, en solución oral. Estimula el vaciamiento fisiológico del estómago y las contracciones peristálticas del intestino normalizando el funcionamiento de los esfínteres, tanto en casos de constipación como de enteritis.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla de 50 ml.

INDICACIONES

Vómitos y náuseas de cualquier etiología debido a su efecto antiemético de acción central y periférico sobre estómago, píloro, duodeno e íleon. En casos de constipación por falta de estimulación motriz (íleo paralítico) y en las diarreas compensatorias posteriores a estos cuadros por su actividad normocinética estimulante del peristaltismo gástrico e intestinal. En todas las cirugías del sistema digestivo, tanto antes como después y en casos en que se utilizan fármacos que producen náuseas (citostáticos). Náuseas y vómitos asociados con patologías estimulantes de la zona quimiorreceptora gatillo (insuficiencia renal, diabetes, quimioterápicos, etc.).

LAXANTE · LUBRICANTE

Vaselina Líquida

- Perros y gatos
- Frasco

DESCRIPCIÓN	Laxante emoliente, lubricante y reblandecedor de la masa fecal, que permite la eliminación de heces blandas, sin producir diarreas. Lubrificante obstétrico: facilita las maniobras semiológicas o de asistencia en distocias.
PRESENTACIÓN	Frasco conteniendo 125 ml.
INDICACIONES	Constipación por causas nutricionales, digestivas, y de inflamación de glándulas que interfieren con la defecación en todas las especies. En distocias y maniobras obstétricas, como lubricante.

07 Aparato respiratorio

Expectorantes y fluidificantes bronquiales.

EXPECTORANTE

Bronco Tos

- Perros y gatos
- Jarabe

DESCRIPCIÓN	Formulación clásica eficaz como antiséptico bronquial, expectorante, balsámico y fluidificante de las secreciones. Posee un efecto resolutivo y coadyuvante de la acción de los antibióticos.
PRESENTACIÓN	Frasco conteniendo 100 ml.
INDICACIONES	Infecciones e inflamaciones agudas de los bronquios como las originadas por los agentes del complejo respiratorio canino, o resfrío y gripe de los monos. En el tratamiento sintomático de las bronquitis crónicas como las producidas por la insuficiencia cardíaca congestiva, las de origen alérgico o del “perro fumador”, etc.

EXPECTORANTE

Bronco Tos Forte

- Perros y gatos
- Jarabe

DESCRIPCIÓN	Formulación clásica eficaz como antiséptico bronquial, expectorante, balsámico y fluidificante de las secreciones. Posee un efecto resolutivo y coadyuvante de la acción de los antibióticos.
PRESENTACIÓN	Frasco conteniendo 100 ml.
INDICACIONES	Infecciones e inflamaciones agudas de los bronquios como las originadas por los agentes del complejo respiratorio canino, o resfrío y gripe de los monos. En el tratamiento sintomático de las bronquitis crónicas como las producidas por la insuficiencia cardíaca congestiva, las de origen alérgico o del “perro fumador”, etc.

08 Dermatología y soporte

Antimicóticos y soluciones parenterales.

ANTIMICÓTICO

Griseofulvina

- Perros y gatos
- Comprimidos 250 mg

DESCRIPCIÓN	Antimicótico de elección en tiñas y onicomicosis, con una cantidad de principio activo por comprimido de acuerdo a las altas dosificaciones recomendadas actual-mente.
PRESENTACIÓN	Presentación en cajas de 20, 100 y 500 comprimidos.
INDICACIONES	Dermatofitosis (tiñas) u onicomicosis debidas a Microsporum canis, M. gypseum y Trichophyton mentagrophytes.

ENERGIZANTE · DIURÉTICO

Glucosa Hipertónica

- Perros y gatos
- Inyectable

DESCRIPCIÓN	Solución de glucosa hipertónica al 25 % para administración endovenosa, que produce diuresis osmótica, protege al hepatocito y aporta energías.
PRESENTACIÓN	Frasco ampolla de 50 ml.
INDICACIONES	En los casos en que se requiere diuresis osmótica (edemas, insuficiencia renal aguda luego de la hidratación, insuficiencia cardíaca congestiva, traumatismos del SNC). Insuficiencia hepática. Acidosis metabólica (asociada con insulina). Desnutrición, caquexia, en animales con absorción intestinal disminuida o imposibilitados de nutrirse.