

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

---

**Лабораторна робота №1 з курсу “Чисельні методи  
математичної фізики”:**

**“Розв’язання граничної задачі методом  
безпосередньої заміни диференціальних похідних  
частковими”**

---

*Студент 4-го курсу  
групи ОМ  
Чан Ха Ву*

*Викладач:  
к.ф.-м.н., доцент  
Риженко А. І.*

Київ, 01 січня 2017

## 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Методом безпосередньої заміни диференціальних похідних частковими знайти розв'язок граничної задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку

$$-\frac{d}{dx} \left( k(x) \frac{du}{dx} \right) + p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u = f(x), \quad a < x < b \quad (1.1)$$

з наступними крайовими умовами третього роду

$$\begin{aligned} -k(x) \frac{d}{dx} u(x) + \alpha_1 u(x) &= \mu_1(x), \quad x = a \\ k(x) \frac{d}{dx} u(x) + \alpha_2 u(x) &= \mu_2(x), \quad x = b \end{aligned} \quad (1.2)$$

де  $\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$ . Треба побудувати графік для наближеного розв'язку та апроксимізації. Порівняти з точним (аналітичним) розв'язком.

## 2 ТОЧНИЙ РОЗВ'ЯЗОК

При наступному вигляді функції  $k, p$  та  $q$ :

$$\begin{aligned} k(x) &= k_1 \cos(k_2 x) + k_3, \quad k(x) > 0 \\ p(x) &= p_1 \sin(p_2 x) + p_3, \quad p(x) > 0 \\ q(x) &= q_1 \cos(q_2 x) + q_3, \quad q(x) > 0 \end{aligned} \quad (2.1)$$

Нехай функція  $f$  набуває наступний вигляд:

$$\begin{aligned} f(x) &= k_1 k_2 m_1 m_2 \cos(m_2 x) \sin(k_2 x) + m_1 m_2^2 (k_1 \cos(k_2 x) + k_3) \sin(m_2 x) + \\ &\quad + p_1 m_1 m_2 \cos(m_2 x) \sin(p_2 x) + p_3 m_1 m_2 \cos(m_2 x) \end{aligned} \quad (2.2)$$

та нехай коефіцієнти  $\mu_1, \mu_2$  дорівнюють

$$\begin{aligned} \mu_1 &= k(x) \frac{d}{dx} (m_1 \sin(m_2 x) + m_3 \cos(m_4 x) + m_5)(a) - \\ &\quad - \alpha_1 (m_1 \sin(m_2 a) + m_3 \cos(m_4 a) + m_5) \\ \mu_2 &= -k(x) \frac{d}{dx} (m_1 \sin(m_2 x) + m_3 \cos(m_4 x) + m_5)(b) - \\ &\quad - \alpha_2 (m_1 \sin(m_2 b) + m_3 \cos(m_4 b) + m_5) \end{aligned} \quad (2.3)$$

У такому випадку, точний (аналітичний) розв'язок задачі (1.1) набуває наступний вигляд:

$$u(x) = m_1 \sin(m_2 x) + m_3 \cos(m_4 x) + m_5 \quad (2.4)$$

### 3 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

На відрізку  $[a, b]$  введемо рівномірну сітку  $\bar{\omega}_h = \{x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n\}$  з шагом  $h = (b - a)/n$ . Назвемо цю сітку основною. Розв'язок задачі (1.1) з крайовими умовами (1.2), функціональні коефіцієнти та крайові значення яких набувають вигляд (2.1), (2.2) та (2.3), будемо шукати у вигляді сіткової функції  $y_i = y(x_i)$ , заданої на точках сітки  $\bar{\omega}_h$ .

#### 3.1 АПРОКСИМАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ РІЗНИЦЕВИМ

Позначимо через  $k_i, p_i, q_i, f_i$  значення функції  $k(x), p(x), q(x), f(x)$  у точках  $x_i$  однорідної сітки  $\bar{\omega}_h$ . Замінімо похідні в рівняння (1.1) скінченно-різницеви виразами:

$$(k_{i+\frac{1}{2}} y_{\bar{x},i})_{x,i} + p_i y_x^o + q_i y_i = f_i \quad (3.1)$$

або, у розгорнутому вигляді

$$- \left( k_{i+\frac{1}{2}} \frac{y_{i+1} - y_i}{h^2} - k_{i-\frac{1}{2}} \frac{y_i - y_{i-1}}{h^2} \right) + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i \quad (3.2)$$

де  $k_{i+\frac{1}{2}} = k(x_i + \frac{h}{2})$  та  $i = 1, 2, \dots, n-1$ . Перегрупуємо коефіцієнти при змінних  $y_0, y_1, \dots, y_n$  та запишемо рівняння (3.2) у вигляді:

$$A_i y_{i-1} + B_i y_i + C_i y_{i+1} = G_i, i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.3)$$

звідси

$$A_i = -k_{i+\frac{1}{2}} - \frac{h}{2} p_i, \quad B_i = k_{i+\frac{1}{2}} + k_{i-\frac{1}{2}} + h^2 q_i, \quad C_i = -k_{i+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} p_i. \quad (3.4)$$

Нескладно переконатись, що така різницєва схема апроксимує задачу (1.1) з похибкою другого порядку  $O(h^2)$ . Також, можна показати що схема збігається до точного розв'язку у класі гладких функції коефіцієнтів. Ідея для доведення цього факту можна знайти у [2, с. 106–108].

#### 3.2 АПРОКСИМАЦІЯ КРАЙОВИХ УМОВ

Помітимо, що у рівнянні (3.4) не вистачає два відношення для пошуку розв'язку  $y_i = y(x_i)$ . Ці відношення можна задати, апроксимуючи крайові умови (1.2). Розглянемо дві різницєві схеми для цих умов.

Явна схема апроксимування умов (1.2) виглядає наступним чином:

$$-k_0 y_{x,0} + \alpha_1 y_0 = \mu_1, \quad k_n y_{\bar{x},n} + \alpha_2 y_n = \mu_2 \quad (3.5)$$

або, у розгорнутому вигляді

$$-k_0 \frac{y_1 - y_0}{h} + \alpha_1 y_0 = \mu_1, \quad k_n \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + \alpha_2 y_n = \mu_2 \quad (3.6)$$

Використані скінченно-різницеві відношення для апроксимації похідних (3.5) забезпечує нам тільки перший порядок апроксимації відносно шага  $h$  рівномірної сітки  $\bar{\omega}_h$ . Відповідно, загальний порядок апроксимації диференціальної задачі (1.1), (1.2) за допомогою різницевих схем (3.2), (3.6) – перший, тобто  $O(h)$ .

Запишемо (3.6) у вигляді:

$$-B_0 y_0 + C_0 y_1 = G_0, \quad A_n y_{n-1} - B_n y_n = G_n. \quad (3.7)$$

Отже, об'єднуючи (3.3) та (3.9) отримуємо лінійну систему рівнянь у вигляді:

$$\begin{bmatrix} G_0 \\ G_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ G_{n-1} \\ G_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_0 & C_0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ A_1 & B_1 & C_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & B_2 & C_2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & A_{n-1} & B_{n-1} & C_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & A_n & B_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Побудуємо різницеву схему для апроксимації крайових умов (1.2) без підвищення щільності сітки  $\bar{\omega}_h$  (тобто без зменшення шагу  $h$ ). Розглянемо таку схему:

$$\begin{aligned} -k_{\frac{1}{2}} \frac{y_{\frac{1}{2}} - y_{-\frac{1}{2}}}{h} + \alpha_1 \frac{y_{\frac{1}{2}} - y_{-\frac{1}{2}}}{2} &= \mu_1, \\ k_{n-\frac{1}{2}} \frac{y_{n+\frac{1}{2}} - y_{n-\frac{1}{2}}}{h} + \alpha_1 \frac{y_{n+\frac{1}{2}} - y_{n-\frac{1}{2}}}{2} &= \mu_2. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Можна розглянути цю схему як різницева схема на розширенній сітки  $\bar{\omega}'_h = \{x = x_i, x_i = a - \frac{h}{2} + ih, i = 0, 1, \dots, n+1\}$ . Легко довести, що така схема має другий порядок апроксимації, тобто  $O(h^2)$ . Ідея для доведення цього факту можна знайти у [2, с. 148–149].

### 3.3 МЕТОД ПРОГОНКИ

Для розв'язання тридіагональних систем використовується метод прогонки, який працює за  $O(N)$ , де  $N$  – розмір матриці. Розв'язок системи шукається у вигляді

$$y_i = s_i + y_{i+1} + t_i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (3.10)$$

Коефіцієнти  $s_i$  та  $t_i$  шукається наступним чином. З системи (3.8) можна побачити, що

$$s_0 = \frac{C_0}{B_0}, \quad t_0 = \frac{-G_0}{B_0}. \quad (3.11)$$

Підставимо  $y_{i-1}$  у  $i$ -му рівнянні системи:

$$A_i(s_{i-1}y_i + t_{i-1}) - B_iy_i + C_iy_{i+1} = G_i, \quad (3.12)$$

отримаємо рекурентну формулу:

$$s_i = \frac{C_i}{B_i - A_i s_{i-1}}, \quad t_i = \frac{A_i t_{i-1} - G_i}{B_i - A_i s_{i-1}}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.13)$$

У  $n$ -му рівнянні системи (3.8)  $C_n = 0$ , отже,  $s_n = 0$ , значить з (3.10) випливає що  $y_n = t_n$ . По формулі (3.10) знаходимо остальні коефіцієнти.

## ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСИЛАННЯ

- [1] А. Н. Тихонов, А. А. Самарский, *Об однородных разностных схемах*, Журнал вычислительной математики и математической физики, 1961.
- [2] А. А. Самарский, *Введение в теорию разностных схем*, Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», М., 1971.
- [3] Чан Х. В. (2017). Код к данной работе. [https://github.com/FalconUA/numerical-analysis/blob/master/s3-2/appointment\\_s3-2.ipynb](https://github.com/FalconUA/numerical-analysis/blob/master/s3-2/appointment_s3-2.ipynb)