

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

**Лабораторна робота №1 з курсу “Чисельні методи
математичної фізики”:**

**“Розв’язання граничної задачі методом
безпосередньої заміни диференціальних похідних
частковими”**

*Студент 4-го курсу
групи ОМ
Чан Ха Ву*

*Викладач:
к.ф.-м.н., доцент
Риженко А. І.*

Київ, 01 січня 2017

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Методом безпосередньої заміни диференціальних похідних частковими знайти розв'язок граничної задачі для звичайного диференціального рівняння другого порядку

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u = f(x), \quad a < x < b \quad (1.1)$$

з наступними крайовими умовами третього роду

$$\begin{aligned} -k(x) \frac{d}{dx} u(x) + \alpha_1 u(x) &= \mu_1(x), \quad x = a \\ k(x) \frac{d}{dx} u(x) + \alpha_2 u(x) &= \mu_2(x), \quad x = b \end{aligned} \quad (1.2)$$

де $\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0$. Треба побудувати графік для наближеного розв'язку та апроксимізації. Порівняти з точним (аналітичним) розв'язком.

2 ТОЧНИЙ РОЗВ'ЯЗОК

При наступному вигляді функції k, p та q :

$$\begin{aligned} k(x) &= k_1 \cos(k_2 x) + k_3, \quad k(x) > 0 \\ p(x) &= p_1 \sin(p_2 x) + p_3, \quad p(x) > 0 \\ q(x) &= q_1 \cos(q_2 x) + q_3, \quad q(x) > 0 \end{aligned} \quad (2.1)$$

Нехай функція f набуває наступний вигляд:

$$\begin{aligned} f(x) &= k_1 k_2 m_1 m_2 \cos(m_2 x) \sin(k_2 x) + m_1 m_2^2 (k_1 \cos(k_2 x) + k_3) \sin(m_2 x) + \\ &\quad + p_1 m_1 m_2 \cos(m_2 x) \sin(p_2 x) + p_3 m_1 m_2 \cos(m_2 x) \end{aligned} \quad (2.2)$$

та нехай коефіцієнти μ_1, μ_2 дорівнюють

$$\begin{aligned} \mu_1 &= k(x) \frac{d}{dx} (m_1 \sin(m_2 x) + m_3 \cos(m_4 x) + m_5) (a) - \\ &\quad - \alpha_1 (m_1 \sin(m_2 a) + m_3 \cos(m_4 a) + m_5) \\ \mu_2 &= -k(x) \frac{d}{dx} (m_1 \sin(m_2 x) + m_3 \cos(m_4 x) + m_5) (b) - \\ &\quad - \alpha_2 (m_1 \sin(m_2 b) + m_3 \cos(m_4 b) + m_5) \end{aligned} \quad (2.3)$$

У такому випадку, точний (аналітичний) розв'язок задачі (1.1) набуває наступний вигляд:

$$u(x) = m_1 \sin(m_2 x) + m_3 \cos(m_4 x) + m_5 \quad (2.4)$$

3 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

На відрізку $[a, b]$ введемо рівномірну сітку $\bar{\omega}_h = \{x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n\}$ з шагом $h = (b - a)/n$. Назвемо цю сітку основною. Розв'язок задачі (1.1) з крайовими умовами (1.2), функціональні коефіцієнти та крайові значення яких набувають вигляд (2.1), (2.2) та (2.3), будемо шукати у вигляді сіткової функції $y_i = y(x_i)$, заданої на точках сітки $\bar{\omega}_h$.

3.1 АПРОКСИМАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ РІЗНИЦЕВИМ

Позначимо через k_i, p_i, q_i, f_i значення функції $k(x), p(x), q(x), f(x)$ у точках x_i однорідної сітки $\bar{\omega}_h$. Замінімо похідні в рівняння (1.1) скінченно-різницеви виразами:

$$(k_{i+\frac{1}{2}} y_{\bar{x},i})_{x,i} + p_i y_x^o + q_i y_i = f_i \quad (3.1)$$

або, у розгорнутому вигляді

$$- \left(k_{i+\frac{1}{2}} \frac{y_{i+1} - y_i}{h^2} - k_{i-\frac{1}{2}} \frac{y_i - y_{i-1}}{h^2} \right) + p_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i \quad (3.2)$$

де $k_{i+\frac{1}{2}} = k(x_i + \frac{h}{2})$ та $i = 1, 2, \dots, n-1$. Перегрупуємо коефіцієнти при змінних y_0, y_1, \dots, y_n та запишемо рівняння (3.2) у вигляді:

$$A_i y_{i-1} + B_i y_i + C_i y_{i+1} = G_i, i = 1, 2, \dots, n. \quad (3.3)$$

звідси

$$A_i = -k_{i+\frac{1}{2}} - \frac{h}{2} p_i, \quad B_i = k_{i+\frac{1}{2}} + k_{i-\frac{1}{2}} + h^2 q_i, \quad C_i = -k_{i+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} p_i. \quad (3.4)$$

Нескладно переконатись, що така різницєва схема апроксимує задачу (1.1) з похибкою другого порядку $O(h^2)$. Також, можна показати що схема збігається до точного розв'язку у класі гладких функції коефіцієнтів. Ідея для доведення цього факту можна знайти у [2, с. 106–108].

3.2 АПРОКСИМАЦІЯ КРАЙОВИХ УМОВ

Помітимо, що у рівнянні (3.4) не вистачає два відношення для пошуку розв'язку $y_i = y(x_i)$. Ці відношення можна задати, апроксимуючи крайові умови (1.2). Розглянемо дві різницєві схеми для цих умов.

Явна схема апроксимування умов (1.2) виглядає наступним чином:

$$\begin{aligned} -k_0 y_{x,0} + \alpha_1 y_0 &= \mu_1 \\ k_n y_{\bar{x},n} + \alpha_2 y_n &= \mu_2 \end{aligned} \quad (3.5)$$

або, у розгорнутому вигляді

$$\begin{aligned} -k_0 \frac{y_1 - y_0}{h} + \alpha_1 y_0 &= \mu_1 \\ k_n \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + \alpha_2 y_n &= \mu_2 \end{aligned} \tag{3.6}$$

Використані скінченно-різницеві відношення для апроксимації похідних (3.5) забезпечує нам тільки перший порядок апроксимації відносно шага h рівномірної сітки $\bar{\omega}_h$. Відповідно, загальний порядок апроксимації диференціальної задачі (1.1), (1.2) за допомогою різницевих схем (3.2), (3.6) – перший, тобто $O(h)$.

ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСИЛАННЯ

- [1] А. Н. Тихонов, А. А. Самарский, *Об однородных разностных схемах*, Журнал вычислительной математики и математической физики, 1961.
- [2] А. А. Самарский, *Введение в теорию разностных схем*, Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», М., 1971.