

跨性别女性（MTF）生殖器手术须知

手术是一种创伤性的治疗，具有一定的风险。由于手术性质、特点和个体差异等多种因素影响，术中和术后可能发生意外情况和并发症。

告知如下，包括但不限于：

1. 手术在于通过手术方式切除现有男性性腺、器官，及重建女性外生殖器，以改变患者解剖和生理性别
2. 本手术不可逆，一旦实施，无法恢复切除器官的原有形态和功能。
3. 由于个人审美观点不同和现有医疗水平所限，手术效果不一定能完全满足患者要求。重建的女性外阴形态达不到患者预期
4. 如有精神异常病史、瘢痕增生、出血倾向、药物过敏等不宜手术的情况，术前要如实告知
5. 再造的阴道可能出现阴道尿道瘘、阴道直肠瘘、甚至阴道膀胱瘘；再造阴道术后出现挛缩，狭窄，需要长期佩戴模具等问题，再造阴道可能无性快感
6. 人体的两侧并不完全相同，因此也不能保证术后两侧完全对称或者一致
7. 可能出现麻醉意外，包括心脑血管意外，如心肌梗死、脑梗、恶性高热、呼吸心跳骤停等，严重时可能危及生命。
8. 伤口及创面出血，血肿，可能需要再次进行手术止血，清理血肿等，大量出血可能危及生命，必要时可能需要输血
9. 术后切口或深部组织可能出现感染，红肿、流脓、伤口裂开，伤口可因感染导致瘢痕增生
10. 术后必定会留下手术切口和手术部位瘢痕，瘢痕增生程度与个人体质、手术部位、年龄等多种因素有关，而非手术医师能够控制和预测
11. 因个人体质、营养状况或者基础疾病，可能出现切口愈合延迟、皮缘坏死或瘢痕增生
12. 可能出现局部皮肤的色素沉着或者色素脱失
13. 术后长期卧床可能导致下肢深静脉血栓形成，血栓脱落可致肺栓塞，危及生命
14. 新建的阴道可能向下脱垂，需要手术复位
15. 重塑的阴蒂无法保证术后能达到满意的性高潮或性快感
16. 重塑后的尿道口可能因为瘢痕增生而狭窄，导致排尿困难，需要定期扩张或者二次手术；尿道口狭窄或者尿道角度改变可能导致排尿困难、尿线细或者尿残留

17. 若采用皮瓣重建技术，移植的皮瓣组织可能因为血运障碍发生部分或全部坏死；术中发现皮瓣血运不良可能中转为植皮手术
18. 部分皮瓣阴道缺乏自身分泌功能，可能出现阴道干涩，需要长期使用润滑剂
19. 手术后无生育能力
20. 如需二次手术，手术费用自理
21. 其他意外可能

手术前准备如下：

1. 如有生育需要，可先提前进行精子冻存
2. 如有应用激素治疗，术前需要停药 1 个月
3. 适当减肥、吸烟者戒烟
4. 手术前 2 天少渣饮食
5. 如合并影响手术的内科基础疾病，先控制稳定
6. 术后用品准备：痔疮垫、阴道模具 3.0 和 3.5 两款（多备几个）、厚实的小毛巾几块（20*20）、束身衣 2 套，避孕套

出院术后恢复期护理：

1. 每天换药 1~2 次，建议每次大便后换药一次，其余时间自行安排，每次不超过 15 分钟；术后一个半月后，仍然每天冲洗阴道内一次
2. 术后 3 个月内紧身衣穿带肩带的，每天尝试坐 10~20 分钟，分几次坐，每次坐 3~5 分钟，以顶压阴道加深深度
3. 术后一个月、三个月、六个月复查，术后半年复查告知脱离模具的方法和注意事项
4. 关于结婚性生活：术后 4 个月可以有房事，房事后清洗阴道
5. 伤口恢复：口腔黏膜在术后半年内可能会有少许发麻情况，一般半年后缓解
6. 佩戴模具期间，就有可能会出血，一般出血量不多不必紧张，如果特别多建议到医

院检查，需要止血就直接止血

7. 关于锻炼：术后三个月内避免剧烈活动，包括体育锻炼和长时间逛街购物，三个月以后可根据自身情况逐渐增加运动量

注：术后会发详细的术后指导