

阴道再造术-术后指导

一、住院期间饮食：术后 4 天内喝清流食，以免产生大便污染伤口。可以喝的东西包括：红糖水、白糖水、温盐水、稀释的温热的橙汁不带颗粒。少量巧克力。不能喝牛奶、豆浆等容易产气涨肚的东西。

术后第五天开始可以吃米汤

术后第六天开始可以吃粥，小咸菜，没有油的糕点少量

术后第七天开始可以吃烂面条、面片、少量馒头等，尽量少进油荤，避免拉肚子。

（若是期间任何一天，有排便的感觉，自行将腹带松开，床上便器内排便，后清理干净，等待医生换药）

二、出院后换药指导

1. 关于换药：将醋酸氯己定大肚朝上，顺阴道后壁缓慢送入阴道，左右摇摆的同时挤压药水，**捏紧后不要放松**，将药水瓶拿出体外，放松后重复上步骤。一般一支药水挤两次就能干净。每次换药用两支到三支即可，看个人情况定。一天换药一到两次，建议每次大便后换药一次，其余时间自行安排。每次换药时间不能超过 15 分钟。术后一个半月后，仍然每天冲洗阴道内一次，冲洗液可以不再用药水，用开水放凉的就可以了。醋酸氯己定的药瓶不要丢掉，每次用空瓶抽水后直接冲洗比较方便。

2. 紧身衣穿着：

术后三个月内，紧身衣尽量穿带肩带的，利用肩带的拉力，将阴道模具尽量向上方固定，不要怕疼，不然阴道会回缩变短。每天尝试坐 10-20 分钟，分几次坐，每次坐 3-5 分钟，以顶压阴道加深深度。（术后一个月内疼痛明显可以不用坐，第二个月开始练习坐。）

术后一个月、三个月、六个月来院复查，根据恢复的情况，**半年**后复查后，开始尝试渐渐脱离模具。这以后紧身衣可以穿短裤式的，每天顶压模具坐 20 分钟。六个月返院复查时咨询脱离模具的方法及注意事项

3. 关于结婚

术后 4 个月，就可以结婚了，可以有房事。房事后清洗阴道（未脱离模具的

时候在冲洗后重新佩戴模具，如果已经脱离模具了，就只冲洗就可以了）

4. 伤口恢复

口腔黏膜在术后半年内可能会有少许发麻的情况，一般半年后缓解。

阴道只要佩戴模具期间，就有可能会出血，一般血量不多，不必紧张，如果量有点多，可以自行冲洗换药一次后休息观察。如果血量特别多，建议去当地医院妇产科检查，需要止血的直接止血就可以。

5. 关于锻炼：

术后三个月内避免剧烈活动，包括体育锻炼和长时间逛街购物。

三个月以后可以根据自身情况逐渐增加运动量，一般8个月以后，可以做到半天不要佩戴模具的时候，再恢复游泳健身等剧烈活动。

切记：出院后上厕所时，用手托扶模具，一定要避免模具掉入厕所!!!!

每天检查模具外露的尺寸，用力顶压的情况下外露不能超过3cm。如果超过3cm了，每天带模具坐的时间要延长，用身体的重量顶压模具，加深阴道的长度

