
云峰朋辈辅学微甲提升 2 组 — 第 2 讲

内容提要: 幂级数

Date: March 27 2022

主讲人: Famiglisti @CC98

Place: 碧 2 党员之家

1 知识概要

1. 函数项级数的定义
2. 幂级数基本定理——Abel 定理
3. 求收敛半径与收敛域的两种基本方法（根值、比值）
4. 幂级数的分析性质（连续性、逐项可导性、逐项可积性、收敛半径不变性）
5. 绝对收敛与条件收敛

2 基本题型

题型一：求幂级数的收敛半径和收敛域

根值法、比值法、换元法

【example 1】求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$ 的收敛域

题型二：幂级数求和函数

别忘了求收敛半径和收敛域！

情形一：求 $\sum_{n=0}^{\infty} P(n)x^n$ 的和函数，其中 $P(n)$ 为 n 的多项式，求和函数常用工具

a 级数的逐项可积性

b $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} (-1 < x < 1)$

c $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} (-1 < x < 1)$

【example1】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}}(x-1)^{2n+1}$

【example2】 $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$

情形二：求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{P(n)}$ 的和函数，其中 $P(n)$ 为 n 的多项式，求和函数常用工具

a 级数的逐项可导性

b $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \ln(1+x) (-1 < x \leq 1)$

c $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) (-1 \leq x < 1)$

【example1】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)2^n}$

【example2】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{n(2n-1)}$

情形三：幂级数系数的分母中含 $n!$, 求和函数常用工具

a $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x (-\infty < x < +\infty)$

b $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!} = \cos x (-\infty < x < +\infty)$

c $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin x (-\infty < x < +\infty)$

d 求和函数满足的微分方程

【example1】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n n!} x^n$

【example2】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1} \quad (-1 < x < 1)$

情形四：求 $\sum_{n=0}^{\infty} P(n)x^n$ 的和函数, 其中 $P(n)$ 为复杂分式, 常通过换元等方法将分式化为标准多项式或标准分式

【example1】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$

题型三：函数展成幂级数

积分法、微分法、裂项法、熟记常用级数展开公式

【example1】 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展成 x 的幂级数

【example2】求 $\ln \frac{\sin x}{x}$ 在 $x=0$ 的幂级数展开 (到 x^4)

题型四：特殊的常数项级数的求和

将数项级数中的 a^n 代换为 x^n , 并求和函数

【example1】 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n(n^2-1)}$

3 真题解析

【18-19mid】判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\sqrt{2}+\dots+\sqrt{n}}$ 的敛散性

【18-19mid】将 $f(x) = \arcsin x$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $f^{(99)}(0)$

【18-19mid】 设 $0 < a_0 < 1, a_{n+1} = a_n(1 - a_n)(n = 0, 1, 2, \dots)$, 证明

1. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛

2. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散

【18-19final】 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径与和函数

【19-20final】 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{(2^n+3^n)n!}$ 的收敛半径