Bactrosina®



Bactrosina® é uma suspensão oleosa estéril. Seu ingrediente ativo é a amoxicílina, um antibiótico semisintético de amplo espectro indicado no tratamento de uma grande variedade de infecções que atingem os animais domésticos, ocasionadas ou associadas com bactérias gram-positivas e gram-negativas sensíveis à amoxicílina, exoetuando-se as cepas produtoras de β-lactamases.

COMPOSIÇÃO:

Cada 100 mL contém:

INDICAÇÕES:

Bactrosina® é especialmente indicada para o tratamento das seguintes infecções:

Em bovinos, caprinos e ovinos:

- Diarréias e infecções do trato gastrintestinal causadas por Clostridium spp., Escherichia coli, Proteus spp. e Salmonella spp.
- Pneumonias e infecções do trato respiratório causadas por Pasteurella spp.
- Difteria dos bezerros causada por Fusobacterium necrophorum.
- Metrites e infecções geniturinárias causadas por Escherichia coli, Staphylococcus spp. e Strepto-
- Infecções da pele e dos tecidos moles por Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.
- Mastites causadas por Clostridium spp., Connebacterium spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.
- Piobacilose causada por Actinobacillus spp.

- Pielonefrite bovina e linfadenite caseosa dos caprinos e ovinos causadas por Corynebacterium spp.
- Podridão dos cascos de bovinos e ovinos causada por Bacterioides nodosus e Fusobacterium necrophorum.
- Actinomicose de bovinos causada por Actinomyces bovis.
- Actinobacilose de bovinos e ovinos causada por Actinobacillus lignieresii.
- Ceratoconjuntivite causada por Moraxella spp.
- Artrites e infecções das articulações causadas por Escherichia coli, Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.


Em suínos:

- Diarréias e infecções do trato gastrintestinal causadas por Clostridium spp., Escherichia coli e Salmonella spp.
- Pneumonias e infecções do trato respiratório causadas por Pasteurella spp.
- Rinite atrófica causada por Bordetella bronchiseptica.
- Pleuropneumonia causada por Haemophilus spp.
- Metrites e infecções geniturinárias causadas por Escherichia coli, Staphylococcus spp. e Streptococcusspp.
- Infecções da pele e dos tecidos moles causadas por Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.

Zgraph	Bactrosina - bula - Brasil			0s Nº/ 4758
5505-3305	Bayer S.A.		PASTA	B-083
cores/ colors:	105 x 148 mm	ARQUIVO / ARCHIVE: bula-bactrosina.p65		
07/11/06	NOME / NAME: Emi	640-0214		APLIC. Nº:
COD PROD: 00000000	COD. BARRAS: 0000000000	004	EVIEW N	APPROVADO APPROVADO







- Piobacilose causada por Actinobacillus spp.
- Actinomicose causada por Actinomyces bovis.
- Artrites e infecções das articulações causadas por Escherichia coli, Staphylococcus spp. e Strepto-COCCUS SDD.
- Poliartrite causada por Haemophilus spp.
- Ruiva ou erisipela suína causada por Erysipelothrix rhusiopathiae.

Em cães e gatos:

- Diarréias e infecções do trato gastrintestinal causadas por Campylobacter spp., Clostridium spp., Escherichia coli é Salmonella spp.
- Pneumonias e infeccões do trato respiratório causadas por *Pasteurella* spp.
- · Tosse dos canis causada por Bordetella bronchiseptica.
- Metrites e infecções geniturinárias causadas por Escherichia coli, Proteusspp., Staphylococcusspp. e Streptococcus spp.
- Infecções da pele e dos tecidos moles causadas por Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.
- Mastites causadas por Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.
- Artrites e infecções das articulações causadas por Escherichia coli, Staphylococcus spp. e Streptococcus spp.

É também indicada no tratamento de infecções nas castrações e no pré e pós-operatório de outras intervenções cirúrgicas. O uso profilático deste medicamento fica a critério do Médico Veterinário.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

Para bovinos, caprinos, ovinos, suínos, cães e gatos, administrar por via intramuscular 1 mL para cada 20 kg de peso (7,5 mg/kg de peso), em uma aplicação diária, durante três a cinco dias, ou a critério do Médico Veterinário.

Deve-se continuar o tratamento por período não inferior a 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

RECOMENDAÇÕES E PERÍODO DE CARÊNCIA:

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Agite bem, antes de usar, durante 15 segundos, até a completa homogeneização.

Não dilua o produto.

Após o início da utilização do produto, o conteúdo restante do frasco deverá ser consumido no prazo máximo de 4 semanas.

Período de carência: Suspender a medicação 18 días antes do abate dos animais destinados ao consumo humano, e 2 dias antes da utilização do leite para consumo humano.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não deve ser administrado a animais com histórico de hipersensibilidade às penicilinas. Apesar de o antibiótico ser bem tolerado, ocasionalmente podem ser observadas pequenas reacões locais passageiras. Discretas perturbações gastrintestinais transitórias foram observadas/relatadas em cães e gatos. Penicilinas e cefalosporinas podem causar reacões de sensibilização, quando injetadas, inaladas, ingeridas ou após contato com a pele. A sensibilidade às penicilinas pode levar a reações cruzadas com cefalosporinas e vice-versa.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

APRESENTAÇÃO:

Frascos-ampola de vidro contendo 20 mL, 50 mL e 100 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº, 5026, em 24/02/1995.

Proprietário e fabricante:

Norbrook Laboratories Ltd. - Newry - Irlanda do Norte

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor: Bayer S.A.

Rua Domingos Jorge, 1000

São Paulo - SP

CNPJ 14.372.981/0001-02

Responsável técnico: Mário Eduardo Pulga CRMV-SP nº. 2715

Produto Importado









