

Drasil



Uso Veterinário - oral

Antiemético à base de metoclopramida
para cães e gatos

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Metoclopramida (cloridrato).....400,00 mg

Veículo q.s.p.100,00 mL

Indicações:

Drasil é recomendado para cães e gatos, no controle das náuseas e vômitos de origem central e periférica, distúrbios da motilidade gastrointestinal, inclusive de origem metabólica e decorrentes de reações medicamentosas.

Posologia e modo de usar:

Drasil deverá ser administrado por via oral. A dosagem da metoclopramida em cães e gatos é de 0,2 a 0,4 mg/kg de peso corporal, ou seja, 1 a 2 gotas de Drasil para cada kg de peso, a cada 8 horas. Estas doses poderão ser ajustadas de acordo com a resposta clínica obtida e com as condições do paciente, a critério do Médico Veterinário.

Contra-indicações e limitações de uso:

Nos distúrbios extrapiramidais tais como epilepsia ou em tratamentos com drogas que possam causar reações desse tipo; em pacientes nos quais a estimulação da motilidade gastrointestinal possa ser contra-indicada, como por exemplo na presença de hemorragias, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal. Não administrar em animais tratados com drogas neurolépticas, fenotiazinas ou corticóides.

Não utilizar o produto em pacientes com histórico de hipersensibilidade aos agentes da fórmula. Não utilizar o produto em fêmeas durante a gestação ou lactação.

Efeitos colaterais:

Poderão advir sonolência e inquietação em animais tratados com o produto, bem como distúrbios extrapiramidais, erupções cutâneas inclusive urticárias, distúrbios gastrointestinais, nervosismo e depressão. Em caso de uso prolongado, pode ocorrer constipação.

Precauções:

Utilizar o produto com cuidado em pacientes com

insuficiência renal. Superdosagens poderão causar sonolência, falta de coordenação e reações extrapiramidais. Nesses casos, usar terapia sintomática, terapia de suporte com drogas anticolinérgicas, antiparkinsonianas e antihistamínicos com propriedades anticolinérgicas.

Interações medicamentosas:

Atropina e agentes analgésicos opiáceos podem antagonizar a ação da metoclopramida. Efeitos sedativos aditivos podem ocorrer quando a droga é administrada com narcóticos ou tranqüilizantes. Deve ser evitado o uso simultâneo da metoclopramida com fenotiazina porque a terapia continuada com essa droga pode causar os mesmos efeitos colaterais.

Em pacientes diabéticos, a metoclopramida influencia no fluxo do alimento para o intestino delgado e assim na taxa de absorção. A dosagem de insulina pode necessitar de ajuste e o intervalo entre as administrações pode exigir alteração.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Apresentação: frasco contendo 20 mL.

Conservar em local fresco (entre 13°C e 36°C), seco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data de fabricação.

Responsável Técnica:

Dra. Beatriz Salustio Martins

CRMV-SP 40.952

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8739 em 18/11/03

Proprietário e Fabricante:

Mundo Animal Laboratório Veterinário Ltda.

Avenida Dom João VI, 500

Pindamonhangaba - SP - 12412-805

CNPJ 54.844.774/0004-70

Indústria Brasileira



SAC 0800 772 25 23
sac@mundanimalvet.br
www.mundanimalvet.br