



Fortekor®

Uso Veterinário

 **NOVARTIS**
ANIMAL HEALTH

Fórmula

Fortekor 5 mg

Cloridrato de benazepril 5 mg
Excipiente q.s.p 192 mg

Fortekor 20 mg

Cloridrato de benazepril 20 mg
Excipiente q.s.p 182 mg

Indicações

Fortekor é indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães e insuficiência renal crônica em gatos. Após a administração oral o benazepril é rapidamente absorvido a partir do trato intestinal e hidrolizado na sua forma benazeprilato, um metabólito altamente específico e potente inibidor da enzima conversora da angiotensina (ECA). Fortekor produz uma inibição significativa da ECA plasmática por mais de 24 horas após a administração de dose única. A inibição da ECA leva a uma redução de conversão da Angiotensina I inativa, em Angiotensina II ativa, determinando a redução dos efeitos mediados pela última, tais como, vasoconstrição das artérias e veias e a retenção de sódio e água pelos rins.

Em cães com insuficiência cardíaca congestiva, a administração de Fortekor reduz a pressão sanguínea e o volume de carga sobre o coração. Fortekor induz a um significativo aumento da expectativa de vida de cães com insuficiência cardíaca congestiva, sob condições clínicas muito mais favoráveis, tal como, redução da tosse e com uma melhor qualidade de vida.

Ao contrário do que ocorre com outros inibidores da ECA, benazepril é excretado pelas vias biliar e urinária, de modo que não se faz necessário o ajuste de dose para o tratamento de animais com insuficiência renal.

Em gatos com insuficiência renal crônica Fortekor reduz a perda de proteína pela urina e diminui a pressão sanguínea intraglomerular.

Fortekor aumenta o apetite, a qualidade de vida e alonga o tempo de vida de gatos, particularmente em casos de doença em estado avançado.

Administração e dose

Insuficiência cardíaca congestiva em cães

A dose recomendada é de 0,25 a 0,50 mg de benazepril para cada kg de peso corporal, administrada por via oral, uma vez ao dia, de acordo com o seguinte esquema:

Peso em kg	Fortekor 5		Fortekor 20	
	Dose padrão	Dose dupla	Dose padrão	Dose dupla
5–10	1/2 compr.	1 compr.	–	–
11–20	1 compr.	2 compr.	–	–
21–40	–	–	1/2 compr.	1 compr.
41–80	–	–	1 compr.	2 compr.

Fortekor pode ser administrado com ou sem alimento. A duração do tratamento é ilimitada. Sob o critério do médico veterinário a dose pode ser dobrada, mas, mesmo assim, deve ser administrada apenas uma vez ao dia.

Fortekor pode ser administrado em combinação com digoxina, diuréticos e drogas anti-arrítmicas quando necessário.

Insuficiência renal crônica em gatos

A dose recomendada é de 0,5 mg de cloridrato de benazepril, por kg de peso corporal, administrada por via oral uma vez ao dia, de acordo com a seguinte recomendação:

Peso dos gatos em kg	Fortekor 5 mg
2,5–5	1/2 comprimido
entre 5 e 10	1 comprimido

Fortekor pode ser administrado junto ou não de alimentos. A duração do tratamento é ilimitada.

Contra-indicações e precauções

Cães

Sinais de hipotensão, como cansaço, tonturas, são raros, mas podem aparecer. Nestes casos pode ser necessário reduzir a dose do diurético.





Pode ocorrer interação com a droga espironolactona.

Fortekor não é recomendado para animais de reprodução e cadelas prenhes ou em lactação. Esses animais somente deverão ser tratados se o risco/benefício for considerado justificável. Não tratar animais que apresentem evidência de falha cardíaca devido a estenose da válvula aórtica.

Toda vez que meio comprimido for guardado, o mesmo deve ser mantido dentro do frasco.

Gatos

Fortekor pode aumentar a concentração da creatinina plasmática ao início do tratamento. O efeito terapêutico do produto, está relacionado com a redução da pressão sangüínea, entretanto o desaparecimento dos sintomas não é indicativo para suspender o tratamento.

Fortekor não é recomendado para gatas reprodutoras ou prenhes ou animais em lactação.

Informações complementares

Não foram observadas evidências de toxicidade renal com Fortekor durante os testes clínicos do produto. A excreção via biliar significa que existe um risco muito baixo de bioacumulação em cães com insuficiência renal. Contudo como é a rotina nestes casos, é recomendável se monitorar as concentrações de uréia e creatinina plasmática de cães com insuficiência renal.

Fortekor® 20 – Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 6.058/97

Fortekor® 5 – Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 6.059/97

Apresentação: frasco de plástico contendo 30 comprimidos.

Venda sob prescrição de Médico Veterinário

Proprietário

Novartis Animal Health Inc.

Fabricante

Novartis Santé Animale S.A.S.
Huningue – França

Representante exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor

NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA
Av. Pref. João Vilalobo Quero, 2253
06421-300 Barueri – SP
CNPJ 00.820.120/0005-69

Responsável Técnico

Denis Frota Daflon – CRMV-SP 23.802

PRODUTO IMPORTADO

Informações ao cliente:

0800-888-8280
São Paulo - segunda à sexta
das 8:00 às 17:00 horas.

® Marca Registrada Novartis AG,
Basiléia, Suíça

