

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

“VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.”  
A aplicação deverá ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº 7.667 em 09/03/01.

**VENCIMENTO:** 2 (dois) anos após a data da fabricação.



Proprietário: **CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.**  
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP  
Tel.: (11) 2274-7022  
CNPJ: 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira  
®Marca Registrada - [www.chemitec.com.br](http://www.chemitec.com.br)  
Resp. Técnico: Carlos H. A. Baptista - CRF/SP 30.191  
Fabricante: Biofarm Química e Farmacêutica Ltda.  
Av. João Batista Ferraz Sampaio, nº 710  
Jaboticabal/SP - CNPJ: 00.256.591/0001-62

**CHEMITEC®**

## Chemitritil® Injetável 10%

Uso Veterinário

**Antibiótico de amplo espectro  
Injetável**



**FÓRMULA** - Cada 100 mL contém:

Enrofloxacino (Ácido 1-ciclopropil-7-[4-etil-1-piperazinil]-6-fluoro-1,4-diidro-4-oxo-3-quinoleína-carboxílico) .....10,0 g  
Veículo q.s.p. ....100,0 mL

**ATENÇÃO:**

**OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS E CAPRINOS:** ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

**LEITE** - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

**SUÍNOS:** ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

### INDICAÇÃO DE USO

**Chemitritil® Injetável 10%** é indicado para bovinos, suínos e caprinos no tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, Espiroquetas e Micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino.

É especialmente indicado nas enterites bacterianas, diarreias (primárias ou secundárias) e demais infecções digestivas causadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp, *Treponema hyodysenteriae* e outros germes.

Nas pneumonias e infecções respiratórias causadas por *Staphylococcus* spp, *Mycoplasma* spp, *Pasteurella* spp, *Bordetella bronchiseptica* e *Haemophilus* spp.

Nas infecções após o parto, infecções das vias genito-urinárias, do umbigo e casco causadas por *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli* e *Corynebacterium* spp.

Nas metrites, mastites e agalaxias (Complexo MMA) causadas por *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp e *Mycoplasma* spp.

Nas infecções por *Anaplasma* spp (*Anaplasmoses*).

Nas infecções do ouvido (otite) causadas por *Pseudomonas* spp, *Proteus* spp, *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp.

Nas infecções dérmicas (piodermes) causadas por *Pseudomonas* spp, *Proteus mirabilis*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*.

**Chemitritil® Injetável 10%** é recomendado como preventivo de infecções pós-operatórias como: castrações, descornas, laparotomias e lesões acidentais.

**Chemitritil® Injetável 10%** é indicado para todas as infecções causadas por micro-organismos sensíveis ao Enrofloxacino. O uso profilático deste medicamento fica a critério do Médico Veterinário.

### POSOLOGIA E MODO DE USAR

Administrar por via **intramuscular, subcutânea ou endovenosa**.  
Dosagem terapêutica: 2,5 mg do ingrediente ativo por kg de peso vivo. Uma vez ao dia.

#### Bovinos, suínos e caprinos:

Aplicar 1,0 mL de **Chemitritil® Injetável 10%** para cada 40 kg de peso vivo, diariamente, durante 3 a 5 dias. Nas infecções respiratórias complicadas e anaplasmoses aplicar 1,0 mL de **Chemitritil® Injetável 10%** para cada 20 kg de peso vivo, durante 5 dias (5,0 mg/kg de peso vivo).

### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não administrar o produto em conjunto com complexos vitamínicos ou soluções contendo ferro, zinco, manganês e cálcio, pois reduzem a absorção do Enrofloxacino.

### RECOMENDAÇÕES

- Recomenda-se a continuidade do tratamento por um período de 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.
- Recomenda-se que previamente à aplicação de qualquer produto injetável, seja feita uma vacinação contra bactérias do gênero *Clostridium* nas regiões onde há histórico desse tipo de infecção. Produtos injetáveis podem provocar aparecimento de clostridioses.

### PRECAUÇÕES

- Quando o volume a ser aplicado for superior a 10 mL, aconselha-se dividir este volume em dois ou mais pontos de aplicação.
- Observar os cuidados normais de assepsia para injeções nos animais.

### EFEITOS COLATERAIS

**Chemitritil® Injetável 10%** não é tóxico. É muito bem tolerado nas doses e formas de aplicação indicadas.

### APRESENTAÇÃO:

**Chemitritil® Injetável 10%** é apresentado sob a forma de solução injetável, acondicionado em frascos-ampola de 10, 50 e 500 mL.