



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido contiene:

Aciclovir 400 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Dióxido Silícico Coloidal, Estearato de Magnesio, Crospovidona, Copovidona, Almidón de Maíz Pregelatinizado, Celulosa Microcristalina.

Clasificación:

Antiviral.

Indicación:

Tratamiento y profilaxis de infecciones iniciales y recidivantes de virus herpes simples en labios, piel y zona genital e infecciones por herpes zoster.

Advertencias:

Úsele sólo por indicación y bajo supervisión médica.

Durante el tratamiento de pacientes inmunocomprometidos es necesario considerar la posibilidad de desarrollo de virus mutantes que presenten una menor susceptibilidad frente a Aciclovir. Debido a esto se debe evitar la transmisión del virus mientras existan lesiones activas durante la administración de la droga.

Contraindicaciones:

No usar en Pacientes con hipersensibilidad a Aciclovir o intolerancia a alguno de los componentes de la formulación.

Uso en Embarazo y Lactancia:

Atraviesa la placenta humana, debe ser usada sólo cuando los potenciales beneficios justifiquen la posibilidad de riesgo fetal. Esta droga puede causar daño cromosómico al administrarse en altas dosis.

Existe poca información en relación a la distribución de Aciclovir en la leche materna, sin embargo la droga alcanza mayores concentraciones en ella que en el plasma materno, pudiendo ser absorbido por los lactantes.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: zidovudina, en pacientes con Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) aumenta la neurotoxicidad al administrarlas en conjunto. Probenecid (aumenta la vida media plasmática de Aciclovir), Anfotericina B (aumenta el efecto antiviral de Aciclovir sobre virus pseudorabies), Ketoconazol (actividad antiviral sinérgica).

Reacciones Adversas:

Pueden ocurrir efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). **No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo con su médico.**

Sólo para Aciclovir oral: Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea.

Dosis:

La dosis, frecuencia de administración y duración del tratamiento dependerá de la enfermedad a tratar:

Infecciones genitales por virus Herpes simplex:

- En el caso de una primera infección se recomienda administrar 200 mg 5 veces al día por 7 a 10 días ó hasta que se observe mejoría clínica. En el caso de recidiva, el tratamiento se realiza por 5 días.

Prevención de infecciones por Herpes simplex en pacientes inmuno-deprimidos:

- La posología debe ser individualizada por el médico. En general se recomienda administrar 200 mg 2-5 veces al día ó 400 mg 2 veces al día durante todo el período de inmunosupresión o máximo por un año luego del cual se debe hacer una evaluación del paciente.

Prevención de infecciones por virus Herpes simplex en pacientes que sufran más de 6 recidivas al año:

- Se recomienda administrar 200 mg al día. El tratamiento debe interrumpirse luego de 6 ó 9 meses.

Sobredosis:

Al alcanzar concentraciones renales mayores de 2,5 mg/1 mL, los cristales de Aciclovir precipitan en el túbulo renal provocando alteraciones renales, daño renal y anuria, si estas dos últimas condiciones se presentan se debe ajustar la dosis de Aciclovir y realizar una hemodiálisis hasta restablecer la función renal normal. Conduzca al intoxicado a un Centro de Atención Médico Hospitalario.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase lejos del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.