【1】 QID:36141151

1．胶体在生产、生活中有广泛应用。碘化银胶体、氢氧化铁胶体制备原理如下(aq表示溶液，l表示液态)：

①$AgNO_3(aq)+KI(aq)=AgI(胶体)+KNO_3(aq)$

②$FeCl_3(aq)+3H_2O(l)\overset{\triangle}{=}Fe(OH)_3(胶体)+3HCl(aq)$

下列说法错误的是

A．用激光笔照射可区别$FeCl_3$溶液和$Fe(OH)_3$胶体

B．$AgNO_3$溶液和AgI胶体的本质区别是分散质粒子直径不同

C．在饱和$FeCl_3$溶液中滴加沸水并继续煮沸可制备$Fe(OH)_3$胶体

D．在河水等天然水体中加入铁盐，利用$Fe(OH)_3$胶体可聚沉水中杂质，实现净水

【2】 QID:36139019

2．下列关于分散系的说法正确的是

A．均一、透明、稳定的分散系属于胶体

B．向$FeCl_3$溶液中加入NaOH溶液可制得$Fe(OH)_3$胶体

C．溶液、胶体和浊液的本质区别是分散质粒子的直径大小

D．油水混合物属于悬浊液

【3】 QID:36124448

3．英国物理学家约翰·丁达尔首先发现了激光透过胶体时，从侧面可以看到一条光亮的通路。下列液体中，不会出现类似现象的分散系是

①鸡蛋白溶液②稀豆浆③淀粉溶液④硫酸钠溶液⑤氢氧化铁胶体⑥矿泉水

A．②⑥　　B．①③　　C．④⑥　　D．④⑤

【4】 QID:36118731

4．下列关于胶体的说法正确的是

A．直径为4.5nm的硫化银属于胶体

B．面粉工厂利用静电除尘说明胶体带电

C．同一只钢笔使用不同品牌的墨水时可能发生堵塞

D．胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体能产生丁达尔效应

【5】 QID:36105259

5．下列有关分散系的说法不正确的是

A．胶体的分散质粒子直径通常在$1\times10^{-7}\ cm\sim1\times10^{-5}\ cm$

B．$Fe(OH)_3$胶体带正电

C．颗粒大小在20 nm的纳米碳酸钙粉末并不是胶体

D．向氢氧化铁胶体中逐滴加入稀硫酸，现象是先产生红褐色沉淀，随后沉淀逐渐溶解