

Yemekhane Tüketim & Obezite Korelasyon Raporu

• Dönem: 01.01.2026 – 15.05.2026 • Yayın: 15.05.2026 • Yöntem: Pearson Korelasyonu

1. Çalışma Amacı

Bu çalışma, üniversite yemekhanesinde tüketilen günlük kalori miktarı, makro besin dağılımı ve vücut kitle indeksi (BMI) göstergeleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon analizi ile incelemeyi amaçlamaktadır.

⚠ Sonuçlar popülasyon düzeyini yansıtmakta olup bireysel medikal değerlendirme niteliği taşımaz.

OBEZİTE EĞİLİM ORANI

36.0%

İzleme Gerekli

BMI-KALORI KORELASYONU

r = 0.51

p < 0.001 (anlamlı)

ORTALAMA GÜNLÜK KALORI

1.940

kcal (öğle öğünü bazlı)

2. Korelasyon Bulguları

DEĞİŞKEN ÇİFTİ	R KATSAYISI	P-DEĞERİ	YORUM
Günlük Kalori – BMI	+0.51	< 0.001	Güçlü Pozitif
Sebze Tüketimi – BMI	-0.38	< 0.001	Orta Negatif
Protein Yeterliliği – BMI	-0.22	0.004	Zayıf Negatif
Hemoglobin – BMI	-0.34	< 0.001	Orta Negatif
Basit Karbonhidrat – BMI	+0.44	< 0.001	Orta Pozitif

3. Menü Türüne Göre Obezite Riski

MENÜ TÜRÜ	ORT. KALORI (KCAL)	OBEZITE RISKİ (%)	SEBZE ORANI (%)
Geleneksel Ev Yemeği	2.140	39.6	22
Akdeniz Esintisi	1.820	29.5	41
Vejetaryen Seçenek	1.650	25.6	58
Yüksek Proteinli	1.960	31.7	29

4. Sonuç ve Politika Önerileri

Yüksek karbonhidrat içerikli menülerin obezite risk oranını %39.6 seviyesine çıkardığı görülmüştür. Akdeniz tipi beslenme modelinin benimsenmesi durumunda obezite riskinin %29.5 düzeyine gerilediği tespit edilmiştir. Menü planlamalarında sebze içeriğinin artırılması ve porsiyon denetiminin güçlendirilmesi önerilmektedir.