

1. Giriş

Ansiklopediler yazıldıkları dönemlerdeki insan üretimi bilgi birikimi ile kişi, tabiat, çevre, devlet, toplum, kültür, olgu ve olaylara dair malumatı belli bir sistem dahilinde ortaya koyarlar. Bir tek kişi tarafından yazılabileceği gibi sayıları yüzler hatta binlerle ifade edebilecek yazarların katılımıyla da hazırlanabilir.

Ansiklopedi kavramının kökeninin Grekçe enkyklios ile paideia veya Latince encyclopedie kelimelerine dayandığı düşünülmektedir. Kavramın ifade ettiği anlam bakımından bu mahiyetteki eserlerin Antikçağ'dan itibaren, dünyanın kadim medeniyetlerinde bulunmuş olması tabiidir. Tespit edilebilen ilk örneklerden birinin, milattan önce 370 yıllarında Speusippos'un hazırladığı Similitudes olduğu kaydedilir. Roma döneminde ise milattan önce 50'li yıllarda, dil, mantık, geometri, tıp, mimari, matematik ve astronomi gibi alanlarla ilgili yazılmış olan M. T. Varro'nun Disciplinarum libri IX adlı çalışması ilklerdendir. Aynı dönemlerde V. Flaccus tarafından hazırlanan Verbarum Significatum adlı eser konuları alfabetik düzen içinde ele almış olmasıyla önemli görülür. Yine Romalı bir bilgin ve devlet adamı olan Plinius (ö. 79) tarafından hazırlanan Historia Naturalis başlıklı eser esasen genel bir tabiat tarihi olmakla birlikte gerek düzeni gerekse çok yazarlı bulunuşu yönüyle sonraki ansiklopedik çalışmalar üzerinde etkili olmuştur. Yazıldıkları dönemin ilim kültür birikimleri ve anlayışları konusunda aynı zamanda bir durum tespiti konumunda olan bu tür eserlerin Ortaçağ'daki karakteristik özelliği tamamen dinî muhtevalı konular üzerine yoğunlaşmalarıdır.

1.1. İki Yeni “Süper Şişkin” Ötegezegen Keşfedildi

NASA'nın TESS (Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu) görevi kapsamında elde edilen veriler, yoğunlukları çok düşük olan “süper şişkin” yapıda iki yeni dev gezegenin varlığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, TOI-791 b ve TOI-791 c olarak adlandırılan bu gezegenlerin şimdiye kadar keşfedilmiş “en şişkin” gök cisimleri olduğunu belirtiyor. Bu ötegezegenler Jüpiter ile benzer boyutta olmalarına karşın kütleleri Jüpiter'in kütlesine kıyasla çok daha düşük, bu nedenle son derecede düşük bir yoğunluğa sahipler.

1.2. Bilim Çizgi Öyküler – Uzay Keşifleri ve Gök Bilimi Çalışmalarına Yön Verenler Akademik dergi için abonelik oluşturunuz.

2. Alzheimer Nerede Başlıyordu?

Alzheimer'a yol açan biyolojik değişimlerin uzun süredir beyinde başladığı düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular, hastalığın başlangıcının vücudun başka bölgelerinde olabileceğini gösteriyor. Bağışıklık sistemi, yangı ve bağırsaklardaki değişimler bu süreçte rol oynayabilir. Genetik veriler de Alzheimer ile ilişkili birçok genin yalnızca beyinde değil, farklı dokularda aktif olduğunu ortaya koyuyor. Bu da hastalığın tüm vücudu ilgilendiren bir süreç olabileceğini düşündürüyor.

Danimarka'daki Novo Nordisk Vakfı Temel Metabolik Araştırmalar Merkezinden araştırmacı César Cunha ve ekibi, Avrupa Alzheimer ve Demans Biyobankasından 85.000'den fazla Alzheimer hastası ile

485.000 sađlıklı bireyin genetik verilerini inceledi. Ayrıca vücudun 40 ve beynin 100 farklı bölgesinden alınan yaklaşık 5 milyon hücreyi tek tek analiz ederek bu hücrelerdeki genlerin aktivite düzeyini belirlediler.

Araştırmacılar, Alzheimer riskini artıran genetik varyantlara (genlerdeki küçük deđişiklikler) sahip yaklaşık 1.000 geni ayrıntılı olarak inceledi. Bu genlerin beyinde görece daha az; deri, akciđerler ve dalak gibi organlarda, sindirim sisteminde ve kandaki bađışıklık hücrelerinde ise daha aktif olduđu görüldü. Bu genlerin önemli bir kısmı bađışıklık sistemiyle ilişkili ve özellikle dış dünya ile etkileşim hâlinde olan dokularda yoğunlaşıyor. Bu durum, hastalığın beyin dışında başlayan yangı süreçleriyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Cunha'ya göre bazı genetik varyantlar, yangının şiddetini ve beyni etkileyip etkilemeyeceğini belirliyor, bu özellikleri taşıyan kişiler geçirdikleri enfeksiyonlar sonrasında hastalığa daha yatkın olabilir.

Araştırma ekibi, bu genetik varyantların 55-60 yaş aralığında daha aktif olduđu sonucuna vardı. Bu da orta yaşta ortaya çıkan yangının kritik olabileceğini düşündürüyor. Nitekim uzun süreli bir çalışmada 50'li yaşlarının sonlarında, kandaki yangı belirteçlerinin düzeyi yüksek olan erkeklerde ilerleyen yaşlarda Alzheimer gelişme olasılığının daha yüksek olduđu görülmüş. Cunha'ya göre 55 yaşında geçirilen bir viral enfeksiyonun etkileri onlarca yıl sonra Alzheimer'ın gelişimine katkıda bulunabilecek süreçleri tetikleyebilir. Ancak bunun nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor.

Geçmişte beyin, bađışıklık sisteminden büyük ölçüde izole bir organ olarak görülüyordu. Oysa artık vücuttaki farklı dokularda ortaya çıkan yangının beyni de etkileyebildiği biliniyor. Yangı sırasında salınan sitokinlerin kan yoluyla beyne ulaşabildiği ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi bozabilecek süreçleri tetikleyebileceği düşünülüyor. Yaşla birlikte kan-beyin bariyerinin daha geçirgen hâle gelmesi de bu etkinin orta yaşta neden daha belirgin olabileceğini açıklayabilir.

Bugün hâlâ kabul edilen yaygın görüş, Alzheimer'ın beyinde biriken beta-amiloid ve tau proteinlerinden kaynaklandığı yönünde. Ancak bu proteinleri hedefleyen tedavilerin sınırlı başarı göstermesi, bu birikimlerin hastalığın nedeni deđil, daha çok bir sonucu olabileceğini düşündürüyor.

Kaynak: <https://doi.org/10.64898/2026.02.09.26344392>