

# Geometria 2022-23 (Trombetti)

## Indice

<b>1</b>	<b>Lezione 01 - XX/03/2023</b>	<b>4</b>
1.1	Definizioni di base . . . . .	4
1.1.1	Prodotto Cartesiano . . . . .	4
1.1.2	Coppie . . . . .	4
1.1.3	Operazione Interna . . . . .	4
1.1.4	Operazione Esterna . . . . .	4
1.1.5	Prodotto Scalare Standard . . . . .	4
1.1.6	Matrice in $\mathbb{R}$ . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Lezione 04 - 17/03/2023</b>	<b>5</b>
2.1	Spazi Vettoriali su $\mathbb{R}$ . . . . .	5
2.2	Esempi Spazi Vettoriali . . . . .	5
2.2.1	Spazio Vettoriale numerico di ordine $n$ . . . . .	5
2.2.2	Spazio Vettoriale di una matrice di ordine $m, n$ . . . . .	6
2.2.3	Spazio Vettoriale polinomiale . . . . .	6
2.2.4	Spazio Vettoriale polinomiale di al più $n$ . . . . .	6
2.2.5	Spazio Vettoriale dei vettori geometrici in un punto $O$ . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Lezione 05 - 22/03/2023</b>	<b>7</b>
3.1	Spazi Vettoriali del Vettore Geometrico libero . . . . .	7
3.2	Proprietà Spazi Vettoriali . . . . .	7
3.3	Proporzionalità . . . . .	8
3.3.1	Esempi . . . . .	8
3.4	Combinazione Lineare . . . . .	8
3.4.1	Esempi . . . . .	8
3.5	SottoSpazi Vettoriali . . . . .	9
3.5.1	SottoSpazi Banali . . . . .	9
3.5.2	Esempi . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Lezione 06 - 24-03-2023</b>	<b>12</b>
4.1	Proprietà Sottospazio Vettoriale . . . . .	12
4.2	Sottospazio Generato . . . . .	12
4.2.1	Esempi . . . . .	12
4.3	Casi di Sottospazi Generati . . . . .	12
4.3.1	Esempio . . . . .	13
4.4	Proprietà Sottospazio Generato . . . . .	13

4.4.1	Esempio . . . . .	13
4.5	Dipendenza/Indipendenza Lineare . . . . .	14
4.5.1	Esempio . . . . .	14
4.6	Proprietà dipendenza lineare . . . . .	14
4.7	Relazione con la Generazione . . . . .	15
4.7.1	Esempio . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Lezione 07 - 29/03/2023</b>	<b>16</b>
5.1	Sottospazi Equivalenti . . . . .	16
5.1.1	Esempi . . . . .	16
5.2	Osservazioni sulla in/dipendenza . . . . .	17
5.2.1	Dipendenza . . . . .	17
5.2.2	Indipendenza . . . . .	17
5.2.3	Proprietà . . . . .	17
<b>6</b>	<b>Lezione 08 - 31/03/2023 (da migliorare)</b>	<b>19</b>
6.1	Boh . . . . .	19
6.2	Spazio Vettoriale Finitamente Generato . . . . .	19
6.2.1	Esempi . . . . .	19
6.3	Base . . . . .	19
6.3.1	Esempi . . . . .	20
6.4	Riferimenti . . . . .	20
6.5	Base Estratta . . . . .	20
6.6	Lemma di Steinz (no dim) . . . . .	20
6.7	Conseguenze Lemma di Steinz . . . . .	21
6.8	Dimensione . . . . .	21
6.9	Proposizioni (con dim) . . . . .	21
<b>7</b>	<b>Lezione 09 - 05/04/2023</b>	<b>22</b>
7.1	Proposizioni . . . . .	22
7.2	Corollari . . . . .	22
7.3	Teorema . . . . .	22
7.4	Relazione di Grossman . . . . .	22
7.4.1	Esempio . . . . .	23
<b>8</b>	<b>Lezione 10 - 12/04/2023</b>	<b>24</b>
8.1	Componenti . . . . .	24
8.1.1	Esempi . . . . .	24
8.2	Cambiamento di Riferimento (Formula di Passaggio) . . . . .	24
8.2.1	Matrice di Passaggio . . . . .	25
8.2.2	Esempio . . . . .	25
8.3	Ultima Osservazione Spazi Vettoriali . . . . .	25
8.4	Determinanti (matrice quadrata) . . . . .	26
8.4.1	Matrice Complementare . . . . .	26
8.4.2	Complemento Algebrico . . . . .	26
8.5	Determinante per Casi . . . . .	27
8.5.1	Matrice 2x2 . . . . .	27
8.5.2	Matrice 3x3 - Regola di Sarrus . . . . .	27

8.6	Proprietà sul Determinante . . . . .	27
<b>9</b>	<b>Lezione 11 - 14/04/2023</b>	<b>28</b>
9.1	Operazioni di Riga riguarda il Determinante . . . . .	28
9.2	Determinante di una Matrice a Gradini . . . . .	28
9.3	Invertibilità di una Matrice . . . . .	28
9.4	Minore di una Matrice (sottomatrice quadrata) . . . . .	28
9.5	Grado Massimo . . . . .	29
9.5.1	Esempio . . . . .	29
9.6	Orlato . . . . .	29
9.7	Minore Fondamentale . . . . .	29
9.7.1	Algoritmo per trovare Minore Fondamentale . . . . .	30
9.8	Teorema degli Orlati (NO DIM) . . . . .	30
9.8.1	Rango . . . . .	30
9.8.2	Corollari derivati . . . . .	31
9.9	Criteri di compatibilità sistemi di equazioni lineare . . . . .	31
9.9.1	Primo Criterio di Compatibilità . . . . .	31
<b>10</b>	<b>Lezione 12 - 19/04/2023</b>	<b>32</b>
10.1	Teorema di Rouché-Capelli . . . . .	32

# 1 Lezione 01 - XX/03/2023

## 1.1 Definizioni di base

### 1.1.1 Prodotto Cartesiano

Presi  $S, T \neq \emptyset$ , possiamo definire il prodotto cartesiano:

$$S \times T = \{(s, t) / s \in S, t \in T\}$$

$$S^2 = S \times S = \{(s, t) / s \in S, t \in T\}$$

Da non confondere con la definizione di diagonale:  $S^2 = S \times S = \{(s, s) / s \in S\}$ .

### 1.1.2 Coppie

La definizione di coppia è la seguente:

$$(s, t) = \{\{s, t\}, \{s\}\}$$

Negli insiemi l'ordine non conta  $\{s, t\} = \{t, s\}$ , invece nelle coppie è rilevante, infatti due coppie sono uguali se e solo sono ordinatamente uguali:

$$(s, t) = (s', t') \Leftrightarrow s = s', t = t'$$

Andiamo a dimostrare questa affermazione:

- DIM  $\Leftarrow$ : BANALE
- DIM  $\Rightarrow (s, t) = (s', t') \Leftrightarrow \{\{s, t\}, \{s\}\} = \{\{s', t'\}, \{s'\}\}$   
Ragioniamo per casi:

a SE  $s = t$ :

$$Sx: \{\{s, t\}, \{s\}\} \Rightarrow \{\{s, s\}, \{s\}\} \Rightarrow \{s\}$$

$$Dx: \{\{s', t'\}, \{s'\}\} \Rightarrow \{\{s', s'\}, \{s'\}\} \Rightarrow \{s'\}$$

b SE  $s \neq t$ :

Usiamo le definizioni di uguaglianza tra insiemi:

$$\{s\} = \{s'\} \Rightarrow s = s'$$

$$\{s, t\} = \{s', t'\} \wedge s = s' \Rightarrow t = t'$$

### 1.1.3 Operazione Interna

### 1.1.4 Operazione Esterna

### 1.1.5 Prodotto Scalare Standard

### 1.1.6 Matrice in $\mathbb{R}$

## 2 Lezione 04 - 17/03/2023

### 2.1 Spazi Vettoriali su $\mathbf{R}$

Sia  $V$  un insieme non vuoto, definiamo due operazioni:

Interna  $+$  :  $V \times V \rightarrow V$  (somma vettoriale)

Esterna  $\cdot$  :  $\mathbf{R} \times V \rightarrow V$  (scalare per un vettore)  $\mathbf{R}$  è campo

Posto  $(V, +, \cdot)$  si dice **spazio vettoriale su  $\mathbf{R}$**   $\Leftrightarrow$

1.  $(V, +)$  è un gruppo abeliano, quindi:
  - Associatività
  - Commutatività
  - Neutro
  - Tutti gli elementi invertibili
2.  $\forall \underline{v} \in V$  tale che  $\underline{v} \cdot 1 = \underline{v}$  (associatività mista)
3.  $\forall h, k \in \mathbf{R}, \forall \underline{v} \in V$  tale che  $(hk)\underline{v} = h(k\underline{v})$
4.  $\forall h, k \in \mathbf{R}, \forall \underline{v} \in V$  tale che  $(h + k) \cdot \underline{v} = h \cdot \underline{v} + k \cdot \underline{v}$  (distrib. tra  $\cdot$  e  $+$  in  $\mathbf{R}$ )
5.  $\forall h, k \in \mathbf{R}, \forall \underline{v} \in V$  tale che  $h(\underline{v} + \underline{w}) = h \cdot \underline{v} + h \cdot \underline{w}$  (distrib. tra  $\cdot$  e  $+$  in  $V$ )

### 2.2 Esempi Spazi Vettoriali

#### 2.2.1 Spazio Vettoriale numerico di ordine $n$

Verifichiamo che  $(\mathbf{R}^n, +, \cdot)$  sia uno spazio vettoriale, ma prima facciamo un esempio:

$$(1, 2, 3) + (0, 1, 2) = (1, 3, 5) \quad 3(3, 2, 4) = (9, 6, 12)$$

Andiamo a verificare che sia spazio vettoriale:

1.  $(\mathbf{R}^n, +)$  gruppo abeliano:
  - \* Associatività e Commutatività banalmente ereditati da  $+$
  - \* Neutro:  $\underline{0} = (0, 0, \dots, 0)$
  - \* Inverso:  $-(x_1, \dots, x_n) = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$
2. Banale eredità di  $\cdot$
3.  $(hk)(x_1, \dots, x_n) = (h k x_1, \dots, h k x_n) = h(k x_1, \dots, k x_n) = h(k(x_1, \dots, x_n))$
4. DA DIMOSTARE
5. DA DIMOSTARE

### **2.2.2 Spazio Vettoriale di una matrice di ordine $m,n$**

Possiamo considerare  $(M_{m,n}(R), +, \cdot)$  come una lunga riga, quindi si accomuna al caso precedente.

### **2.2.3 Spazio Vettoriale polinomiale**

### **2.2.4 Spazio Vettoriale polinomiale di al più $n$**

### **2.2.5 Spazio Vettoriale dei vettori geometrici in un punto $O$**

### 3 Lezione 05 - 22/03/2023

#### 3.1 Spazi Vettoriali del Vettore Geometrico libero

#### 3.2 Proprietà Spazi Vettoriali

Preso  $(V, +, \cdot)$  Spazio Vettoriali andiamo a definire le seguenti proprietà:

1)  $\underline{v} + \underline{w} = \underline{z} \Rightarrow \underline{v} = \underline{z} - \underline{w} = \underline{z} + (-\underline{w})$

Dim:

Sommiamo l'opposto di  $\underline{w}$  a entrambi i membri:

$$(\underline{v} + \underline{w}) + (-\underline{w}) = \underline{z} + (-\underline{w}) \Rightarrow \underline{v} = \underline{z} - \underline{w}$$

2)  $\underline{v} + \underline{w} = \underline{w} \Rightarrow \underline{v} = \underline{0}$  **NEUTRO**

3)  $\forall \underline{v} \in V, \forall h \in \mathbb{R}$

$$0 \cdot \underline{v} = \underline{0} = h \cdot \underline{0}$$

Dim primo lato:

$$0 \cdot \underline{v} = (0 + 0)\underline{v} = 0 \cdot \underline{v} + 0 \cdot \underline{v} \Rightarrow 0 \cdot \underline{v} = \underline{0}$$

Dim secondo lato:

$$h \cdot \underline{0} = h \cdot (\underline{0} + \underline{0}) = h \cdot \underline{0} + h \cdot \underline{0} \Rightarrow h \cdot \underline{0} = \underline{0}$$

4)  $\forall \underline{v} \in V, \forall h \in \mathbb{R}$  **Legge annullamento del prodotto**

$$h\underline{v} = \underline{0} \Leftrightarrow h = 0 \text{ oppure } \underline{v} = \underline{0}$$

Dim  $\Leftarrow$ : Vale per la 3)

Dim  $\Rightarrow$ :  $h \cdot \underline{v} = \underline{0}$

Poniamo  $h \neq 0$  e moltiplichiamo entrambi i membri per  $h^{-1}$ :

$$h^{-1}(h \cdot \underline{v}) = h^{-1}\underline{0} \Rightarrow (h^{-1}h)\underline{v} = \underline{v}$$

5)  $h(-\underline{v}) = -(h\underline{v}) = (-h)\underline{v}$

Dim:  $(-h)\underline{v} = -(h\underline{v})$ : Dobbiamo dimostrare che sia opposto, quindi:

$$(-h)\underline{v} + h\underline{v} = \underline{0}$$

$$(-h + h)\underline{v} = \underline{0}\underline{v}$$

Dim:  $h(-\underline{v}) = -(h\underline{v})$

$$h(-\underline{v}) + h\underline{v} = h(-\underline{v} + \underline{v}) = h \cdot \underline{0} = \underline{0}$$

6)  $(-1)\underline{v} = -\underline{v}$  Corollario immediato

7)  $(\underline{v} + \underline{w}) + \underline{z} = \underline{v} + (\underline{w} + \underline{z})$

Dato che l'associatività si può sempre ridurre a due elementi, possiamo assumere la associatività generalizzata, questo ci permette di omettere le parentesi.

8) Lo stesso concetto del punto 7) si può applicare per la commutatività, quindi se vale per due elementi vale anche per  $n$  elementi, quindi possiamo ordinare gli elementi come ci pare.

9) Stesso concetto del punto 7)e8) vale anche per la distributività.

### 3.3 Proporzionalità

Presi  $\underline{v}, \underline{w} \in V$  si dicono **proporzionali**  $\Leftrightarrow$

$$\exists h \neq 0 \quad \underline{v} = h\underline{w}$$

La proporzionalità è una **Relazione di Equivalenza**, quindi valgono le tre proprietà:

Riflessiva:  $\underline{v} = 1\underline{v}$

Simmetrica:  $\underline{v} = h\underline{w} \Rightarrow h^{-1}\underline{v} = \underline{w}$

Transitiva:  $\underline{v} = h\underline{w}$  e  $\underline{w} = k\underline{z} \Rightarrow \underline{v} = h(k\underline{z}) = (hk)\underline{z} \quad (h, k \neq 0)$

#### 3.3.1 Esempi

Indicheremo con la tilde  $\sim$  la proporzionalità.

$R^3$

$$(1, 2, 0) \sim (2, 4, 0)$$

$$(1, 2, 0) \not\sim (0, 0, 0)$$

$Rx$

$$1 + x^{40} \sim 2 + 2x^{40}$$

### 3.4 Combinazione Lineare

$\underline{v}$  è combinazione lineare dei vettori  $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \Leftrightarrow$

$$\exists h_1, \dots, h_n \in \mathbb{R} : \underline{v} = h_1 \cdot \underline{v}_1 + \dots + h_n \cdot \underline{v}_n$$

(Sia i vettori  $\underline{v}$  che gli scalari  $h$  possono essere diversi tra loro)

#### 3.4.1 Esempi

$R^3$

$(1, 2, 1)$  è combinazione lineare  $(2, 4, 2)$  con  $h = 2$

$R^2$

$(1, 2)$  è combinazione lineare di  $(1, 1), (0, 1)$

$$(1, 2) = 1(1, 1) + 1(0, 1)$$

$R^3$

$(1, 2, 1)$  è combinazione lineare di  $(1, 2, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$ ?

$$(1, 2, 1) = x_1(1, 2, 0) + x_2(0, 1, 1) + x_3(1, 1, 1)$$

Come possiamo notare in questo caso non è immediato trovare la soluzione, quindi possiamo ricorrere a un sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 & + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & x_2 + x_3 = 1 \end{cases} \begin{cases} \dots & \\ 2x_1 & = 1 \\ \dots & \end{cases} \begin{cases} \dots & \\ x_1 & = \frac{1}{2} \\ \dots & \end{cases} \begin{cases} x_3 + \frac{1}{2} = 1 \\ \dots & \\ \dots & \end{cases} \begin{cases} x_3 = -\frac{1}{2} \\ x_1 & = \frac{1}{2} \\ x_2 & = \frac{1}{2} \end{cases}$$



$Rx \ 1 + x + x^2$  è combinazione lineare di  $1 + x, 1 + x^2$

$$1 + x + x^2 = h(1 + x) + k(1 + x^2) = kx^2 + hx + (h + k)$$

$$\begin{cases} h + k = 1 \\ h = 1 \\ k = 1 \end{cases} \text{ Nonhasoluzione}$$

### 3.5 SottoSpazi Vettoriali

Preso  $V$  spazio vettoriale, e  $H \subseteq V$ . Dim:

$H$  stabile (chiuso) rispetto a  $+$

$$\forall \underline{v}, \underline{w} \in H \Rightarrow \underline{v} + \underline{w} \in H$$

$H$  stabile (chiuso) rispetto a  $\cdot$

$$\forall h \in \mathbb{R}, \forall \underline{v} \in H \ h\underline{v} \in H$$

$H$  sottospazio vettoriale se è stabile  $+$  e  $\cdot$

$$+_H : H \times H \rightarrow H \ (\underline{v}, \underline{w}) \mapsto \underline{v} +_v \underline{w}$$

$$\cdot_H : \mathbb{R} \times H \rightarrow H \ (h, \underline{v}) \mapsto h \cdot_v \underline{v}$$

Per semplicità d'ora in poi ometteremo i pedici, quindi ora dimostriamo che  $(H, +, \cdot)$  sia sottospazio vettoriale:

- $(H, +)$  gruppo abeliano

$$\text{Commutativa: } \underline{v} +_h \underline{w} = \underline{v} +_v \underline{w} = \underline{w} +_v \underline{v} = \underline{w} +_h \underline{v}$$

Associtività: IDEM

Neutro:  $\underline{v} \cdot 0 = \underline{0} \in H$  Poiché stabile

$$\text{Opposto: } (-1)\underline{v} = -\underline{v}$$

- $1 \cdot_h \underline{v} = 1 \cdot_v \underline{v} = \underline{v}$
- Distributività 1: DA FARE
- Distributività 2: DA FARE

**IL VETTORE NULLO C'È SEMPRE!!!**

#### 3.5.1 SottoSpazi Banali

D'ora in poi indicheremo i sottospazi con  $\leq$ , esistono sempre due sottospazi banali:

$$1) (\{\underline{0}, +, \cdot\}) \ \{\underline{0}\} \leq V$$

$$2) V \leq V \text{ Estremamente banale}$$

DA CHEKKARE: Ricordare anche che l'unico sottospazio finito possibile è  $\{\underline{0}, \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\} = \{\underline{0}\}$

### 3.5.2 Esempi

Per dimostrare che un insieme sia sottospazio bisogna sempre verificare che sia **non vuoto, stabile rispetto a + e ·**.

$R^3$

$$H_1 = \{(x, y, z) \in R^3 / x = y\}$$

1

Non vuoto: banale

Stabile +:

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

Rispetta le proprietà poiché  $x_1 + x_2 = y_1 + y_2$  essendo  $x_1 = y_1$  e  $x_2 = y_2$

Stabile ·:

$$h(x_1, y_1, z_1) = (hx_1, hy_1, hz_1)(hx_1 = hy_1)$$

$R_{2,2}$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} \leq \mathbb{R}^2$$

Questo insieme non è sottospazio vettoriale poiché non è stabile +:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \notin$$

$R^3$

$$H = \{(x, y, z) \in R^3 / x = y^2\} \leq R^3$$

Non è lineare quindi molto probabilmente non è sottospazio:

$$\textbf{Controesempio: } (2, 4, 0) + (3, 9, 0) = (5, 15, 0) \textbf{ MA } 5 = 15 \neq 5^2$$

$R^3$

$$H = \{(x, y, z) \in R^3 / x + y + z = 1\} \leq R^3$$

Non è omogeneo quindi molto probabilmente non è sottospazio:

$$\textbf{Controesempio } (1, 0, 0) + (0, 0, 1) = (1, 0, 1) \textbf{ MA } 1 + 0 + 1 \neq 1$$

$R_2x \leq R_3x \leq \dots \leq Rx$

$$\{p(x) \in R_4x / \text{grad} p(x) = 3\}$$

Il neutro ha necessariamente grado diverso da 3 quindi non può essere sottospazio

---

<sup>1</sup>Truchetto per gli esercizi: se un sottospazio è costituito da un'equazione ed è lineare ed omogenea quasi sempre è sottospazio caso contrario no

•

$$\{p(x) \in R_4x / \text{grad} p(x) = 3 \text{ oppure } \text{grado } p(x) = 0\}$$

Ora ammette neutro ma non è comunque stabile poiché  $(x^3 + 3) + (-x^3 + 5) = 8 \neq H$

•

$$\{P(x) \in Rx / p(-x) = p(x)\}$$

Stiamo considerando tutti i polinomi pari poiché  $-x^{n_{\text{pari}}} = x^n$

È sottospazio poiché la somma tra pari rimane pari, idem il prodotto.

Caso particolare

$$\{(0, x) / x \in \mathbb{R}\} \cup \{(y, 0) / y \in \mathbb{R}\} \leq \mathbb{R}^2$$

Questo non è sottospazio vettoriale poiché non è stabile rispetto al  $+$  poiché  $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin$

Però presi singolarmente sono sottospazi ma la loro unione no.

## 4 Lezione 06 - 24-03-2023

### 4.1 Proprietà Sottospazio Vettoriale

la somma di  $n$  oggetti Siano  $\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n \in W$  si ha  $w_1 + w_2 \in W \Rightarrow$

sottospazi vettoriali Sia  $\mathbb{L}$  una famiglia di sottospazi di  $V$ , l'intersezione dei sottospazi della famiglia  $\mathbb{L}$  è un sottospazio e si indica:

$$\bigcap_{L \in \mathbb{L}} L$$

L'intersezione di una qualunque famiglia di sottospazi è un sottospazio.  
Dimostriamolo:

Neutro: Il neutro è un elemento comune, quindi è sempre contenuto.

Stab +: Siano  $\underline{v}, \underline{w} \in \bigcap_{L \in \mathbb{L}} L \Rightarrow \forall L \in \mathbb{L} \Rightarrow \underline{v}, \underline{w} \in L \Rightarrow \underline{v} + \underline{w} \in \bigcap_{L \in \mathbb{L}} L$

Stab  $\cdot$ : Siano  $\underline{v} \in \bigcap_{L \in \mathbb{L}} L, h \in \mathbb{R} \Rightarrow \forall L \in \mathbb{L} \Rightarrow \underline{v}, \underline{w} \in L \Rightarrow \underline{v} + \underline{w} \in \bigcap_{L \in \mathbb{L}} L$

### 4.2 Sottospazio Generato

Sia  $S \subseteq V$ , indicheremo con  $\langle S \rangle$  il **sotto spazio generato da S**.

$$\langle S \rangle = \bigcap_{L \in \mathbb{L}_s} L$$

$$\mathbb{L}_s = \{W \leq V / S \subseteq W\}$$

**Intersezione dei sottospazi di V che contengono S**

In altri termini: è il più piccolo sottospazio rispetto all'intersezione.

#### 4.2.1 Esempi

Poniamo  $H \leq V$

- $\langle H \rangle = H$  SEMPRE!
- $\langle \{0\} \rangle = \{0\}$
- $\langle V \rangle = V$
- $\langle \emptyset \rangle = 0$  Singleton dell'elemento neutro, poiché appartiene ad ogni elemento.

### 4.3 Casi di Sottospazi Generati

$S = H \cup K$  con  $H, K \leq V$

$$\langle H \cup K \rangle = H + K = \{\underline{h} + \underline{k} / \underline{h} \in H, \underline{k} \in K\}$$

Dim: Come sempre per dimostrare l'uguaglianza dobbiamo dimostrare la doppia inclusione:

$$\langle H \cup K \rangle \subseteq \text{al contrario } H + K = \{\underline{h} + \underline{k} / \underline{h} \in H, \underline{k} \in K\}$$

non ho capito

Dimostriamo che sia spazio vettoriale:

Neutro

$$\underline{0} = \underline{0}^{\text{preso da H}} + \underline{0}^{\text{preso da K}}$$

Stabile +

$$\begin{aligned}(\underline{h} + \underline{k}) + (\underline{h}' + \underline{k}') &\in H + K \\ (h + h') + (k + k') &\end{aligned}$$

Stabile ·

$$\alpha(\underline{h} + \underline{k}) = \alpha\underline{h} + \alpha\underline{k}$$

#### 4.3.1 Esempio

$$H = \{(0, k)/x \in \mathbb{R}\} \quad K = \{(y, 0)/y \in \mathbb{R}\}$$

$$< H \cup K > = H + K = (0 + y, x + 0) = \mathbb{R}^2$$

### 4.4 Proprietà Sottospazio Generato

Posto  $H, K \leq V$ , allora valgono le seguenti proprietà:

- $H \oplus K$  si dicono in somma diretta se  $H \cap K = \{0\}$  (neutro)
- $H + K = V$  allora  $H, K$  si dicono supplementari
- $H \oplus K = V$  allora si dicono complementari (in altri termini devono essere in somma diretta e supplementari).<sup>2</sup>

#### 4.4.1 Esempio

Posti  $\{0\}$  e  $V$ :

$$\text{Somma diretta: } \{0\} \oplus V = \{0\} \cap V = \{0\}$$

$$\text{Supplementari: } \{0\} + V = V$$

Complementare: Dato che è sia somma diretta che supplementare

In generale,  $H \leq K \Rightarrow H + K = K$

Ponendoci in  $\mathbb{R}^3[x]$  e presi  $\mathbb{R}^2[x], \mathbb{R}^3[x] \leq \mathbb{R}^3[x]$ , possiamo dire:

- NON Somma diretta:  $\mathbb{R}^2[x] \oplus \mathbb{R}^3[x] \neq \{0\}$
- Supplementari:  $\mathbb{R}^2[x] + \mathbb{R}^3[x] = \mathbb{R}^3[x]$
- Complementari: no poiché manca la somma diretta.

---

<sup>2</sup>È un concetto un po' strano, perché vuol dire somma normale (quindi caso 2), ma ricordandoci che l'intersezione da il neutro (quindi caso 1)

Ponendoci invece  $\mathbb{R}^4[x]$  e presi  $\mathbb{R}^2[x], \mathbb{R}^3[x] \leq \mathbb{R}^4[x]$ , possiamo dire:

- NON Somma diretta:  $\mathbb{R}^2[x] \oplus \mathbb{R}^3[x] \neq \{0\}$
- NON Supplementari:  $\mathbb{R}^2[x] + \mathbb{R}^3[x] = \mathbb{R}^3[x] \neq \mathbb{R}^4[x]$
- Complementari: no poiché manca la somma diretta.

## 4.5 Dipendenza/Indipendenza Lineare

Sia  $V$  uno spazio vettoriale e siano  $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in V$ , sono detti **linearmente dipendenti** (o legati)  $\Leftrightarrow$

$$\exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \neq (0, 0, \dots, 0) = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

La loro combinazione lineare deve essere il vettore nullo. Se tali scalari non esistono allora si dice che sono **linearmente indipendenti** (o liberi), l'unica soluzione valida è quella formata da tutti zero:  $0\underline{v}_1 + \dots + 0\underline{v}_n = \underline{0}$ .

**Se non sono dipendenti  $\Rightarrow$  Sono indipendenti**

### 4.5.1 Esempio

Posto  $\mathbb{R}^2$  facciamo i seguenti esempi:

$$(1, 1), (1, 0), (3, 0) \text{ sono dipendenti } 0(1, 1) + (-3)(1, 0) + 1(3, 0) = (0, 0)$$

$(1, 1), (1, 0)$  sono indipendenti  $x(1, 1) + y(1, 0) = (0, 0)$  MA unica soluzione possibile  $(0, 0)$  quindi so

## 4.6 Proprietà dipendenza lineare

1)  $\underline{0}$  dipende sempre da qualunque sistema

$$\underline{0} = 0\underline{v}_1 + \dots + 0\underline{v}_n$$

2) Sia  $\underline{v}$  dipendente da  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  e ciascun  $\underline{v}_i$  dipende da  $\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \Rightarrow \underline{v}$  dipende da  $\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m$ <sup>3</sup>

Dim:

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \text{ (dipende come da tesi)}$$

$$\forall i, \underline{v}_i = \beta_{i,1} \underline{w}_1 + \dots + \beta_{i,m} \underline{w}_m \text{ (ogni } \underline{v}_i \text{ dipende a sua volta da un } \underline{w}_i)$$

$$\underline{v} = \alpha_1 (\beta_{1,1} \underline{w}_1 + \dots + \beta_{1,m} \underline{w}_m) + \dots + \alpha_n (\beta_{n,1} \underline{w}_1 + \dots + \beta_{n,m} \underline{w}_m)$$

$$\underline{v} = \gamma_1 \underline{w}_1 + \dots + \gamma_m \underline{w}_m \text{ (compattiamo)}$$

3)  $\underline{v}_i$  dipende da  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$

$$\underline{v}_i = 0\underline{v}_1 + \dots + 0\underline{v}_n$$

---

<sup>3</sup>Una specie di transitività della dipendenza

- 4)  $\underline{v}, \underline{w}$  dipende da  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \Rightarrow \underline{v} + \underline{w}$  dipende da  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$   
 Dim:

$$\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$$

$$\underline{w} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n$$

$$\underline{v} + \underline{w} = (\alpha_1 + \beta_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) \underline{v}_n$$

- 5)  $\underline{v}$  dipende da  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \Rightarrow h\underline{v}$  dipende da  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$

## 4.7 Relazione con la Generazione

Posti  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$  allora:

$$\langle \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \rangle = \{h_1 \underline{v}_1, \dots, h_n \underline{v}_n / h_i \in R\} \text{ Copertura Lineare}$$

In altre parole:

$$\underline{v} \in \langle \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \rangle \text{ se } \underline{v} \text{ dipende dai vettori } \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$$

Dim sottospazio:

- Neutro: vale per la 1)
- Stabile +: vale per la 4)
- Stabile  $\cdot$ : vale per la 5)

### 4.7.1 Esempio

boh non si è capito nulla in classe

## 5 Lezione 07 - 29/03/2023

### 5.1 Sottospazi Equivalenti

Siano  $S_1, S_2 \leq V$  si dicono **equivalente** se e solo se generano lo stesso sottospazio vettoriale quindi:

$$\Leftrightarrow \langle S_1 \rangle = \langle S_2 \rangle$$

( $\langle S_1 \rangle, \langle S_2 \rangle$  si dicono sistema di generatori)

#### 5.1.1 Esempi

Presi  $\underline{v}, \underline{v}, \underline{0}, \underline{w}$  equivale a  $\underline{v}, \underline{w}$ ?

Dobbiamo andare a verificare che ogni elemento di  $S_1$  si possa scrivere come combinazione lineare di  $S_2$ , quindi dobbiamo andare a verificare la doppia inclusione.

In questo possiamo notare come vale l'equivalenza poiché, possiamo levare la doppia ripetizione di  $\underline{v}$  dal  $S_1$ , e  $\underline{0}$  essendo il neutro deve essere necessariamente presente per essere sottospazio, quindi vale la doppia inclusione.

Ponendoci in  $\mathbb{R}^3$  consideriamo il seguente sottospazio:

$$\langle (1, 2, 1), (2, 4, 2), (0, 0, 1), (1, 2, 50) \rangle$$

Possiamo notare come  $(2, 4, 2)$  e  $(1, 2, 50)$  sono combinazioni lineari, questo ci permette di eliminarli, quindi:

$$\langle (1, 2, 1), (0, 0, 1) \rangle \quad \textbf{Base}$$

Questi due elementi sono indipendenti poiché l'unica combinazione possibile è  $h = k = 0$ .

Consideriamo  $\mathbb{R}^n$  come sempre possiamo considerare la matrice come una lunga riga.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 50 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 49 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 49 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Le trasformazioni di riga ( $E_1, E_2, E_3, E_4$ ) mantengono i sottospazi.

Le righe non nulla di una matrice sono sempre sistemi indipendenti.

Poniamoci in  $\mathbb{R}_2[x]$  e prendiamoci:

$$\langle x^2 + 2x + 1, 2x^2 + 4x + 2, 1, x^2 + 2x + 50 \rangle$$

Possiamo considerarlo anche solo i termini senza le incognite:

$$\langle (1, 2, 1), (2, 4, 2), (0, 0, 1), (1, 2, 50) \rangle$$

Possiamo portarla in forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 50 \end{pmatrix}$$



E possiamo portarla a gradini:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quello che ci viene alla fine è:

$$\langle x^2 + 2x + 1, 1 \rangle$$

## 5.2 Osservazioni sulla in/dipendenza

### 5.2.1 Dipendenza

Sia  $v_1, \dots, v_n \in V$ <sup>4</sup> sono linearmente dipendenti  $\Leftrightarrow \exists i : \underline{v}_i$  dipende dai rimanenti.

Dim:

Per ipotesi sappiamo:

$$\exists h_1, \dots, h_n \neq (0, 0, \dots, 0) : h_1 \underline{v}_1 + \dots + h_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

Supponiamo  $h_1 \neq 0$  allora:

$$\underline{v}_1 = h_1^{-1}(-h_2 \underline{v}_2 + \dots + (-h_n) \underline{v}_n)$$

Quindi  $\underline{v}_1$  è combinazione lineare di  $\underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$  quindi dipende da questi vettori.  
(vale anche il viceversa).

### 5.2.2 Indipendenza

Per scrivere l'indipendenza ci basta unicamente fare il negato della dipendenza:

$v_1, \dots, v_n \in V$  sono indipendenti  $\Leftrightarrow \forall \underline{v}_i : \underline{v}_i$  non dipende da:  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$

### 5.2.3 Proprietà

Sia  $V$  spazio vettoriale, definiamo le seguenti proprietà:

- Se  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  dipendono aggiungere  $\underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n$  fa rimanere la dipendenza.
- Se  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n$  sono indipendenti allora andando a restringere a  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  rimane indipendente.
- Se  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  sono indipendenti allora c'è **l'unicità di scrittura**.

$$\underline{v} = h_1 \underline{v}_1, \dots, h_n \underline{v}_n$$

$$\underline{v} = k_1 \underline{v}_1, \dots, k_n \underline{v}_n$$

$$\Rightarrow h_1 = k_1$$

---

<sup>4</sup>Consideriamo  $n \geq 2$  perché se  $n = 1$  i casi si riducono unicamente a:  $\underline{v} \neq \underline{0}$  indipendente e  $\underline{v} = \underline{0}$  dipendente

Dim:

Spostiamo tutto da un lato e raggruppiamo:

$$(h_1 - k_1)\underline{v}_1 + \dots + (h_n - k_n)\underline{v}_n = \underline{0}$$

$$h_i - k_i = 0 \Leftrightarrow h_i = k_i$$

- Presi  $W_1, W_2 \leq V$  e per ipotesi in somma diretta  $W_1 \cap W_2 = \{\underline{0}\}$  e presi  $\underline{0} \neq \underline{v} \in W_1$  e  $\underline{0} \neq \underline{w} \in W_2$  allora  $\underline{v}$  e  $\underline{w}$  **sono indipendenti**.

Dim:

**da aggiungere**

- Generalizziamo il caso precedente considerando  $W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_n$  cioè  $W_1 \cap (W_2 + \dots + W_n) = \{\underline{0}\}$  e prendiamo un vettore a loro corrispondente diversi da zero, diremo  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  che sono indipendenti.

Dim:

$$h_1\underline{v}_1, \dots, h_n\underline{v}_n = \underline{0}$$

Spostiamo tutto da un lato:

$$\begin{array}{ccc} h_1\underline{v}_1 = -h_2\underline{v}_2 + \dots + (-h_n\underline{v}_n) = \underline{0} \\ \parallel & & \parallel \\ W_1 & & W_2 + \dots + W_n \end{array}$$

$$h_1\underline{v}_1 = \underline{0} \Rightarrow h_1 = 0$$

- La somma diretta implica l'unicità di scrittura

## 6 Lezione 08 - 31/03/2023 (da migliorare)

### 6.1 Boh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

### 6.2 Spazio Vettoriale Finitamente Generato

Sia  $V$  spazio vettoriale si dice **finitamente generato**  $\Leftrightarrow$

$$\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V/V = \langle \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \rangle$$
$$\langle \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \rangle \text{ generatori}$$

Uno spazio vettoriale è finitamente generabile se ogni elemento di  $V$  può essere scritto come combinazione lineare di  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ .

#### 6.2.1 Esempi

•

$$\mathbb{R}^3 = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$$

•

$$\mathbb{R}^4 = \mathbb{R}_{2,2} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

•

$$\mathbb{R}_2[x] = \langle 1, x, x^2 \rangle (ax^2 + bx + c)$$

•

$$\mathbb{R}[x] \text{ NON È FINITAMENTE GENERATO}$$

### 6.3 Base

Sia  $V$  uno spazio vettoriale finitamente generato <sup>5</sup>, un sistema indipendente di generatori è detto base  $\Leftrightarrow$

$\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  hanno le seguenti proprietà:

1) Sono indipendenti

2)  $V = \langle \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \rangle$

---

<sup>5</sup>D'ora in poi sarà standard e sarà abbreviato in S.V. F.G

### 6.3.1 Esempi

- $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0), (0, 1), (0, 0) \rangle$  non è una base poiché no indipendente
- $\mathbb{R}^2 = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle$  base (canonica e riferimento)
- $\mathbb{R}^n = \langle (1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1) \rangle$  base (canonica)
- $\mathbb{R}_{2,2} = \langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle$  base (canonica e riferimento)
- $\mathbb{R}^2 = \langle (2, 3), (1, 2) \rangle$  base (non canonica)
- $\mathbb{R}[x] = \langle x^2, x, 1 \rangle$  base (canonica e riferimento)

### 6.4 Riferimenti

Un **riferimento** è una **base ordinata**.

Negli esempi sopra un riferimento è una base con quell'ordine di elementi.

### 6.5 Base Estratta

Sia  $V = \langle \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \rangle$  da  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  posso estrarre una base.

Poniamo  $\mathbb{R}^2 = (1, 0), (0, 1), (2, 3)$ , possiamo levare  $(2, 3)$ .

Supponiamo  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$  dipendenti.

$\exists \underline{v}_i$  dipendono dai rimanenti da  $\underline{v}_{i+1}, \dots, \underline{v}_n$

$$\mathbb{R} = \langle 1 \rangle \text{ base}$$

$$\mathbb{R}^2 = (1, 3), (0, 1), (4, 6), (5, 1), (0, 5), (5, 6)$$

$$(1, 3), (0, 1) \text{ base estratta}$$

$(1, 3), (0, 1)$  è base estratta poiché  $(4, 6), (5, 1), (0, 5), (5, 6)$  poiché sono tutti proposizionali e quindi si possono ricavare da  $(1, 3), (0, 1)$

### 6.6 Lemma di Steinz (no dim)

Se ho  $m$  vettori linearmente indipendenti contenuti in un sottospazio generato da  $n$  vettori allora il numero di generatori è maggiore o uguale del numero di vettori indipendenti.

Sia  $V$  spazio vettoriale:

$$\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m \text{ indep. } \in \langle \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_n \rangle$$

$$m \leq n$$

## 6.7 Conseguenze Lemma di Steinz

- Tutte le basi hanno lo stesso numeri di elementi (vettori)  
Dim:
- 

## 6.8 Dimensione

La dimensione di una spazio vettoriale  $V$  si scrive nel seguente modo  $\dim(V)$  indica la **cardinalità di una base**.

Esempi:

- $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$
- $\dim(\mathbb{R}_{n,m}) = n * m$
- $\dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$
- $\dim(\mathbb{R}[x]) = \infty$
- $\dim(V) = n$
- $V = \{0\} \dim(V) = 0$

## 6.9 Proposizioni (con dim)

Sia  $V_n$  spazio vettoriale e  $n$  la sua dimensione, i seguenti enunciati sono tra loro equivalenti per  $v_1, \dots, v_n$ :

- 1) Base
- 2) Sistema di Generatori miniale
- 3) Sistema di Generatori di ordine minimo
- 4) Sistema indipendente massimale
- 5) Sistema indipendente di ordine massimo

## 7 Lezione 09 - 05/04/2023

### 7.1 Proposizioni

Sia  $V$  uno spazio vettoriale finitamente generato, definiamo le seguenti proposizioni:

- 1)  $W \leq V \Rightarrow W$  finitamente generato.

Dim:

Poniamo per assurdo che  $W$  non sia finitamente generabile, questo significa che esiste un  $\underline{v}_1 \in W$  ne consegue:  $\langle \underline{v}_1 \rangle \neq W$ .

Quindi esiste un  $\underline{v}_2 \in W \setminus \langle \underline{v}_1 \rangle$  con  $\underline{v}_1$  e  $\underline{v}_2$  indipendenti, ne consegue sempre che  $\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2 \rangle \neq W$  altrimenti sarebbe finitamente generabile.

Quindi continuando con lo stesso procedimento arriviamo a trovare  $n+1$  vettori indipendenti, arriviamo ad un assurdo, ne consegue che  $W$  **SIA FINITAMENTE GENERABILE**.

- 2)  $\dim(W) \leq \dim(V)$

- 3)  $W = V \Leftrightarrow \dim(W) = \dim(V) = n$

Dim  $\Rightarrow$ : OVVIO

Dim  $\Leftarrow$ :

Prendiamo una base per  $W$ :  $\underline{e}_1, \underline{e}_2, \dots, \underline{e}_n$ , essendo una base è indipendente sia per  $W$  e  $V$ , per i teoremi visti a lezione scorsa???, è base anche per  $V$ .

### 7.2 Corollari

Sia  $V$  S.V.F.G e  $W \leq Z \leq V$ , definiamo i seguenti corollari:

- 1)  $W \leq Z \Rightarrow \dim(W) \leq \dim(Z)$

- 1)  $W = Z \Rightarrow \dim(W) = \dim(Z)$

### 7.3 Teorema

Se  $H_1, \dots, H_n \leq V$  sono sottospazi in somma diretta allora:

$$(H_1 \oplus \dots \oplus H_n) = \dim H_1 + \dots + \dim H_n$$

Dim:

Prendiamo delle basi per ogni sottospazio:

$H_1$ :  $\underline{e}_{1,1}, \dots, \underline{e}_{1,v_1}$  con  $\underline{v}_1 = \dim(H_1)$   $H_2$ :  $\underline{e}_{2,1}, \dots, \underline{e}_{2,v_2}$  con  $\underline{v}_2 = \dim(H_2)$  ...  $H_n$ :  $\underline{e}_{n,1}, \dots, \underline{e}_{n,v_n}$  con  $\underline{v}_n = \dim(H_n)$  (il primo pedice identifica lo spazio vettoriale, il secondo il numero dell'elemento)

### 7.4 Relazione di Grassman

È utile quando due sottospazi non sono in somma diretta.

Siano  $H, K \leq V$  allora la loro dimensione è data da:

$$\dim H + K = \dim H + \dim K - \dim H \cap K$$

La formula di solito si usa al contrario poiché calcolare  $\dim H \cap K$  è molto complesso.  
 Esempio:  $\langle (1, 0), (1, 3) \rangle \cap \langle (1, 0), (4, 5) \rangle \neq \langle (1, 0) \rangle$  NON FARE ALL'ESAME  
 la risposta corretta è  $\mathbb{R}^2$ .

Questo poiché:  $\dim H = 2$ ,  $\dim K = 2$ ,  $\dim H + K = 2$  quindi  $\dim H \cap K = 2$ . **Dim:**  
 DA INSERIRE

#### 7.4.1 Esempio

$\mathbb{R}^3$  Poniamo caso  $H = \langle (1, 2, 3), (1, 2, 1) \rangle$  e  $K = \langle (0, 0, 1), (1, 1, 0) \rangle$  abbiamo che:

- $\dim H = 2$
- $\dim K = 2$
- $\dim H + K = \langle (1, 2, 3), \cancel{(1, 1, 1)}, (0, 0, 1), (1, 1, 0) \rangle = 3$
- $\dim H \cap K = 1 = \langle (1, 1, 1) \rangle$  (dalla relazione di Grassman)

$$\langle (1, 1, 1) \rangle \leq H \cap K$$

## 8 Lezione 10 - 12/04/2023

### 8.1 Componenti

Sia  $V$  spazio vettoriale prendiamo un riferimento (base ordinata):  $\mathbb{R} = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , e prendiamo un vettore  $\underline{v} \in V$  allora  $\underline{v}$  si potrà scrivere come combinazione lineare:

$$\underline{v} = h_1 \underline{e}_1 + \dots + h_n \underline{e}_n$$

Chiamiamo i coefficienti  $h$  come **componenti**, più nello specifico:

$$(h_1, \dots, h_n) \text{ n-pla delle componenti } \underline{v} \text{ nel riferimento } \mathbb{R}$$

#### 8.1.1 Esempi

TODO: INSERIRE ESEMPIO

### 8.2 Cambiamento di Riferimento (Formula di Passaggio)

Presi due riferimenti vogliamo portare un vettore scritto come combinazione lineare delle componenti del "vecchio" riferimento al "nuovo" riferimento.

Consideriamo:

$$\mathbb{R}_1 = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n) \text{ VECCHIO RIFERIMENTO}$$

$$\mathbb{R}_2 = (\underline{f}_1, \dots, \underline{f}_n) \text{ NUOVO RIFERIMENTO}$$

Consideriamo un vettore  $\underline{v}$  del vecchio riferimento:

$$\underline{v} = k_1 \underline{e}_1 + \dots + k_n \underline{e}_n$$

Come abbiamo visto prima le componenti di questo vettore sono:  $(k_1, \dots, k_n)$

Cominciamo ad esprimere  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  come combinazione lineare del nuovo riferimento:

$$\underline{e}_1 = h_{1,1} \underline{f}_1 + \dots + h_{1,n} \underline{f}_n$$

...

$$\underline{e}_n = h_{n,1} \underline{f}_1 + \dots + h_{n,m} \underline{f}_n$$

Il primo pedice indica il vettore, il secondo lo scorrimento.

Andiamo a sostituire la nuova comb. lin. di  $\underline{e}_1$  in  $\underline{v}$ :

$$\underline{v} = k_1 (h_{1,1} \underline{f}_1 + \dots + h_{1,n} \underline{f}_n) + \dots + k_n (h_{n,1} \underline{f}_1 + \dots + h_{n,m} \underline{f}_n)$$

Ora mettiamo in evidenza  $\underline{f}$ :

$$\underline{v} = \underline{f}_1 (k_1 h_{1,1} + \dots + k_n h_{n,1}) + \dots + \underline{f}_n (k_1 h_{1,n} + \dots + k_n h_{n,n})$$

$\parallel$   
 $k'_1$

$\parallel$   
 $k'_n$

Quindi  $(k'_1, \dots, k'_n)$  le componenti di  $\underline{v}$  in  $\mathbb{R}_2$  In definitiva avremmo:

$$k'_1 = (k_1 h_{1,1} + \dots + k_n h_{n,1})$$

...

$$k'_n = (k_1 h_{n,1} + \dots + k_n h_{n,n})$$



### 8.2.1 Matrice di Passaggio

Un altro metodo oltre la "formula di passaggio" è la "matrice di passaggio"  
Andiamo ad esprimere

### 8.2.2 Esempio

Posti in  $\mathbb{R}^3$  consideriamo i seguenti riferimenti:

$$\mathbb{R}_1 = ((1, 2, 3), (4, 5, 6), (0, 0, 2)) \text{ VECCHIO RIFERIMENTO}$$

$$\mathbb{R}_2 = ((0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1)) \text{ NUOVO RIFERIMENTO}$$

Usiamo il metodo della "matrice di passaggio", cominciamo col esprimere i vecchie riferimenti in favori dei nuovi:

$$(1, 2, 3) = -1(0, 1, 0) + 2(0, 1, 1) + 1(1, 1, 1)$$

$$(4, 5, 6) = -1(0, 1, 0) + 2(0, 1, 1) + 4(1, 1, 1)$$

$$(0, 0, 2) = -2(0, 1, 0) + 2(0, 1, 1) + 0(1, 1, 1)$$

Ora costruiamo la matrice (per colonna):

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Ora basta fare il prodotto righe per colonne di un qualsiasi vettore che vogliamo "trasportare":

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

## 8.3 Ultima Osservazione Spazi Vettoriali

Consideriamo:

$$\mathbb{R}^3 :< (1, 1, 1), (0, 1, 5), (2, 3, 4), (2, 2, 2), (4, 5, 6) >$$

Vogliamo trovare una base (procediamo con la riduzione a gradini):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi la base sarà:

$$< (1, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 0, 3) >$$

- Avendo 3 pivot  $\Rightarrow \dim = 3$
- Le righe non nulle di una matrice a gradini **sono indipendenti**

## 8.4 Determinanti (matrice quadrata)

Il determinante esiste solo e solamente per matrici quadrate; il determinante si definisce per ricorsione<sup>6</sup>.

### 8.4.1 Matrice Complementare

La matrice complementare di  $A(i, j)$  consiste nell'eliminare la  $i$  riga e  $j$  colonna.

Esempio  $A(2, 2)$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & \\ \hline 1 & 0 & 0 & \\ 5 & 0 & 1 & \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

### 8.4.2 Complemento Algebrico

Il complemento algebrico di elemento  $a_{i,j}$  della matrice è definito:

$$A_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A(i, j))$$

Si indica con un "A grande" :  $A_{i,j}$

Esempio, consideriamo una matrice:

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Allora possiamo ricavare il determinante:

$$a_{1,1}A_{1,1} + a_{1,2}A_{1,2} + \dots + a_{1,n+1}A_{1,n+1} = \det A$$

$$a_{2,1}A_{2,1} + a_{2,2}A_{2,2} + \dots + a_{2,n+1}A_{2,n+1} = \det A$$

...

$$a_{n,1}A_{n,1} + a_{n,2}A_{n,2} + \dots + a_{n,n+1}A_{n,n+1} = \det A$$

**TUTTI QUESTI VALORI SONO UGUALI**

Questo procedimento è stato effettuato sulle righe, ma si può applicare uguale alle colonne.

---

<sup>6</sup>Attenzione da non confondere "dimostrazione per induzione" con "definizione per induzione"

## 8.5 Determinante per Casi

### 8.5.1 Matrice 2x2

Per le matrici  $2 \times 2$  il determinante si ottiene come diagonale primare - diagonale secondaria

Per le matrici  $2 \times 2$  il determinante si ottiene come diagonale primare - diagonale secondaria

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a * d - b + c \quad (1)$$

### 8.5.2 Matrice 3x3 - Regola di Sarrus

Avendo una matrice  $3 \times 3$  "duplichiamo" la prima e la seconda colonna e li posiniamo infondo

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

Da cui otteniamo:

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33})$$

Esempio:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 2 + 0 - (2 + 0 + 2) = 0$$

## 8.6 Proprietà sul Determinante

Dimostrazioni(dove neccessarie) ed esempi omessi (per ora)

- Se una riga dipende dalle rimanenti allora il determinante è zero
- Se una matrice ha due righe uguale allora il determinante è zero
- Se il determinante è diverso da zero allora righe indipendenti
- Se scambiamo due righe il determinante cambia di segno
- Teorema di Cauchy-Binet:  $\det(AB) = \det(A) * \det(B)$
- $\det A = \det A^t$

## 9 Lezione 11 - 14/04/2023

### 9.1 Operazioni di Riga riguarda il Determinante

Le operazioni di riga preservano la non nullità del determinante ma non il valore.

$E_1$  : Scambiare due righe fa cambiare il segno

$E_2$  : Bisogna moltiplicare per uno scalare anche il determinante (da rivedere)

### 9.2 Determinante di una Matrice a Gradini

Il modo più semplice per riuscire a calcolare il determinante di una matrice è portarla a gradini, poiché il determinante è **il prodotto della diagonale principale**.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \det = 1 * 2 * 3 = 6 \Rightarrow \text{Indipendente}$$

### 9.3 Invertibilità di una Matrice

Preso una matrice  $A \in \mathbb{R}_{n,n}$  esiste una matrice  $B \in \mathbb{R}_{n,n}$  tale che:

$$AB = I_n = BA$$

Vale solo se il determinante è diverso da zero.

$$|A| \neq 0 \Leftrightarrow \exists \text{ inversa } B = A^{-1}$$

$A^{-1}$  è unica. Dim unicità:

$$B_1 = B_1 I_N = B_1 (AB_2) = (B_1 A) B_2 = I_n B_2 = B_2$$

Dim  $\Rightarrow$ :

$$AB = I_n \Rightarrow \det(AB) = \det(I_n) = 1$$

Dim  $\Leftarrow$ : TODO:FINIRE

### 9.4 Minore di una Matrice (sottomatrice quadrata)

Indichiamo il minore come:

$$A_{(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_n)}$$

$i_1, \dots, i_h$  indica le righe

$j_1, \dots, j_n$  indica le colonne

Consideriamo la seguente matrice:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A_{(2,3;2,3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

I minori valgono anche sulle matrici rettangolari ma i minori rimangono sottomatrici quadrate.

## 9.5 Grado Massimo

Un minore si dice di **grado massimo** se il suo grado coincide con  $\min\{n, m\}$ .

Una matrice non quadrata ha sempre più di un minore di ordine massimo, mentre una matrice quadrata ha un solo minore di ordine massimo ed è la matrice stessa.

### 9.5.1 Esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Consideriamo:

$$A_{(2,3;2,4)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Questo non è di grado massimo poiché il grado massimo è  $\min\{3, 4\} = 3$

## 9.6 Orlo

Se abbiamo un minore che non è di grado massimo, possiamo orlarlo aggiungendo una riga e una colonna.

Un orlo rimane un minore, e si può orlare un orlo.

Riprendiamo l'esempio di sopra, eravamo rimasti che  $A_{(2,3;2,4)}$  non fosse di grado massimo, andiamo ad orlarlo:

$$A_{(1,2,3;2,3,4)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Abbiamo raggiunto una matrice di grado massimo orlando cioè abbiamo aggiunto la 1 riga e la 3 colonna.

## 9.7 Minore Fondamentale

Si definisce **minore fondamentale** un minore che rispetta queste proprietà:

- 1)  $\det \neq 0$
- 2) Tutti i suoi orlati hanno  $\det = 0$

### ESISTONO SEMPRE I MINORI FONDAMENTALI

Non ci sono sempre minori fondamentali, ad esempio la matrice nulla non ha minori fondamentali, ma, se la matrice non è nulla allora esiste sempre almeno un minore fondamentale. Il minore fondamentale non è necessariamente unico.

Se un minore di ordine massimo ha determinante diverso da zero allora esso è un minore fondamentale

### 9.7.1 Algoritmo per trovare Minore Fondamentale

Un modo semplice per trovare un **minore fonmentale** è cominciare sempre da un minore molto piccolo e poi andare ad orlarlo fino a raggiungere il grado massimo. Cominciamo con prendere una matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \mathbf{1} & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Andiamo a prendere un minore "piccolo" con determinante diverso da zero:

$$A_{(1;3)} = (1) \text{ con } \det \neq 0$$

Abbiamo escluso gli "zeri" poiché il loro determinante è zero. Procediamo con nostro "algoritmo" andando ad orlarlo:

$$A_{(1;3)} \rightarrow A_{(1,2;3,4)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \det = 0$$

Avendo trovato  $\det = 0 = (1 * 0) - (0 * 4)$  dobbiamo scegliere un altro orlato:

$$A_{(1;3)} \rightarrow A_{(1,2;2,3)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \det = 1$$

Abbiamo raggiunto un buon candidato ora dobbiamo verificare che tutti i suoi orlati abbiano  $\det = 0$ , in questo caso il suo unico orlato è:

$$A_{(1,2;3,4)} \rightarrow A_{(1,2,3;1,2,3)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ unico orlato con } \det = 0$$

Quindi in definitiva:

$$A_{(1,2;2,3)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

**MINORE FONDAMENTALE**

## 9.8 Teorema degli Orlati (NO DIM)

Sia  $A \in \mathbb{R}_{n,m}$  matrice rettangolare e  $A(i_1, \dots, i_h; j_1, \dots, j_n)$  minore fondamentale allora  $\Rightarrow$ :

$$\underline{a}_{1,1}, \dots, \underline{a}_{i,n}$$

Sono una base dello spazio vettoriale generato dalle **righe**.  
(Esiste equivalente per colonne) Conseguenza di ciò:

$$\mathbf{dim \text{ Righe Generate} = dim \text{ Colonne Generate}}$$

### 9.8.1 Rango

$$\mathbf{Rango = dim(Minore Fondamentale)}$$

Da questo sappiamo che i pivot di una matrice a gradini corrisponde alla dimensione, quindi al **rango**.

### 9.8.2 Corollari derivati

- Il rango di riga è sempre uguale al rango di colonna, inoltre il rango di  $A$  è uguale al numero di pivot di una matrice a gradini equivalente per righe.
- Tutti i minori fondamentali hanno lo stesso grado
- Il determinante di una matrice quadrata è diversa da zero se e solo se le righe (o colonne) sono indipendenti
- $\det A = 0 \Leftrightarrow$  righe (o colonne) dipendenti

## 9.9 Criteri di compatibilità sistemi di equazioni lineari

Consideriamo un sistema lineare:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = c_n \end{cases}$$

Possiamo scriverlo in forma matrice nel seguente modo  $AX = C$ :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Possiamo esprimere per  $C$  e spezzarla:

$$C = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

Quindi se c'è una soluzione la colonna dei termini noti quindi se c'è una soluzione la colonna dei termini noti.

### 9.9.1 Primo Criterio di Compatibilità

Un sistema  $S$  è compatibile  $\Leftrightarrow$  la colonna dei termini noti è combinazione lineare della matrice incompleta (è soluzione).

## 10 Lezione 12 - 19/04/2023

### 10.1 Teorema di Rouché-Capelli

Il teorema di Rouché-Capelli anche noto come secondo sistema di compatibilità afferma che un sistema  $S$  è compatibile  $\Leftrightarrow$  il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = c_n \end{cases} \text{ è compatibile } \Leftrightarrow v(A) = v(A')$$

**DIM  $\Rightarrow$ :** Per il primo principio di compatibilità:

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = y_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix} + \dots + y_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$

$(c_1, \dots, c_n)$  DIPENDE DALLE COLONNE

DA FINIRE **DIM  $\Leftarrow$ :** Partiamo da "i due ranghi sono uguali" allora per il teorema degli orlati hanno lo stesso ordine/grado ( $L$ ). Consideriamo una matrice:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & c_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} & c_n \end{array} \right)$$