

## БДЗ №1

1. (а) Представить слагаемые и результат в виде *нормализованного* числа с плавающей точкой двойной точности:  $(-1)^s \cdot 2^{e-1023} \cdot 1.f$ , где  $1.f$  записано в двоичном виде. (б) Если результат неточный (не уместается целиком в мантиссе), то указать относительную погрешность ошибки. Исходные данные в десятичной системе счисления.

$$-683,6640625 \cdot 2^{120} + 1177,0703125 \cdot 2^{173}$$

*Решение.*

Переведем слагаемые в двоичную систему и преобразуем их затем к нормализованному виду  $(-1)^s \times 2^{e-1023} \times 1.f$ :

$$\begin{aligned} & -683,6640625 \times 2^{120} + 1177,0703125 \times 2^{173} = \\ & = -1010101011,1010101 \times 2^{120} + 10010011001,0001001 \times 2^{173} = \\ & = -1,0101010111010101 \times 2^{129} + 1,00100110010001001 \times 2^{183} = \\ & (-1)^1 \times 2^{1152-1023} \times 1.0101010111010101 \quad \sim 2^{129} \sim 10^{37} \\ & + (-1)^0 \times 2^{1206-1023} \times 1.00100110010001001 \quad \sim 2^{183} \sim 10^{55} \\ & = (-1)^0 \times 2^{1206-1023} \times 1.00100110010001001 \quad \sim 2^{183} \sim 10^{55} \end{aligned}$$

$\delta_{\text{абс}}$  = разряды какого порядка не уместились в 52 бита мантиссы =  $\sim 2^{129} \sim 10^{37}$

$$\delta_{\text{отн}} = \frac{\delta_{\text{абс}}}{2^{183}} = \frac{2^{129}}{2^{183}} \sim 2^{-54} \sim 10^{-16}$$

2. Написать последовательность инструкций Matlab, формирующих указанную матрицу. Около каждой инструкции указать промежуточный результат в виде матрицы. Разрешается использовать матричные функции (`eye`, `repmat`, `flipud` и др.). Использовать циклы нельзя.

Входные данные:	Нужно получить:
Целое $n \geq 20$	$\begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{2n} & \sin \frac{3\pi}{2n} & \dots & \sin \frac{(2n-1)\pi}{2n} \\ \sin^2 \frac{\pi}{2n} & \sin^2 \frac{3\pi}{2n} & \dots & \sin^2 \frac{(2n-1)\pi}{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin^n \frac{\pi}{2n} & \sin^n \frac{3\pi}{2n} & \dots & \sin^n \frac{(2n-1)\pi}{2n} \end{pmatrix}$

$n = 20;$

$A = 1:2:(2n-1)$

$A = \text{repmat}(A, n, 1)$

$A = \sin(A * \frac{\pi}{2n})$

$B = \text{repmat}(1:n, n, 1)$

$B = B.'$

$B = A.^B$

$$A = 1:2:(2n-1)$$

$$A = \text{repmat}(A, n, 1)$$

$$A = \sin\left(A * \frac{\pi}{2n}\right)$$

$$B = \text{repmat}(1:n, n, 1)$$

$$B = B.'$$

$$B = A.^B$$

$$A = (1 \ 3 \ \dots \ 2n-1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & \dots & 2n-1 \\ 1 & 3 & & 2n-1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 3 & \dots & 2n-1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) & \sin\left(\frac{3\pi}{2n}\right) & \dots & \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) & \sin\left(\frac{3\pi}{2n}\right) & & \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) & \sin\left(\frac{3\pi}{2n}\right) & \dots & \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2 & & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & n & \dots & n \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) & \sin\left(\frac{3\pi}{2n}\right) & \dots & \sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) \\ \sin^2\left(\frac{\pi}{2n}\right) & \sin^2\left(\frac{3\pi}{2n}\right) & & \sin^2\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sin^n\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) & \sin^n\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) & \dots & \sin^n\left(\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right) \end{pmatrix}$$

3. (а) Локализовать корни уравнения (для каждого корня  $z_i$  указать отрезок  $[a_i, b_i]$ , содержащий только один этот корень  $z_i$ ). Для *каждого* корня (б) построить итерационный процесс  $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ , сходящийся к корню и (в) указать начальное значение  $x_0$ . Указание: локализацию проводить перебором интервалов  $[a_i, b_i]$  или средствами математического анализа.

$$5x^4 + x^3 + x^2 + 2x - 2 = 0$$

*Решение.*

Табличным способом выделим отрезки, на концах которых функция имеет разные знаки:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
sign f(x)	+	+	+	+	-	+	+	+

Таким образом, корни исходного уравнения лежат на отрезках  $[-1, 0]$  и  $[0, 1]$

Для каждого корня построим итерационный процесс.

Для корня  $[0, 1]$  разделим уравнение на  $x^2$ :

$$5x^2 + x + 1 + \frac{2}{x} = \frac{2}{x^2}$$

И выразим  $x$  через  $\frac{2}{x^2}$

$$x = \sqrt{\frac{2}{5x^2 + x + 1 + \frac{2}{x}}}$$

Тогда итерационный процесс

$$x_{n+1} = \sqrt{\frac{2}{5x_n^2 + x_n + 1 + \frac{2}{x_n}}}$$

На заданном отрезке  $[0, 1]$  везде кроме точки 0 (из-за деления на 0) выполняется неравенство

$$|\varphi'(x)| < 1$$

В качестве начального приближения можно взять  $x_0 = 0,5$

Для корня из отрезка  $[-1, 0]$  не удалось построить итерационный процесс, тогда воспользуемся методом Ньютона:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{5x_n^4 + x_n^3 + x_n^2 + 2x_n - 2}{20x_n^3 + 3x_n^2 + 2x_n + 2}$$

В качестве начального приближения можно взять  $x_0 = -1$

4. Известно, что интервалу  $[a, b]$  принадлежит *только* корень  $x_*$  уравнения (другие корни интервалу не принадлежат). (а) Построить итерационный процесс Ньютона  $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$  и (б) обосновать какую из границ интервала  $[a, b]$  можно принять за  $x_0$ . Указание: в пункте (б) выяснить знаки производных  $f'(x)$  и  $f''(x)$  и использовать соответствующую теорему.

$$\sin(\ln x) = 0, \quad x_* \in [22, 24]$$

*Решение.*

$$f(x) = \sin(\ln(x))$$

$$f'(x) = \frac{\cos(\ln(x))}{x}$$

Построим итерационный процесс:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\sin(\ln(x_n))}{\frac{\cos(\ln(x_n))}{x_n}} = x_n - x_n \frac{\sin(\ln(x_n))}{\cos(\ln(x_n))}$$

Определим знаки производных на отрезке [22, 24]:

$$f'(x) = \frac{\cos(\ln(x))}{x} \leq -0.0454 < 0, f''(x) = -\frac{\cos(\ln(x))}{x^2} - \frac{\sin(\ln(x))}{x^2} \geq 0.0018 > 0$$

Так как  $f'(x) \times f''(x) < 0$ , то берем левую границу интервала  $x_0 = 22$ .

5. (а) Построить интерполяционный многочлен Лагранжа для функции  $f(x)$  по узлам  $x_i$ . (б) Оценить сверху погрешность  $|R_n(x)|$  приближения функции многочленом.

$$7 \ln x - x \quad x_0 = 1/2, x_1 = 1, x_2 = 2$$

*Решение.*

Построим многочлен Лагранжа по таблице:

x	1/2	1	2
y	$-7 \ln(2) - 0.5$	-1	$7 \ln(2) - 2$

Вычислим приближенные значения:

x	1/2	1	2
y	-5,35203	-1	2,85203

$$P_2(x) = -5,35203 \frac{(x-1)(x-2)}{(0.5-1)(0.5-2)} - 1 \frac{(x-0.5)(x-2)}{(1-0.5)(1-2)} + 2,85203 \frac{(x-0.5)(x-1)}{(2-0.5)(2-1)}$$

$$P_2(x) = -7,13604(x-1)(x-2) + 2(x-0.5)(x-2) + 1,90135(x-0.5)(x-1)$$

$$P_2(x) = -3,23469x^2 + 13,556095x - 11,321405$$

$$P_2(x) = -3,2347x^2 + 13,5561x - 11,3214$$

Найдем погрешность по формуле  $R_2(x) = \frac{M_3}{3!} \omega_3(x)$

$$f(x) = 7 \ln(x) - x, f'(x) = \frac{7}{x} - 1, f''(x) = -\frac{7}{x^2}, f'''(x) = \frac{14}{x^3}$$

$$M_3 = \max_{[0.5, 2]} f'''(x) = \max_{[0.5, 2]} \frac{14}{x^3} = 112$$

Для нахождения максимального значения  $\omega_3(x) = (x - 0.5)(x - 1)(x - 2) = x^3 - 3.5x^2 + 3.5x - 1$  необходимо найти корни производной  $\omega_3(x)$

$$\omega_3'(x) = 3x^2 - 7x + 3.5$$

$$3x^2 - 7x + 3.5 = 0$$

$$x_1 = 0.7257, x_2 = 1.6076$$

$$|\omega_3(0.7257)| = 0.0789, |\omega_3(1.6076)| = 0.2641$$

Рассчитаем погрешность:

$$|R_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} \times |\omega_3(x)| = \frac{112}{6} \times 0.2641 = 4.9293$$

6. Заданную функцию будут интерполировать на отрезке  $[a, b]$  по чебышёвским узлам с заданной точностью  $|R_n(x)| < \varepsilon$ . Требуется (а) определить требуемое для заданной точности  $\varepsilon$  количество узлов (т.е. степень интерполяционного многочлена плюс 1) и (б) вычислить значения всех узлов и отметить их на действительной оси  $Ox$  (если узлов окажется много, ограничиться вычислением значений наименьших 10 узлов).

$$f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sqrt{x} \quad \text{на отрезке } [1, \pi/2] \text{ с точностью } \varepsilon = 10^{-3}$$

*Решение.*

Оценим погрешность многочлена Лагранжа для Чебышевских узлов

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} (b-a)^{n+1} \times 2^{1-2(n+1)}$$

Найдем производные заданной функции:

$$f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \sqrt{x}$$

$$f'(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f''(x) = -\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}$$

$$f'''(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \frac{3}{8x^{\frac{5}{2}}}$$

$$f''''(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{15}{16x^{\frac{7}{2}}}$$

$n$  – количество Чебышевских узлов

$$\text{Для } n = 2 \quad |R_1(x)| \leq \frac{M_2}{2!} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)^2 \times 2^{-3} \approx 0.025$$

$$\text{Для } n = 3 \quad |R_2(x)| \leq \frac{M_3}{3!} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)^3 \times 2^{-5} \approx 0.000402$$

получили требуемую погрешность порядка  $10^{-3}$

$$\text{Для } n = 4 \quad |R_3(x)| \leq \frac{M_4}{4!} \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)^4 \times 2^{-7} \approx 6,69 \times 10^{-5}$$


Выпишем Чебышевские узлы:

$$x_k = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)$$

$$x_1 = \frac{\frac{\pi}{2} + 1}{2} + \frac{\frac{\pi}{2} - 1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.5326$$

$$x_2 = \frac{\frac{\pi}{2} + 1}{2} + \frac{\frac{\pi}{2} - 1}{2} \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 1.2854$$

$$x_3 = \frac{\frac{\pi}{2} + 1}{2} + \frac{\frac{\pi}{2} - 1}{2} \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 1.0382$$



7. Данные некоторого физического эксперимента представлены в таблице. Характер зависимости  $y(x)$  заранее точно неизвестен. Есть предположения, что зависимость может быть линейной, квадратичной или кубической. (а) Методом среднеквадратического приближения построить три типа приближения  $y(x)$  (т.е. аппроксимирующие многочлены первой, второй и третьей степеней). (б) Для каждого аппроксимирующего многочлена вычислить среднеквадратическое отклонение  $\sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (y(x_i) - y_i)^2}$ . (в) Выбрать минимальное с.к.о. и указать соответствующий ему тип зависимости (линейная, квадратичная или кубическая), т.е. наиболее вероятный в проведенном эксперименте.

$x$	3	4	5	6	7
$y$	148.8	341.2	657.7	1126.5	1776.5

*Решение.*

Сначала найдем линейную зависимость:  $x(t) = ax + b$

Введем функцию  $\Phi(a, b) = \sum_{k=1}^5 (ax_k + b - y_k)^2$

$$\Phi(a, b) = (3a + b - 148,8)^2 + (4a + b - 341,2)^2 + (5a + b - 657,7)^2 + (6a + b - 1126,5)^2 + (7a + b - 1776,5)^2$$

$$\frac{d\Phi}{da} = 18a + 6b - 892,8 + 32a + 8b - 2729,6 + 50a + 10b - 6577 + 72a + 12b - 13518 + 98a + 14b - 24871 = 270a + 50b - 48588,4$$

$$\frac{d\Phi}{db} = 6a + 2b - 297,6 + 8a + 2b - 682,4 + 10a + 2b - 1315,4 + 12a + 2b - 2253 + 14a + 2b - 3553 = 50a + 10b - 8101,4$$

Из полученных уравнений найдем значения  $a$  и  $b$ :

$$\begin{cases} 270a + 50b - 48588,4 = 0 \\ 50a + 10b - 8101,4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 404,07 \\ b = -1210,21 \end{cases}$$

Полученная линейная зависимость  $P_0(x) = 404,07x - 1210,21$

Найдем среднеквадратичное отклонение:

$\sigma_1$

$$= \sqrt{\frac{1}{5} \left[ (148,8 - 404,07 \times 3 + 1210,21)^2 + (341,2 - 404,07 \times 4 + 1210,21)^2 + (657,7 - 404,07 \times 5 + 1210,21)^2 + (1126,5 - 404,07 \times 6 + 1210,21)^2 + (1776,5 - 404,07 \times 7 + 1210,21)^2 \right]}$$

$$= 127,8459$$

Найдем квадратичную зависимость  $x(t) = ax^2 + bx + c$

$$\Phi(a, b, c) = \sum_{k=1}^5 (ax_k^2 + bx_k + c - y_k)^2$$

$$\Phi(a, b, c) = (9a + 3b + c - 148,8)^2 + (16a + 4b + c - 341,2)^2 + (25a + 5b + c - 657,7)^2 + (36a + 6b + c - 1126,5)^2 + (49a + 7b + c - 1776,5)^2$$

$$\frac{d\Phi}{da} = 9318a + 1550b + 270c - 301686,8$$

$$\frac{d\Phi}{db} = 1550a + 270b + 50c - 48588,4$$

$$\frac{d\Phi}{dc} = 270a + 50b + 10c - 8101,4$$

$$\begin{cases} a = 76,2500 \\ b = 358,4300 \\ c = 543,5400 \end{cases}$$

Полученная квадратичная зависимость  $P_1(x) = 76,25x^2 + 358,43x + 543,54$

Найдем среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{1}{5} \left[ \begin{aligned} &(148,8 - 76,25 \times 9 - 358,43 \times 3 - 543,54)^2 + \\ &+(341,2 - 76,25 \times 16 - 358,43 \times 4 - 543,54)^2 + \\ &+(657,7 - 76,25 \times 25 - 358,43 \times 5 - 543,54)^2 + \\ &+(1126,5 - 76,25 \times 36 - 358,43 \times 6 - 543,54)^2 + \\ &+(1776,5 - 76,25 \times 49 - 358,43 \times 7 - 543,54)^2 \end{aligned} \right]} = 8,0752$$

Найдем кубическую зависимость  $x(t) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$$\Phi(a, b, c, d) = \sum_{k=1}^5 (ax_k^3 + bx_k^2 + cx_k + d - y_k)^2$$

$$\begin{aligned} \Phi(a, b, c, d) = &(27a + 9b + 3c + d - 148,8)^2 \\ &+ (64a + 16b + 4c + d - 341,2)^2 \\ &+ (125a + 25b + 5c + d - 657,7)^2 \\ &+ (216a + 36b + 6c + d - 1126,5)^2 \\ &+ (343a + 49b + 7c + d - 1776,5)^2 \end{aligned}$$

$$\frac{d\Phi}{da} = 369510a + 57950b + 9318c + 1550d - 1921460,8$$

$$\frac{d\Phi}{db} = 57950a + 9318b + 1550c + 270d - 301686,8$$

$$\frac{d\Phi}{dc} = 9318a + 1550b + 270c + 50d - 48588,4$$

$$\frac{d\Phi}{dd} = 1550a + 270b + 50c + 10d - 8101,4$$

$$\begin{cases} a = 4,7583 \\ b = 4,8750 \\ c = -17,7333 \\ d = 29,6400 \end{cases}$$

Полученная кубическая зависимость



$$P_2(x) = 4,7583x^3 + 4,875x^2 - 17,7333x + 29,64$$

Найдем среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_3 = \sqrt{\frac{1}{5} \left[ \begin{aligned} &(148,8 - 4,7583 \times 27 - 4,875 \times 9 + 17,7333 \times 3 - 29,64)^2 + \\ &+(341,2 - 4,7583 \times 64 - 4,875 \times 16 + 17,7333 \times 4 - 29,64)^2 + \\ &+(657,7 - 4,7583 \times 125 - 4,875 \times 25 + 17,7333 \times 5 - 29,64)^2 + \\ &+(1126,5 - 4,7583 \times 216 - 4,875 \times 36 + 17,7333 \times 6 - 29,64)^2 + \\ &+(1776,5 - 4,7583 \times 343 - 4,875 \times 49 + 17,7333 \times 7 - 29,64)^2 \end{aligned} \right]} = 0,0374$$

Полученные среднеквадратичные отклонения:

$$\sigma_1 = 127,8459$$

$$\sigma_2 = 8,0752$$

$$\sigma_3 = 0,0374$$

Так как среднеквадратичное отклонение кубического приближения наименьшее, следовательно, зависимость – кубическая.

8. (а) Методом неопределённых коэффициентов составить формулу для вычисления указанной производной по значениям функции в указанных узлах. (б) Раскладывая  $y(x_i)$  в ряд Тейлора, определить порядок  $p$  погрешности  $O(h^p)$  полученной формулы.

$$y''(x_1) = c_0 y(x_0) + c_1 y(x_1) + c_2 y(x_2) + c_3 y(x_3) + O(h^p).$$

$$\begin{array}{ccccccc} x_0 & \xrightarrow{\quad 2h \quad} & x_1 & \xrightarrow{\quad h \quad} & x_2 & \xrightarrow{\quad h \quad} & x_3 \end{array}$$

*Решение.*

Требуется найти следующее приближение

$$y''(x_1) = c_0 y(x_0) + c_1 y(x_1) + c_2 y(x_2) + c_3 y(x_3) + O(h^p)$$

Перепишем в сокращенном виде:

$$y_1'' = c_0 y_0 + c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_3 y_3 + O(h^p)$$

Используем следующие многочлены:

$$y = 1, y = x - x_0, y = (x - x_0)^2, y = (x - x_0)^3$$

Вычислим их производные:

$y(x)$	$(x - x_0)^0 = 1$	$(x - x_0)^1$	$(x - x_0)^2$	$(x - x_0)^3$
$y'(x)$	0	1	$2(x - x_0)$	$3(x - x_0)^2$
$y''(x)$	0	0	2	$6(x - x_0)$

Подставляя полученные вторые производные в требуемое приближение, получим систему уравнений:

$$\begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ c_0(x_0 - x_0) + c_1(x_1 - x_0) + c_2(x_2 - x_0) + c_3(x_3 - x_0) = 0 \\ c_0(x_0 - x_0)^2 + c_1(x_1 - x_0)^2 + c_2(x_2 - x_0)^2 + c_3(x_3 - x_0)^2 = 2 \\ c_0(x_0 - x_0)^3 + c_1(x_1 - x_0)^3 + c_2(x_2 - x_0)^3 + c_3(x_3 - x_0)^3 = 6(x_1 - x_0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ 2hc_1 + 3hc_2 + 4hc_3 = 0 \\ 4h^2c_1 + 9h^2c_2 + 16h^2c_3 = 2 \\ 8h^3c_1 + 27h^3c_2 + 64h^3c_3 = 12h \end{cases}$$

Решая полученную систему, получаем:

$$c_0 = \frac{1}{4h^2}, c_1 = -\frac{1}{2h^2}, c_2 = 0, c_3 = \frac{1}{4h^2}$$

Подставляя эти значения получаем:

$$y_1'' = \frac{1}{4h^2}y_0 - \frac{1}{2h^2}y_1 + 0y_2 + \frac{1}{4h^2}y_3 + O(h^p)$$

$$y_1'' = \frac{1}{4h^2}(y_0 - 2y_1 + 0y_2 + y_3) + O(h^p)$$

Остается определить порядок погрешности  $O(h^p)$

Для этого разложим  $y_i$  в ряд Тейлора в окрестности точки  $x_1$  до  $h^4$  (предположительно)

$$y_0 = y_1 - 2hy_1' + 2h^2y_1'' - \frac{8h^3}{6}y_1''' + \frac{16h^4}{24}y_1''''$$

$$y_1 = y_1$$

$$y_2 = y_1 + hy_1' + \frac{h^2}{2}y_1'' + \frac{h^3}{6}y_1''' + \frac{h^4}{24}y_1''''$$

$$y_3 = y_1 + 2hy_1' + 2h^2y_1'' + \frac{8h^3}{6}y_1''' + \frac{16h^4}{24}y_1''''$$

Подставим полученные значения в найденную формулу для второй производной:

$$\begin{aligned}
 y_1'' - \frac{1}{4h^2} (y_0 - 2y_1 + 0y_2 + y_3) = \\
 y_1'' - \frac{1}{4h^2} (y_1 - 2y_1 + y_1) - \frac{1}{4h^2} (-2hy_1' + 2hy_1') - \frac{1}{4h^2} (2h^2y_1'' + 2h^2y_1'') \\
 - \frac{1}{4h^2} \left( -\frac{8h^3}{6} y_1''' + \frac{8h^3}{6} y_1''' \right) - \frac{1}{4h^2} \left( \frac{16h^4}{24} y_1'''' + \frac{16h^4}{24} y_1'''' \right) = \\
 y_1'' - \frac{4h^2}{4h^2} y_1'' - \frac{\frac{32h^4}{24}}{4h^2} y_1'''' = -\frac{h^2}{3} y_1''''
 \end{aligned}$$

Полученный порядок погрешности равен 2

Итоговая формула

$$y_1'' = \frac{1}{4h^2} (y_0 - 2y_1 + 0y_2 + y_3) + O(h^2)$$