

# 第一章 附录

这一部分中，对于正文中因为逻辑结构无法提及的部分，进行补充。

## 1.1 $\text{hom}(V, W)$ 的维数

这篇附录中，我们解决一个问题： $\text{hom}(V, W)$  的维数是多少。

### 引理 1.1.1

$$\text{hom}(V, W) \cong \bigoplus_{i=1}^n \text{hom}(F, W)$$

**证明：**任取  $V$  的一个基  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ ，我们定义：

$$\phi : \text{hom}(V, W) \ni f \mapsto (\{1, \dots, n\} \ni i \mapsto (F \ni k \mapsto kf(\alpha_i) \in W) \in \text{hom}(F, W)) \in \bigoplus_{i=1}^n \text{hom}(F, W)$$

(即满足  $\phi(f)(i)(k) = kf(\alpha_i)$  的唯一映射)

接下来验证  $\phi$  是同构映射

首先，容易注意到  $\phi(f) = \phi(g) \Rightarrow f = g$ ，因此  $\phi$  是单射

其次， $\forall (\{1, \dots, n\} \ni i \mapsto g_i \in \text{hom}(F, W)) \in \bigoplus_{i=1}^n \text{hom}(F, W)$

注意到，如果设  $f : V \ni \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i \mapsto \sum_{i=1}^n k_i g_i(1_F)$ ，那么  $\phi(f)(i) = g_i$ ，于是  $\phi$  是满射

接下来验证它是一个线性映射

$$\forall f, g \in \text{hom}(V, W), \phi(f+g)(i)(k) = k(f+g)(\alpha_i) = kf(\alpha_i) + kg(\alpha_i) = \phi(f)(i)(k) + \phi(g)(i)(k) \Rightarrow \phi(f+g) = \phi(f) + \phi(g)$$

$$\forall f \in \text{hom}(V, W), l \in F, \phi(lf)(i)(k) = k(lf)(\alpha_i) = lkf(\alpha_i) = l\phi(f)(i)(k) \Rightarrow \phi(lf) = l\phi(f)$$

因此它是一个同构映射，命题得证。  $\square$

## 引理 1.1.2

$$\text{hom}(F, W) \cong W$$

**证明:** 任取  $V$  的一个基  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ , 我们定义:

$$\psi: \alpha \in W \mapsto (F \ni k \mapsto k\alpha \in W) \in \text{hom}(F, W)$$

注意到:  $\psi(\alpha) = \psi(\beta) \Rightarrow \psi(\alpha)(k) = \psi(\beta)(k) \Rightarrow k\alpha = k\beta \Rightarrow \alpha = \beta$ , 于是  $\psi$  是单射

$\forall f \in \text{hom}(F, W), \psi(f(1_F))(k) = kf(1_F) = f(k) \Rightarrow \psi(f(1_F)) = f$ , 于是  $\psi$  是满射

$$\forall \alpha, \beta \in W, \psi(\alpha + \beta)(k) = k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta = \psi(\alpha)(k) + \psi(\beta)(k) \Rightarrow \psi(\alpha + \beta) = \psi(\alpha) + \psi(\beta)$$

$$\forall \alpha \in W, l \in F, \psi(l\alpha)(k) = lk\alpha = l\psi(\alpha)(k) \Rightarrow \psi(l\alpha) = l\psi(\alpha)$$

于是  $\psi$  是一个同构映射。 □

## 引理 1.1.3

$$|\text{hom}(V, W)| = |W|^{\dim V}$$

**证明:** 事实上, 线性映射只由基上的作用决定, 因此如果设  $V$  的一个基为  $B$

$$|\text{hom}(V, W)| = \text{Card}\{f: B \rightarrow W\} = |W|^{|B|} = |W|^{\dim V} \quad \square$$

## 引理 1.1.4

$$\dim \text{hom}_F(V, W) \geq |F|$$

**证明:** 取  $V$  的一个基  $B$ , 任取  $B$  的一个可数子集  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots\}$ , 又任取  $\gamma \in W, \gamma \neq \mathbf{0}_W$

我们定义:  $k \in F, f_k(\alpha_i) = k^{i-1}\gamma$ , 并且  $\forall \beta \in B - \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}, f_k(\beta) = \mathbf{0}_W$

显然, 如此定义的映射集  $\{f_k | k \in F\}$  中的任意映射都是线性映射 (因为我们给出且只给出了在基上的像)

我们来验证,  $\{f_k | k \in F\}$  的任意有限子集线性无关

取它的一个有限子集  $\{f_{k_1}, \dots, f_{k_s}\}$

$$\text{如果 } \sum_{i=1}^s l_i f_{k_i} = 0$$

$$\Rightarrow \forall \alpha_j, \sum_{i=1}^s l_i f_{k_i}(\alpha_j) = \mathbf{0}_W$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^s l_i k_i^{j-1} \gamma = \mathbf{0}_W$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^s l_i k_i^{j-1} = 0$$

因此,  $\forall j \in \mathbb{N}_+, \sum_{i=1}^s l_i k_i^{j-1} = 0$ , 我们取前  $s$  项, 并写成方程组的形式:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}_{F^s}$$

$$\text{其中 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1^{s-1} & \cdots & k_s^{s-1} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_s \end{pmatrix}$$

注意到,  $|\mathbf{A}| = \prod_{1 \leq i < j \leq s} (k_j - k_i) \neq 0$

因此方程组  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}_{F^s}$  仅有平凡解  $\mathbf{x} = \mathbf{0}_{F^s}$

又因为这个有限子集是随意选取的, 因此  $\{f_k | k \in F\}$  线性无关。

那么, 就必须有  $\dim \text{hom}(V, W) \geq |F|$ , 命题得证

□

### 引理 1.1.5

设  $U$  是  $F$  上的一个线性空间, 那么  $|U| = |F| \cdot \dim_F U$

证明:

□

### 引理 1.1.6

$\text{hom}(V, W) \cong \{f : B_1 \rightarrow G | G \subseteq F^{B_2}, \forall g \in G, \text{supp}(g) < \aleph_0\}$

其中  $B_1, B_2$  分别是  $V, W$  的基

证明: 记  $\mathcal{P} = \{f : B_1 \rightarrow G | G \subseteq F^{B_2}, \forall g \in G, \text{supp}(g) < \aleph_0\}$

我们定义  $\phi : \text{hom}(V, W) \ni T \mapsto (B_1 \ni \alpha \mapsto (B_2 \ni \beta \mapsto T_{\alpha\beta} \in F) \in G) \in \mathcal{P}$

其中  $T(\alpha) = \sum_{\beta \in B_2} T_{\alpha\beta} \beta$

这个定义是合理的, 因为我们知道, 任意一个向量可由有限个基向量线性组合, 因此  $B_2 \ni \beta \mapsto T_{\alpha\beta} \in F$  是有限支撑的 (即使  $B_2$  无限)

接下来验证  $\phi$  是同构映射

先验证它是线性的:

注意到:  $\forall A, B \in \text{hom}(V, W), \phi(A+B)(\alpha)(\beta) = (A+B)_{\alpha\beta} = A_{\alpha\beta} + B_{\alpha\beta} = \phi(A)(\alpha)(\beta) + \phi(B)(\alpha)(\beta) \Rightarrow \phi(A+B) = \phi(A) + \phi(B)$

$\forall k \in F, A \in \text{hom}(V, W), \phi(kA)(\alpha)(\beta) = (kA)_{\alpha\beta} = k \cdot A_{\alpha\beta} = k\phi(A)(\alpha)(\beta) \Rightarrow \phi(kA) = k\phi(A)$

接下来验证它是一个双射:

注意到:  $\forall g \in \mathcal{P}$ , 令  $T(\alpha) = \sum_{\beta \in B_2} g(\alpha)(\beta)\beta, \alpha \in B_1$ 。这个定义是良好的, 因为它仅仅给出了在基上的作用, 而且由于  $g(\alpha)$  是有限支撑的, 所以求和是良好的。

$$\phi(T)(\alpha)(\beta) = g(\alpha)(\beta) \Rightarrow \phi(T) = g$$

又注意到:  $\phi(A) = \phi(B) \Rightarrow \forall \alpha \in B_1, \beta \in B_2, \phi(A)(\alpha)(\beta) = \phi(B)(\alpha)(\beta) \Rightarrow A_{\alpha\beta} = B_{\alpha\beta} \Rightarrow A = B$

于是  $\phi$  的确是一个同构映射, 命题得证。  $\square$

### 定理 1.1.7: $\text{hom}_F(V_1, V_2)$ 的维数

$$\dim \text{hom}_F(V, W) = \begin{cases} 0, \dim V = 0 \vee \dim W = 0 \\ (\dim V) \cdot (\dim W), \dim V = n < \aleph_0 \\ |\text{hom}(V, W)| = |W|^{\dim V} = (|F| \cdot \dim W)^{\dim V}, \dim V \geq \aleph_0 \end{cases}$$

**证明:** 首先考虑  $V, W$  中存在零空间的情形。

如果  $\dim V = 0$ , 即  $V = \{\mathbf{0}_V\}$ , 而我们知道线性映射仅能把零向量映射到零向量, 此时  $\text{hom}(V, W)$  中仅存在零映射, 维数为零

如果  $\dim W = 0$ 。即  $W = \{\mathbf{0}_W\}$ , 此时映射只有零映射 (因为  $W$  中仅存在零向量), 维数为零

接下来考虑  $V, W$  中不存在零空间, 且  $\dim V = n < \aleph_0$  的情形。

此时,  $\dim \text{hom}(V, W) = \dim \bigoplus_{i=1}^n \text{hom}(F, W) = n \cdot \dim \text{hom}(F, W) = n \cdot \dim W = (\dim V) \cdot (\dim W)$

最后我们证明  $\dim V, \dim W$  均是无限的情形。

$\square$