

Guia 2

1. $P = 20 = 2a + 2b \Leftrightarrow a = 10 - b$, $A = ba \Rightarrow A = b(10 - b) = 10b - b^2$
 $A = 10b - b^2$

2. $A = 6a^2$, $V = a^3 \Leftrightarrow a = V^{1/3} \Rightarrow A = 6V^{2/3}$

3. Encontrar el dominio de las funciones definidas por las siguientes fórmulas:

a) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $\text{Dom } f = \{x / x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \geq 0\}$

Usamos que: $\sqrt{x^2} = |x|$

$$1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow 1 \geq x^2 \Rightarrow 1 \geq |x| \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$$

$$\text{Dom } f = \{x / x \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 1\}$$

b) $f(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}}$

– Resolver de adentro hacia afuera:

– $\sqrt{1 - x^2} \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$, en ese rango ya la función tendrá solución.

– $\text{Dom } f = \{x / x \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 1\}$

c) $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} = \frac{x-2+x-1}{(x-1)(x-2)} = \frac{2x-3}{(x-1)(x-2)}$

– Claramente el principal punto de importancia es cuando el denominador es cero.

– $(x-1)(x-2) = 0$ si $x = 1$ o $x = 2$, el resto de los puntos son válidos

– $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{1, 2\}$

d) $f(x) = (\sqrt{x})^2$

– Claramente es necesario que: $x \geq 0$

– $\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$

e) $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| > 1 \Rightarrow x < -1, x > 1 \\ \sqrt{1 - x^2} & \text{si } |x| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$

– $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

4. Encontrar el Dominio e imagen de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{1}{x+3}$

– $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-3\}$

– Para buscar la imagen utilizo el siguiente lema:

Para toda función $\text{Im } f = \{f(x) / x \in \text{Dom } f\}$

- Es decir que puedo intentar invertir la relacion entre y , x para buscar esta imagen conociendo el dominio.
- $y = \frac{1}{x+3} \Leftrightarrow x+3 = \frac{1}{y} \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} - 3$
- $y \neq 0$, Despues el resto de los valores son validos.
- $\text{Im } f = \mathbb{R} - \{0\}$
- Esta funcion es super enganiosa: Imaginemos que $x = -3 + \frac{1}{100}$ luego: $x+3 = \frac{1}{100}$ entonces: $f = 100$.

b) $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$

- $\text{Dom } g = \mathbb{R}$
- Para buscar la imagen nuevamente invertimos la relacion:
- $g = \frac{1}{x^2+1} \Leftrightarrow x^2+1 = \frac{1}{g} \Leftrightarrow |x| = \sqrt{\left(\frac{1}{g}-1\right)} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\left(\frac{1}{g}-1\right)}$
- El dominio de esta funcion no incluye 0, $\frac{1}{g} < 1 \Leftrightarrow g \geq 1$
- $\text{Im } g = \{g \in \mathbb{R} / 0 < g \leq 1\}$
- Observacion: $\frac{1}{x^2+1}$ nunca nos va a dar un numero mayor a 1. por ejemplo:
 $x^2+1 = \frac{1}{1000} + 1 = \frac{1001}{1000} > 1$, en consecuencia: $\frac{1}{x^2+1} < 1$
- La diferencia con el otro problema: $f(x) = \frac{1}{x+3}$ es que a traves de la resta ibamos a poder tener numeros mas chicos que 1.

c) $g(x) = \frac{1}{x^2-1}$

- Se descartan del dominio los valores tales que: $x^2-1=0 \Leftrightarrow x^2=1 \Rightarrow \sqrt{x^2}=1$
- $|x|=1 \Rightarrow x=1 \vee x=-1$
- $\text{Dom } g = \{x \in \mathbb{R}\} - \{-1, 1\}$
- Def $\text{Im } g := \{g \in \mathbb{R} / \exists x \in \text{Dom } g / g = g(x)\}$
- $g = \frac{1}{x^2-1} \Leftrightarrow x^2-1 = \frac{1}{g} \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{g} + 1 \Leftrightarrow |x| = \sqrt{\frac{1}{g}+1} \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{g}+1}$
- $g \neq 0, \frac{1}{g} \geq -1 \Leftrightarrow \begin{cases} g > 0 \Rightarrow 1 \geq -g & -1 \leq g & g > 0 \\ g < 0 \Rightarrow 1 \leq -g & -1 \geq g & -1 \geq g \end{cases}$
- $\text{Im } g = \{g \in \mathbb{R} / g > 0, g \leq -1\} = (-\infty, -1] \cup (0, \infty)$

5. Sea $f(x) = 1/(1+x)$. Interprete los siguiente:

a) $f(f(x))$ Para cuales x tiene sentido?

- $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1\}$

- $f(f(x)) = \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}} = \frac{1}{\frac{1+x+1}{1+x}} = \frac{1+x}{2+x}$
- $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1, -2\}$
- Notar que si al principio no excluyo $x = -1$ la expresion queda indefinida. Por lo cual para seguir operando tengo que primero excluir el caso $x = -1$ para luego encontrar que $x = -2$ tampoco puede estar en la solucion.

b) $f(1/x)$

- $f(1/x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{x+1}{x}}, x \neq 0$
- $f(1/x) = \frac{x}{x+1}, x \neq -1$
- $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1, 0\}$

c) $f(cx) = \frac{1}{1+cx}$

- $1+cx=0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{c}$
- $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{-1/c\}$

6. Sean $C(x) = x^2$, $H(x) = \frac{1}{x}$, $S(x) = \text{sen}(x)$

a) Determinar: $(C \circ H)(y)$

$$- (C \circ H)(y) = \left(\frac{1}{y}\right)^2 = \frac{1}{y^2}$$

b) Determinar: $(C \circ H \circ S)(t) + (S \circ H)(t)$

- $(C \circ H \circ S)(t) = \left(\frac{1}{\text{sen } t}\right)^2 = \frac{1}{\text{sen}^2 t}$
- $(S \circ H)(t) = \text{sen}\left(\frac{1}{t}\right)$
- $(C \circ H \circ S)(t) + (S \circ H)(t) = \frac{1}{\text{sen}^2 t} + \text{sen}\left(\frac{1}{t}\right)$

7.

a) Para cada conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$, definimos la funcion C_A como sigue:

$$C_J = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in J \\ 0 & \text{si } x \notin J \end{cases}$$

Encontrar expresiones para:

i. $C_{A \cap B}$

- Hay dos opciones $C_{A \cap B} = \emptyset$ o $C_{A \cap B} \neq \emptyset$
- Supongamos que: $C_{A \cap B} \neq \emptyset$

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \cap B$	$C_{A \cap B}(x)$	$C_A(x)C_B(x)$
1	1	1	1	1·1
0	0	0	0	0·0
1	0	0	0	1·0
0	1	0	0	0·1

– Conclusion: $C_{A \cap B}(x) = C_A(x)C_B(x)$

ii. $C_{A \cup B}$

– $A \cup B = A + B - A \cap B$

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A \cup B = A + B - A \cap B$	$C_{A \cup B}(x)$	$C_A(x) + C_B(x) - C_A(x)C_B(x)$
1	1	1	1	1 + 1 - 1·1
0	0	0	0	0 + 0 - 0·0
1	0	1	1	1 + 0 - 1·0
0	1	1	1	0 + 1 - 0·1