

1 Funcion de Correlacion

1.1 Breve apartado: Valores de espectacion

Este es un concepto que aparece todo el tiempo, y que vale volver a tenerlo bien en cuenta.

El valor de espectacion se define como la suma pesada de todos los valores que puede tomar una variable estocastica y sus probabilidades:

Para variable discreta:

$$E[X] = \langle X \rangle = \sum_{i=1}^N x_i P(X = x_i)$$

O bien tambien se puede definir para variables continuas:

$$E[X] = \langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx$$

Donde debemos tener en cuenta que: $\sum_{i=1}^N P(X = x_i) = 1$ y que $\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1$.

1.1.1 Propiedades de los valores de expectacion

Algunas propiedades utiles de los valores de expectacion son las siguientes:

1. Linearity:

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a \mathbb{E}[X] + b \mathbb{E}[Y]$$

for constants a, b .

This holds whether or not X and Y are independent.

2. Expectation of a constant:

$$\mathbb{E}[c] = c$$

3. Nonlinearity in general:

$$\mathbb{E}[f(X)] \neq f(\mathbb{E}[X]) \quad \text{in general.}$$

For example, $\mathbb{E}[X^2] \neq (\mathbb{E}[X])^2$.

4. Variance in terms of expectation:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

5. Independence:

If X and Y are independent,

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$$

Figure 1.

1.2 Funcion de Correlacion de dos puntos

- Since many catalogs list positions of galaxies, or clusters of galaxies, or radio sources, it is often useful to think of the matter distribution as a distribution of point-like objects that could be nucleons, or galaxies, or clusters of galaxies.

- If differences among objects are ignored, it is only a question of the nature of the distribution of positions $\mathbf{r}_j$ and this can be described by the n-point correlation functions.
- Consider a tiny region of volume dV . On average, the expected number of objects in that region is $\langle N \rangle = nV$. Aquí lo que dice es que si se considera un volumen V la probabilidad media de encontrar un objeto es nV .
- The probability of finding an object in dV in one realization is $P = n dV$ esto lo que nos dice es que n aquí es una densidad de probabilidad.
- The two-point correlation function is defined by the joint probability of finding an object in both of the volume elements: dV_1, dV_2 at a separation r_{12} :

$$P = n^2 dV_1 dV_2 [1 + \xi(r_{12})]$$

- Nota: Aca entiendo yo, que n es la densidad media, ya que las probabilidades siempre se escriben como $P = \rho(r) dV$.
- For a **Poisson / uniform distribution**, the two events are independent:

$$P = (n dV_1)(n dV_2)$$

- But in the real Universe, galaxies are **not independent**, If you find one galaxy in dV_1 , you're **more likely** to find another nearby (clustering). Or, in voids, you're **less likely** to find another nearby (anti-clustering). This departure from independence is captured by the **two-point correlation function** $\xi(r_{12})$.

- $\xi(r_{12}) = \begin{cases} \xi(r) = 0 & \text{completely random (Poisson) distribution.} \\ \xi(r) > 0 & \text{excess probability (clustering).} \\ \xi(r) < 0 & \text{deficit probability (anti-clustering, e.g. voids).} \end{cases}$

- All this meaning that: $\xi(r) = \frac{P}{P_{\text{random}}} - 1$
- The mean number of neighbors within distance r of a randomly chosen object is the integral:

$$\langle N \rangle_p = \frac{4}{3}\pi r^3 n + n \int_0^r \xi(r') dV$$

- If galaxies were just sprinkled randomly at mean number density n , then the expected number of neighbors in a sphere of radius r is simply density $\times$ volume:

$$\langle N \rangle_p^{\text{random}} = \frac{4}{3}\pi r^3 n$$

- But if galaxies cluster, then the probability of finding a galaxy in a small volume element dV at distance r' from the chosen galaxy is enhanced (or suppressed) by the two-point correlation function:

$$dN = n[1 + \xi(r')]dV$$

- This way:

$$\langle N \rangle = n \int_{V(r')} dV + n \int_{V(r')} \xi(r') dV$$

1.3 Moments of counts of objects

- A useful illustration of the meaning of the n-point correlation functions is their relation to the moments of counts of objects. There are two interesting cases:
 - where the objects are counted in a randomly placed cell
 - the cell is centered on a randomly chosen object.

1.3.1 Randomly placed Cell

Explicaremos primero esta parte:

Consideremos un volumen V , el cual esta dividido en volúmenes infinitesimales dV_i . Ahora denotamos como n_i el numero de objetos en dV_i teniendo en cuenta que la densidad media es: $n = \frac{N}{V}$.

Como los volúmenes son tan chicos, entonces a lo sumo hay dos opciones para cada dV_i : $n_i = 0$ o bien $n_i = 1$, con probabilidad: $n dV_i$. La chance de tener algun elemento mas, es decir $n_i > 1$ es muy chica, infinitesimal y por ende es de mayor orden: $(dV_i)^2$.

Si ahora calculáramos el valor de expectacion:

$$\langle n_i \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} x_k P(n_i = k)$$

Sabemos que solo hay 2 posibilidades, $n_i = 0, 1$ para el resto, las probabilidades son extremadamente bajas y por lo tanto podríamos decir que: $P(n_i = k) = 0 \forall x_k > 1$. Entonces:

$$\langle n_i \rangle = 0 \cdot P(n_i = 0) + 1 \cdot P(n_i = 1) = 1 \cdot n dV_i$$

Si ahora pensáramos que queremos calcular momentos de orden mas alto:

$$\langle n_i^2 \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot P(n_i = k) = 0 + 1 \cdot n dV_i = \langle n_i \rangle$$

Lo mismo sucede con los momentos de orden mas alto. Para el caso de dos volúmenes calcularíamos:

$$\langle n_i n_j \rangle = \sum_k \sum_l x_k x_l P(n_i = k, n_j = l) = P(n_i = 1, n_j = 1) = (n dV_i)(n dV_j)[1 + \xi(r_{12})]$$

Donde el ultimo paso de la igualdad tenemos la probabilidad adjunta: $P(n_i = 1, n_j = 1)$.

Si ahora quisiéramos calcular el conteo total en todas las celdas, es decir calcular el N total para toda la caja, tenemos que sumar todas las ocupancias en los volúmenes infinitesimales.

$$N = \sum_i n_i$$

Por otro lado podemos calcular el conteo promedio:

$$\langle N \rangle = \langle \sum_i n_i \rangle = \text{linealidad valor expectacion} = \sum_i \langle n_i \rangle = \sum_i P(n_i = 1) = \sum_i n dV_i$$

En el limite continuo la suma se convierte en una integral: $\sum_i n dV_i = \int_V n dV = n V$

En consecuencia obtenemos el resultado final:

$$\langle N \rangle = n V$$

Calculemos ahora: $\langle N^2 \rangle$

$$N^2 = N \cdot N = \sum_i n_i \sum_j n_j = \sum_i \sum_j n_i n_j = \sum_i n_i^2 + \sum_{i \neq j} n_i n_j$$

Teniendo esto en cuenta ahora podemos calcular:

$$\langle N^2 \rangle = \sum_i \langle n_i^2 \rangle + \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle$$

En este punto, acordarse que: $\langle n_i^2 \rangle = \langle n_i \rangle$, de manera que: $\sum_i \langle n_i^2 \rangle = \sum_i \langle n_i \rangle = \langle N \rangle = nV$. Esto representa los terminos de la diagonal. Ahora vamos con los terminos fuera de la diagonal:

Sabemos que: $\langle n_i n_j \rangle = n^2 (ndV_i)(ndV_j)[1 + \xi(r_{ij})]$. Entonces para el caso: $\sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle$ podemos pasar a integrales:

$$\sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle \rightarrow \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2$$

En consecuencia, juntando todo:

$$\langle N^2 \rangle = \sum_i \langle n_i^2 \rangle + \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle = nV + \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2$$

A modo de conclusion tenemos entonces que la varianza se puede expresar como:

$$\text{Var}(N) = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = nV + \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2 - n^2 V^2$$

Podemos elaborar la integral:

$$\int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2 = n^2 V^2 + \int_V \xi(r_{12}) dV_1 dV_2$$

De manera que finalmente obtenemos:

$$\text{Var}(N) = nV + n^2 \int_V \xi(r_{12}) dV_1 dV_2$$

Se puede ir un poco mas lejos y escribir:

$$\text{Var}(N) = nV + n^2 V \int_V \xi(r_{12}) dV = nV \left(1 + n \int_V \xi(r_{12}) dV \right)$$

1.3.2 Calculo de la media de N^3

Podemos intentar calcular $\langle N^3 \rangle$ para ver que obtenemos:

$$\langle N^3 \rangle = \left\langle \sum_i \sum_j \sum_k n_i n_j n_k \right\rangle = \left\langle \sum_i n_i^3 + 3 \sum_{i \neq j} n_i^2 n_j + 6 \sum_{i < j < k} n_i n_j n_k \right\rangle$$

Esta expresion se puede dividir en 3:

$$\sum_i \langle n_i^3 \rangle + 3 \sum_{i \neq j} \langle n_i^2 n_j \rangle + 6 \sum_{i < j < k} \langle n_i n_j n_k \rangle$$

Nuevamente, sabemos que, por lo visto al principio: $\langle n_i^3 \rangle = \langle n_i \rangle$. Por otro lado, podemos decir que $n_i^2 = n_i$ en el contexto de que n_i toma solo valores 0 o 1. De manera que la suma anterior la podemos expresar como:

$$\sum_i \langle n_i \rangle + 3 \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle + 6 \sum_{i < j < k} \langle n_i n_j n_k \rangle$$

Los primeros 2 terminos ya los conocemos:

$$\sum_i \langle n_i \rangle + \sum_{i \neq j} \langle n_i n_j \rangle = nV + \int_V n^2 [1 + \xi(r_{12})] dV_1 dV_2$$

Si trabajamos el ultimo termino:

$$\sum_{i < j < k} \langle n_i n_j n_k \rangle = \sum_{i < j < k} x_i x_j x_k P(n_i = i, n_j = j, n_k = k)$$

Donde solo sobreviven las opciones $x = 1$

1.4 Funcion de correlacion angular de 2 puntos

En esta seccion ahora lo que hacemos es proyectar nuestros objetos en un plano, concretamente en la superficie de una esfera y donde mediremos las distancias angulares entre objetos. Podemos considerar entonces una densidad por unidad de [Superficie](#):

$$n = \frac{N}{d\Omega_{\text{tot}}}$$

Entonces, la probabilidad de encontrar un objeto en un diferencial de angulo solido estara dada por:

$$P(\text{objeto en } d\Omega) = n d\Omega$$

Podemos por ejemplo calcular la media (o primer momento) de encontrar un objeto:

$$\langle N \rangle = \left\langle \sum_i n_i \right\rangle = \sum_i \langle n_i \rangle = \langle n_i \rangle = n \int d\Omega = n\Omega$$

Nuevamente podemos tratar de calcular la varianza en este contexto, pero para ello tendremos que resolver cual es la probabilidad adjunta:

$$\langle n_i n_j \rangle = n^2 d\Omega_i d\Omega_j [1 + w(\theta_{12})]$$

Donde la definicion es similar a la vista en la funcion de correlacion, solo que ahora la distancia es angular y esta sobre una superficie esferica. Todas las cosas que habiamos calculado anteriormente son aplicables para este caso. Entiendase que en este caso ya no estamos en 3D si no en 2D.

Para colaborar con la comprension del concepto, Peebles dice esto en la ec 45.3: *The two-point correlation function is defined by the joint probability of finding objects in both of the elements of solid angle $d\Omega_1$ and $d\Omega_2$ placed at a separation θ_{12} .*

1.5 Relacion entre la funcion de correlacion de dos puntos angular y espacial.

1.6 Estableciendo la relacion inicial entre $w(\theta)$ y $\xi(r)$

- Lo que queremos hacer ahora es relacionar la funcion de correlacion angular $w(\theta)$ con la funcion de correlacion espacial $\xi(r)$.
- Para encontrar esa relacion, empezamos considerando el caso para galaxias en un survey, las cuales tienen ahora asociada una magnitud en un dado volumen. Recordemos que para magnitudes la funcion de luminosidad nos da el numero de objetos entre M y $M + dM$. Entonces, el numero de galaxias por unidad de volumen sera: $\phi(M) dM$.
- En el siguiente paso lo que queremos hacer es computar el numero de objetos en un rango de magnitud y dentro de un volumen dado. La probabilidad de encontrar entonces un objeto en un dado rango de magnitudes y en un volumen es:

$$dP = \phi(M) dM dV$$

- Pero ahora volvemos a preguntarnos por el caso de encontrar un objeto de una determinada magnitud y despues otro a otra magnitud dada en volúmenes distintos:

$$dP_{12} = [\phi(M_1)\phi(M_2) + \Gamma(M_1, M_2, r_{12})] dM_1 dM_2 dV_1 dV_2$$

- Peebles destaca que:

$$- \quad n = \int \phi(M) dM$$

$$- \quad n^2 \xi(r) = \int dM_1 dM_2 \Gamma(M_1, M_2, r)$$

Esto ultimo se hace para tratar de encontrar una conexion con la funcion de correlacion espacial. En las definiciones anteriores vimos que:

$$dP_{12} = n^2 [1 + \xi(r)] dV_1 dV_2$$

Entonces podriamos hacer:

$$\{[\phi(M_1)\phi(M_2) + \Gamma(M_1, M_2, r_{12})] dM_1 dM_2\} dV_1 dV_2 = n^2 [1 + \xi(r)] dV_1 dV_2$$

Si integramos en M_i :

$$[\int \phi(M_1)\phi(M_2) dM_1 dM_2 + \int \Gamma(M_1, M_2, r_{12}) dM_1 dM_2] dV_1 dV_2 =$$

$$n^2 + \int \Gamma(M_1, M_2, r_{12}) dM_1 dM_2 = n^2 [1 + \xi(r)] = n^2 + n^2 \xi(r)$$

Es decir tendríamos que:

$$\boxed{\int \Gamma(M_1, M_2, r_{12}) dM_1 dM_2 = n^2 \xi(r)}$$

1.7 Relacion modulo distancia

- A la relacion obtenida anteriormente le agregaremos la relacion de modulo distancia:

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10[\text{pc}]} \right)$$

- Esta relacion suele expresarse como:

$$m = M + 5 \log r + 25$$

- Queremos reemplazar esto en la funcion de luminosidad:

$$\phi(M) = \phi(m - 5 \log r - 25)$$

- Entonces en el calculo de nuestra probabilidad $P = \phi(M) dM dV$ pasamos a:

$$dP = \phi(m - 5 \log r - 25) dm r^2 dr d\Omega$$

- Donde basicamente $dV = r^2 dr d\Omega$. En lo siguiente se calcula la integral asociada al radio:

$$dP = d\Omega dm \int \phi(m - 5 \log r - 25) r^2 dr$$

1.7.1 La relacion numero-magnitud

En lo siguiente haremos referencia al apartado de conteo de estrellas. En lineas generales, si consideramos un volumen definido por un angulo solido de Ω y una distancia r , el numero total de estrellas que encontraremos sera:

$$N(r) = \rho V = \rho \frac{1}{3} \Omega r^3$$

De la relacion modulo distancia tenemos que:

$$m - M = 5 \log \left(\frac{r}{10[\text{pc}]} \right)$$

Para estrellas de una magnitud absoluta dada M , para distintas magnitudes obtendremos una distancia asociada:

$$r = 10^{(m-M)/5} \cdot 10[\text{pc}] = 10^{(m-M+5)/5} [\text{pc}]$$

Se asocia el numero de galaxias hasta magnitud aparente m a la siguiente ecuacion:

$$N(m) = k 10^{0.6m}$$

Peebles toma a la profundidad caracteristica del Survey como:

$$D = 10^{0.2(m_0 - M^*) - 5} [\text{Mpc}]$$

1.8 Continuacion

Retomamos el analisis de la integral:

$$dP = d\Omega dm \int \phi(m - 5 \log r - 25) r^2 dr$$

- Esta expresion representa la probabilidad de encontrar un objeto entre m y $m + dm$

Y ahora hacemos el siguiente cambio de variables: $r = s 10^{0.2m}$. Entonces:

$$dr = ds 10^{0.2m}, r^2 = s^2 10^{0.4m}; s^2 ds = s^2 10^{0.6m} ds$$

$$\phi(m - 5 \log r - 25) = \phi(m - 5 \log s - 5(0.2m) - 25) = \phi(-5 \log s - 25)$$

De manera que la probabilidad de encontrar un objeto es:

$$dP = dm d\Omega 10^{0.6m} \int_0^\infty s^2 \phi(-5 \log s - 25) ds$$

Lo que hace aqui Peebles es destacar que la relacion numero-magnitud es la correspondiente a la integral:

$$\frac{dN}{dm} = 10^{0.6m} \int_0^\infty s^2 \phi(-5 \log s - 25) ds$$

Aunque esta expresion no me consta, de ser asi entonces la probabilidad se puede escribir como:

$$dP = (dN / dm) dm d\Omega$$

1.9 Calculo de $P = \phi(M) dM dV$

Recapitulando , recordemos que lo que queriamos era calcular la probabilidad de encontrar un objeto en un rango de magnitudes y de volumen, de manera que la probabilidad de hacer esto para un solo objeto es:

$$P = \phi(M) dM dV$$

En todo lo anterior, esta expresion la terminamos transformando, a la probabilidad de encontrar un objeto con una magnitud definida a una distancia angular θ .

$$dP = \phi(m - 5 \log r - 25) dm r^2 dr d\Omega$$

Y finalmente llegamos a una expresion para esta probabilidad dependiente de los conteos de estrellas:

$$dP = (dN / dm) dm d\Omega$$

Pero ahora, lo que nos interesa es la probabilidad conjunta:

$$dP_{12} = \left[\left(\frac{dN_1}{dm_1} \right) \left(\frac{dN_2}{dm_2} \right) + g(m_1, m_2, \theta_{12}) \right] dm_1 dm_2 d\Omega_1 d\Omega_2$$

Como podemos ver, aparece nuevamente este termino $g(m_1, m_2, \theta_{12})$ de probabilidad conjunta. La expresion final es, a mi entender una expresion en 2D. Peebles escribe la relacion entre 2D y 3D de la siguiente forma:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2 \Gamma(M_1, M_2, r_{12})$$

$$r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta$$

1.10 Aproximacion de separaciones pequenas y relaciones de escala

- Asumamos que la escala máxima de agrupamiento de galaxias apreciable es pequeña en comparación con las distancias típicas de las galaxias en la muestra.
- Supongamos que tenemos dos galaxias con distancias comoviles r_1, r_2 y una separacion angular θ_{12} . La separacion en 3D de estos objetos se puede calcular por la ley del coseno en coordenadas esfericas:

$$r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos \theta$$

- Si uno ahora asume la aproximacion por angulos pequenos, donde la separacion angular es $\theta \ll 1$ entonces:

$$\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$$

- Si ahora reemplazamos esto en la expresion de la distancia:

$$r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) \Leftrightarrow r_{12}^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 + \theta^2 r_1 r_2$$

- La expresion anterior se puede reescribir:

$$r_{12}^2 = (r_1 - r_2)^2 + \theta^2 r_1 r_2$$

- Ahora lo que se hace es plantear un cambio de variables:

$$u = r_2 - r_1 \text{ y } r = \frac{r_1 + r_2}{2}; \text{ en esta parte se hace una aproximacion: } r_1 r_2 \approx r^2$$

- De manera que tenemos:

$$r_{12}^2 \approx u^2 + \theta^2 r^2$$

1.10.1 Scaling relation

Hasta ahora vimos que la expresion para la relacion angular de escala esta dada por:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2 \Gamma(M_1, M_2, r_{12})$$

En la aproximacion de angulos pequenos: $r_i \approx r$ de manera que esta expresion nos queda:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r^4 dr \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, r_{12}(u, r)) du$$

Ahora, utilizando la ecuacion de modulo de distancia escribe la distancia caracteristica como:

$$M = m - 5 \log r - 25 \Leftrightarrow D = 10^{0.2(m - M^*) - 5} [\text{Mpc}]$$

En todo esto lo que hace es considerar $r = Dy$, que, supuestamente no es mas que un cambio de escala.

Entonces, cuando hacemos $dr = Ddy$, de manera que: $r^4 dr = D^5 y^4 dy$.

- Por otro lado: $(r\theta)^2 = (Dy\theta)^2$, de manera que: $r_{12}^2 = u^2 + (Dy\theta)^2$
- Encima vamos a hacer otra sub-definicion mas: $D\theta = x$
- Si ahora traemos nuevamente la expresion:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = \int_0^\infty r^4 dr \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, r_{12}(u, r)) du$$

- Reemplazamos lo que encontramos anteriormente:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du$$

- La expresion en rojo la podemos escribir como:

$$g(m_1, m_2, \theta_{12}) = D^5 g(\Delta m, x)$$

- Se debe tener en cuenta que las magnitudes estrella son las siguientes:

$$- \quad M_i = M^* + \frac{\Delta m}{2} - 5 \log y$$

- A posterior, peebles nos indica que la expresion para la probabilidad que vimos:

$$dP = r^2 dr d\Omega dm \phi(m - 5 \log r - 25)$$

Si la integramos en la distancia r obtenemos:

$$dP = d\Omega dm \int_0^r r^2 \phi(m - 5 \log r - 25) dr$$

- Si le agregamos lo anteriormente visto:

$$dP = d\Omega dm D^3 \int_0^\infty y^2 dy \phi(M^* - 5 \log y)$$

1.11 Funcion de Luminosidad y funcion de seleccion

Lo siguiente puede ser extraido del capitulo 3.10 del libro de Peter Schneider de galaxias. La funcion de luminosidad es la densidad de objetos $\Phi(M)$ con una determinada magnitud (o luminosidad). Si integramos esta densidad en la magnitud, entonces tenemos el numero de objetos con magnitud entre $M, M + dM$.

Entonces el numero de objetos con una determinada magnitud estara dada por:

$$n = \int \Phi(M) dM$$

Funcion de Seleccion:

La funcion de seleccion nos da la **probabilidad** de que una **galaxia a una distancia comovil** $r = yD$ **sea incluida en el catalogo** de un Survey, para unos limites dados en magnitud aparente del mismo.

Tal y como se define en el libro de Peebles:

$$\phi(y) = \frac{1}{n} \int dM \Phi(M) f(M - M^* + 5 \log y)$$

Donde f es alguna funcion ventana.

1.12 La funcion de seleccion

- Hasta ahora se han derivado expresiones para la funcion de conteo de pares $g(m_1, m_2, \theta)$, donde las galaxias son seleccionadas por su magnitud aparente individual.
- Es decir, si tuviesemos un catalogo ideal donde, cada objeto tiene asociada su magnitud aparente, podriamos trabajar con la funcion $g(m_1, m_2, \theta)$ directamente para el conteo de pares.
- Pero usualmente los catalogos incluyen ciertas galaxias mas brillantes que alguna magnitud limite m_0 . En un catalogo real, solamente tenemos objetos con magnitud $m < m_0$.
- En lugar de un corte limpio en m_0 incluimos una funcion probabilistica, que nos da basicamente la probabilidad de que un objeto de una determinada magnitud este en el catalogo. Por ejemplo, si el catalogo fuera completo hasta m_0 entonces significa que la funcion de seleccion es una step function:

$$f(m - m_0) = \begin{cases} 1 & \text{si } m \leq m_0 \\ 0 & \text{si } m > m_0 \end{cases}$$

- En realidad, los objetos cercanos a magnitudes m_0 tienen una probabilidad de aparecer o des aparecer debido a errores sistematicos o incompletidues.
- La funcion $f(m - m_0)$ hace un corte suave al rededor de la magnitud limite m_0 en lugar de un corte abrupto como en el caso de un catalogo completo hasta m_0 .
- Si entonces consideramos esto para cada objeto:

$$f_\alpha = f(M_\alpha - M^* + 5 \log y)$$

Esta es la probabilidad de seleccion para una galaxia con magnitud M_α localizada a una distancia adimensional y .

- Escribimos a g como:

$$g = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du dM_1 dM_2$$

Donde hemos indicado explicitamente la dependencia de f_i con y .

- Aqui Peebles escribe que entonces:

$$g = N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du dM_1 dM_2$$

- De la ecuacion:

$$\frac{dN}{dm} = 10^{0.6m} \int_0^\infty s^2 \phi(-5 \log s - 25) ds$$

Podemos calcular: $N \propto D^3$. Es decir que el numero de galaxias, crece con el factor D al cubo.

- Si volvemos a la ecuacion:

$$N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du$$

E incluimos que $N^2 \propto D^6$ obtendremos que: $w(\theta) \propto \frac{D^5}{D^6} = D^{-1}$

- Entonces finalmente se plantea: $w(\theta) = D^{-1} W(\theta D)$. Diagramemos algunas condiciones sobre esto:
 - La funcion de correlacion angular $w(\theta)$ depende de la variable de escala $x = \theta D$, la cual es la separacion fisica proyectada para la profundidad caracteristica del survey.
 - Surveys mas profundos (Mayor D) dan como resultado un clustering aparente menor para una separacion angular fija porque se proyectan más galaxias de primer plano y de fondo no correlacionadas.
 - La forma de $w(\theta)$ es universal, cuando se la dibuja en funcio nde $x = \theta D$, esta es independiente de la profundidad del survey.
 - Ley de Escalas de Limber: La proyeccion diluye la correlacion en 3D y muestras mas profundas hacen que el clustering angular sea mas debil pero no con una forma diferente. (Tienen la misma forma)

1.13 Desacoplando magnitud y posicion

- A partir de aca voy a utilizar Φ para denotar a la funcion de luminosidad en lugar de ϕ .
- Empezamos asumiendo que la magnitud absoluta de una galaxia es estadisticamente independiente de su posicion, relativa a otras galaxias. Entonces la distribucion adjunta:

$$\Gamma(M_1, M_2, r_{12}) = \Phi(M_1) \Phi(M_2) \xi(r_{12})$$

- Recomendando tener en cuenta que: $r_{12}^2 \approx u^2 + \theta^2 r^2$
- Asumiendo esto tomemos la ecuacion:

$$N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Gamma(M_1, M_2, \sqrt{u^2 + (xy)^2}) du dM_1 dM_2$$

Escribimos:

$$N^2 w(\theta) = D^5 \int_0^\infty y^4 dy f_1(y, M_1) f_2(y, M_2) \int_{-\infty}^\infty \Phi(M_1) \Phi(M_2) \xi(r_{12}) du dM_1 dM_2$$

- Tendiendo en cuenta la expresion vista de la funcion de Seleccion entonces podemos escribir la integral, teniendo en cuenta que:

$$- \int f_i \Phi(M_i) dM_i = n \phi(y)$$

Entonces la integral nos queda:

$$N^2 w(\theta) = D^5 n^2 \int_0^\infty y^4 \phi^2(y) dy \int_{-\infty}^\infty \xi(r_{12}(u)) du$$

1.14 La ecuacion de Limber

Al hacer la separacion $\Gamma(M_1, M_2, r_{12}) = \Phi(M_1)\Phi(M_2)\xi(r_{12})$, se asume que las magnitudes absolutas de las galaxias son independientes del clustering espacial. Las magnitudes solo afectan a la seleccion de las galaxias mientras que el clustering solo depende de $\xi(r_{12})$.

Ahora examinemos la expresion que obtuvimos anteriormente:

$$N^2 w(\theta) = D^5 n^2 \int_0^\infty y^4 \phi^2(y) dy \int_{-\infty}^\infty \xi(r(u)) du$$

Donde: $r^2 = u^2 + (yD\theta)^2$. Aqui $w(\theta)$ es la funcion angular de correlacion de dos puntos. La ecuacion anterior nos dice basicamente que $w(\theta)$ es una proyeccion en el plano perpendicular a la LOS de la funcion de correlacion 3D $\xi(r)$ pesada por la funcion de seleccion radial.

El numero total de las galaxias en el survey esta dado por [Aca me falta hacer cuentas]:

$$N = nD \int_0^\infty y^2 \phi(y) dy$$

Teniendo en cuenta esto, entonces lo que tenemos que hacer es despejar $w(\theta)$:

$$w(\theta) = \frac{D^3 n \int_0^\infty y^4 \phi^2(y) dy \int_{-\infty}^\infty \xi(r(u)) du}{[\int_0^\infty y^2 \phi(y) dy]^2}$$

2 Teoria de Perturbaciones

2.1 Dinamica de particulas en coordenadas que se expanden

Para empezar esta seccion traemos conclusiones de la seccion anterior del libro de Peebles. En principio tenemos las ecuaciones de Newton:

$$\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G \rho$$

Donde ρ es la densidad de masa, bueno ahora, con el laburo de la seccion anterior lo que obtenemos es esta ecuacion:

$$\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G(\rho + 3p/c^2) - \Lambda$$

De donde traemos de la relatividad general contribuciones debido a la presion y a la constante cosmologica. Para obtener las ecuaciones de la geodesicas a partir de este potencial hacemos:

$$\frac{d^2 r^\alpha}{dt^2} = -\partial_r \Phi_\alpha$$

2.2 Coordinadas propias vs coordenadas comoviles

Ahora describiremos la posición de un objeto en el espacio tiempo y distinguiremos entre dos tipos de coordenadas:

$$r(t) = a(t) x$$

- r : Separación propia, esta es la separación que medimos usualmente.
- x : Coordenada comóvil, son las que se expanden o contraen con el universo y por ende siempre son las mismas.

En un universo que se expande las distancias $r(t)$ que separan 2 objetos crecen en el tiempo.

2.3 Potencial gravitacional en un fondo homogéneo

El libro continúa haciendo las siguientes simplificaciones, supongamos que:

$p \ll \rho c^2$ y que $\Lambda = 0$, por lo cual recaemos al caso: $\nabla_r^2 \Phi = 4\pi G \rho$, entonces podemos hacer los siguientes cálculos:

Assume spherical symmetry, so $\Phi_b = \Phi_b(r)$. The radial Laplacian is

$$\nabla^2 \Phi_b(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right).$$

Poisson becomes

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right) = 4\pi G \rho_b.$$

Multiply by r^2 and integrate once (from 0 to r or formally),

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} \right) = 4\pi G \rho_b r^2.$$

Integrate with respect to r :

$$r^2 \frac{d\Phi_b}{dr} = \int_0^r 4\pi G \rho_b r'^2 dr' = 4\pi G \rho_b \frac{r^3}{3},$$

where we chose the integration constant so the left-hand side vanishes at $r = 0$ (regularity at the origin).

Divide by r^2 :

$$\frac{d\Phi_b}{dr} = \frac{4\pi G \rho_b}{3} r.$$

Integrate once more (choose potential at $r = 0$ as zero, pure convention):

$$\Phi_b(r) = \int_0^r \frac{4\pi G \rho_b}{3} r' dr' = \frac{4\pi G \rho_b}{3} \frac{r^2}{2} = \frac{2\pi G \rho_b}{3} r^2.$$

So

$$\boxed{\Phi_b(r) = \frac{2}{3} \pi G \rho_b r^2}$$

Entonces si reemplazamos: $r(t) = a(t) x$ en la ecuacion de movimiento a partir de este potencial obtenemos:

$$\frac{d^2 r^\alpha}{dt^2} = -\Phi_\alpha$$

Luego:

$$-\partial_r \Phi = -\frac{4}{3}\pi G \rho r$$

Luego, utilizando la ecuacion: $\frac{d^2 r^\alpha}{dt^2} = -\partial_r \Phi_\alpha$ y cancelando las coordenadas comoviles obtenemos:

$$\frac{d^2 a(t)}{dt^2} = -\frac{4}{3}\pi G \rho_b(t) a(t) \quad (1)$$

Aqui se incluye un subindice b denotando a background.

2.4 Velocidades de las coordenadas comoviles

Anteriormente habiamos definidos:

$$r(t) = a(t) x$$

Si dicha particula esta en reposo con respecto al fluido de Hubble entonces la misma tiene velocidad nula. Sin embargo, supongamos que tiene una velocidad peculiar y por lo tanto ya no esta en reposo, entonces tendremos:

$$r(t) = a(t) x(t)$$

Por lo tanto: $u(t) = \frac{d}{dt} a(t) x(t) + \frac{dx(t)}{dt} a(t)$

2.5 Lagrangiano de las particulas en movimiento

Recordemos la formulacion lagrangiana, en ella en lugar de trabajar con fuerzas como en newton, trabajamos en terminos de la energia cinetica y potencial:

$$L = K - U$$

En terminos de lo anterior, entonces escribimos el lagrangiano de nuestra energia cinetica y potencial:

$$K = \frac{1}{2} m u^2 = \frac{1}{2} m (\dot{a} x + \dot{x} a)^2$$

Mientras que la energia potencial

$$U = m \Phi$$

Podemos escribir entonces el lagrangiano como:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{a} x + \dot{x} a)^2 - m \Phi$$

Este lagrangiano puede ser complicado sobre todo porque si desarrollamos el cuadrado tendremos el termino $2 x a \dot{x} \dot{a}$.

Si hacemos una transformada canonica: $L \rightarrow L - \frac{d\psi}{dt}$ con $\psi = \frac{1}{2} m a \dot{x}^2$. Esta transformacion no modifica las ecuaciones de Euler Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

La transformacion canonica anterior reduce nuestro lagrangiano a:

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 a^2 - m \phi$$

Donde: $\phi = \Phi + \frac{1}{2} a \ddot{x} x^2$, es el nuevo potencial. Ahora reescribimos la ecuacion de Poisson utilizando este potencial:

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho(x, t) a^2 + 3a \ddot{x}$$

Notar que hemos pasado de r a x .

Ahora se sigue trabajando de la siguiente forma:

Peebles' equation (7.2) (Newtonian form) for the homogeneous background is

$$\ddot{a}(t) = -\frac{4\pi G}{3} \rho_b(t) a(t),$$

where $\rho_b(t)$ is the mean background density.

Multiply both sides by $3a$:

$$3a\ddot{a} = 3a \left(-\frac{4\pi G}{3} \rho_b a \right) = -4\pi G \rho_b a^2.$$

Substitute this into the right-hand side of (7.8):

$$\nabla_x^2 \phi = 4\pi G a^2 \rho(\mathbf{x}, t) - 4\pi G a^2 \rho_b(t) = 4\pi G a^2 [\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)].$$

This is exactly Peebles' equation (7.9):

$$\boxed{\nabla_x^2 \phi = 4\pi G a^2 [\rho(\mathbf{x}, t) - \rho_b(t)]}.$$

Interpretation

- ϕ is the *peculiar* potential (original potential Φ plus the background correction).
- The source on the right is the **density contrast** (actual density minus background). That's why only deviations from homogeneity produce the peculiar potential — the uniform background has already been accounted for in the dynamics of $a(t)$.

