

---

# **Appunti di Analisi I**

Analisi Matematica (prof. Mongodi) - CdL Informatica  
Unimib - 23/24

Federico Zotti

2023-10-21

## Indice

<b>1</b>	<b>Insiemi</b>	<b>4</b>
1.1	Notazione . . . . .	4
1.2	Prodotto cartesiano . . . . .	4
1.3	Insieme delle parti . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Funzioni</b>	<b>5</b>
2.1	Funzioni Iniettive e Suriettive . . . . .	6
2.2	Immagine e controimmagine . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Numeri Reali</b>	<b>7</b>
3.1	Insiemi numerici . . . . .	7
3.2	Proprietà dei numeri reali . . . . .	7
3.2.1	Algebriche . . . . .	8
3.2.2	Di Ordinamento . . . . .	8
3.2.3	Assioma di Continuità . . . . .	8
3.3	Sottoinsiemi dei reali . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Inferiore, Superiore, Massimo e Minimo</b>	<b>9</b>
4.1	Estremo superiore ed Estremo inferiore . . . . .	10
4.1.1	Caratterizzazione di inf e sup . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Funzioni reali</b>	<b>11</b>
5.1	Grafici, Iniettività e Suriettività . . . . .	12
<b>6</b>	<b>Funzioni elementari</b>	<b>13</b>
6.1	Potenze pari . . . . .	13
6.2	Potenze dispari . . . . .	13
6.3	Esponenziali . . . . .	14
6.4	Funzioni trigonometriche . . . . .	14
6.4.1	Seno . . . . .	14
6.4.2	Coseno . . . . .	15
6.4.3	Tangente . . . . .	15

<b>7</b>	<b>Trasformazione di grafici</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Successioni</b>	<b>16</b>
8.1	Terminologia . . . . .	16
8.2	Successioni a valori reali . . . . .	17
8.3	Limite di una successione . . . . .	17
8.4	Teorema di unicità del limite . . . . .	18
8.5	Limitatezza delle successioni convergenti . . . . .	18
8.6	Teorema di permanenza del segno . . . . .	18
8.7	Retta reale estesa . . . . .	19
8.8	Teoremi algebrici . . . . .	19
8.9	Teoremi di confronto . . . . .	20
<b>9</b>	<b>Tecniche di calcolo dei limiti</b>	<b>21</b>
9.1	Disuguaglianza di Bernoulli . . . . .	21
9.2	Dimostrazione teorema del confronto a 2 . . . . .	22
<b>10</b>	<b>Criterio del rapporto &amp; Criterio della radice</b>	<b>22</b>
10.1	Criterio del rapporto . . . . .	22
10.2	Criterio della radice . . . . .	23
10.3	Fattoriale . . . . .	23
10.4	Gerarchia degli infiniti . . . . .	24
10.5	Criterio del rapporto-radice . . . . .	24
10.6	Dimostrazione del criterio della radice . . . . .	26
<b>11</b>	<b>Principio di induzione</b>	<b>26</b>
11.1	Disuguaglianza di Bernoulli (dimostrazione) . . . . .	27
11.2	Coeff. binomiali . . . . .	28
<b>12</b>	<b>Successioni monotone</b>	<b>28</b>
<b>13</b>	<b>Successioni per ricorrenza</b>	<b>30</b>
<b>14</b>	<b>Serie numeriche</b>	<b>32</b>
14.1	Definizione SBAGLIATA . . . . .	32

---

14.2	Definizione CORRETTA . . . . .	33
14.3	Carattere di una serie (comportamento) . . . . .	33
14.4	Serie telescopiche . . . . .	33
14.5	Serie geometriche . . . . .	34
14.6	Strumenti per lo studio delle serie . . . . .	35
14.6.1	Teoremi algebrici . . . . .	35
14.6.2	Condizione necessaria . . . . .	36
14.6.3	Serie note . . . . .	36
14.6.4	Serie a termini di segno costante . . . . .	37

# 1 Insiemi

## 1.1 Notazione

Per *elenco*: Prima operazione, poi insieme di partenza

$$A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

$$B = \{ n^2 \mid n \text{ naturale} \}$$

Per *proprietà*: Prima insieme che scelgo, poi la proprietà che verifico

$$C = \{ n \text{ naturale} \mid n \text{ è un quadrato} \}$$

Altri simboli:

$$\text{appartiene} \rightarrow a \in A$$

$$\text{non appartiene} \rightarrow a \notin A$$

$$\text{è sottoinsieme} \rightarrow A \subseteq B$$

$$\text{è sottoinsieme stretto} \rightarrow A \subset B$$

$$\text{insieme vuoto} \rightarrow \emptyset$$

$$\text{unione} \rightarrow A \cup B \mid \vee$$

$$\text{intersezione} \rightarrow A \cap B \mid \wedge$$

$$\text{sottrazione} \rightarrow A \setminus B$$

$$\text{cardinalità} \rightarrow |A|$$

## 1.2 Prodotto cartesiano

Dati due insiemi  $A$  e  $B$ , il loro **prodotto cartesiano** è l'insieme delle coppie  $(a, b)$  con  $a \in A$ ,  $b \in B$ .

Si indica con  $A \times B$ .

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

**Es:**

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

### 1.3 Insieme delle parti

Dato  $A$ ,  $\mathcal{P}(A)$  è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di  $A$ .

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

**Es:**

$$A = \{1, 2\}$$

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, A, \{0\}, \{1\}\}$$

## 2 Funzioni

Come si descrive una funzione:

1. Un insieme di partenza ( $A$ ) (*dominio*);
2. Un insieme di arrivo ( $B$ ) (*codominio*);
3. Una serie di regole che ad ogni elemento di  $A$  associa un **unico** elemento di  $f(a) \in B$ .

$$f : A \rightarrow B$$

Il grafico di una funzione è:

$$\begin{aligned} g &= \{(a, f(a)) \in A \times B \mid a \in A\} \\ &= \{(a, b) \in A \times B \mid b = f(a)\} \end{aligned}$$

## 2.1 Funzioni Iniettive e Suriettive

Sia  $f : A \rightarrow B$  una funzione.

- $f$  si dice **iniettiva** se manda elementi distinti di  $A$  in elementi distinti di  $B$ .

$$a_1 \in A, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

ovvero se

$$f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$$

- $f$  si dice **suriettiva** se ogni elemento di  $B$  è ottenuto da almeno un elemento di  $A$  tramite  $f$ .

$$\forall b \in B \exists a \in A \text{ t.c. } f(a) = b$$

Una funzione si dice **biunivoca** se è sia iniettiva che suriettiva.

**Teo:** Una funzione  $f : A \rightarrow B$  è biunivoca se e solo se è invertibile, cioè se e solo se esiste una funzione  $g : B \rightarrow A$  t.c.:

$$g(f(a)) = a \forall a \in A$$

$$f(g(b)) = b \forall b \in B$$

**Oss:**

$$f : A \rightarrow B$$

- è iniettiva se ogni elemento di  $B$  è ottenuto da al più un elemento di  $A$  tramite  $f$ ;
- è suriettiva se ogni elemento di  $B$  è ottenuto da almeno un elemento di  $A$  tramite  $f$ .

## 2.2 Immagine e controimmagine

Sia  $f : A \rightarrow B$  una funzione.

- Se  $b = f(a)$  con  $a \in A, b \in B$ , si dice che  $b$  è immagine di  $a$  tramite  $f$ ;
- Sia  $C \subseteq A$  un sottoinsieme, si dice *immagine di  $C$*  tramite  $f$  l'insieme degli elementi di  $B$  che sono immagine di elementi di  $C$ .  $f(C) = \{ f(a) : a \in C \} \subseteq B$
- Immagine di  $A$ :  $f(A) = \{ f(a) : a \in A \}$
- Sia  $D \subseteq B$  un sottoinsieme, si dice **controimmagine di  $D$**  tramite  $f$  l'insieme di tutti gli elementi di  $A$  che hanno immagine contenuta in  $D$ .
- Controimmagine di  $D$ :  $f^{-1}(D) = \{ a \in A : f(a) \in D \}$  (definita anche se  $f$  non è invertibile).

## 3 Numeri Reali

### 3.1 Insiemi numerici

- **Naturali**:  $\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$
- **Razionali**:  $\mathbb{Z} = \{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \setminus \{ 0 \} \}$
- **Reali**:  $\mathbb{R}$
- **Irrazionali**:  $\mathbb{Q}$
- **Complessi**:  $\mathbb{C}$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$$

### 3.2 Proprietà dei numeri reali

Sono di tre tipi:

- Algebriche;
- Di Ordinamento;
- Assioma di Continuità.



### 3.2.1 Algebriche

Sui numeri reali sono definite due operazioni  $+$  e  $\cdot$ , dette somma e prodotto, con le seguenti proprietà:

- Relative alla somma:
  - **Commutativa:**  $a + b = b + a \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (n, z, q, r, c)$
  - **Associativa:**  $(a + b) + c = a + (b + c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (n, z, q, r, c)$
  - **Elemento neutro somma:**  $\exists 0 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a + 0 = a \quad \forall a \in \mathbb{R} \quad (n, z, q, r, c)$
  - **Esistenza dell'inverso:**  $\forall a \in \mathbb{R} \exists b \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a + b = 0 \quad (z, q, r, c)$
- Relative al prodotto:
  - **Commutativa:**  $a \cdot b = b \cdot a \quad \forall a, b \in \mathbb{R} \quad (n, z, q, r, c)$
  - **Associativa:**  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (n, z, q, r, c)$
  - **Elemento neutro prodotto:**  $\exists 1 \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \cdot 1 = a \quad \forall a \in \mathbb{R} \quad (n, z, q, r, c)$
  - **Esistenza dell'inverso:**  $\forall a \in \mathbb{R} \exists b \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \cdot b = 1 \quad (q, r, c)$
- **Distributiva:**  $a \cdot (b + c) = ab + ac \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (n, z, q, r, c)$

### 3.2.2 Di Ordinamento

Dati due numeri reali  $x$  e  $y$ , si ha sempre che  $x \geq y$  oppure  $x \leq y$ . Tale ordinamento ha le proprietà:

- **Riflessiva:**  $x \geq x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- **Antisimmetrica:** se  $x \geq y \wedge y \geq x$ , allora  $x = y$
- **Transitiva:** se  $x \geq y \wedge y \geq z$ , allora  $x \geq z$
- se  $x \geq y$ , allora  $x + z \geq y + z \quad \forall z \in \mathbb{R}$
- se  $x \geq y$ , allora  $x \cdot z \geq y \cdot z \quad \forall z \in \mathbb{R} \text{ con } z \geq 0$

Queste valgono in  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ , ma non in  $\mathbb{C}$ .

### 3.2.3 Assioma di Continuità

Dati  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  sottoinsiemi diversi da  $\emptyset$ . Diciamo che  $A$  sta tutto a sinistra di  $B$  se  $a \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B$ .

L'assioma di continuità dice che se  $A$  sta tutto a sinistra di  $B$  allora esiste almeno un  $c \in \mathbb{R}$  t.c.  $c \geq a \forall a \in A; c \leq b \forall b \in B$ .

$c$  non è obbligato ad essere unico;  $c$  può appartenere ad  $A$ , a  $B$  o anche a entrambi (in questo caso è unico elemento "separatore").

**Es:**

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0 \wedge x^2 < 2\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0 \wedge x^2 > 2\}$$

$$\text{se } a \in A, b \in B \rightarrow a < b$$

$$c^2 = 2$$

Questo è impossibile in  $\mathbb{Q}$ , quindi l'assioma di continuità non vale in  $\mathbb{Q}$ .

Conclusione: sui numeri reali,  $\sqrt{2}$  è l'elemento separatore tra  $A$  e  $B$  e si può dimostrare che è unico.

### 3.3 Sottoinsiemi dei reali

$(a, b) \subseteq \mathbb{R}$  è l'intervallo separato da estremi  $a, b \in \mathbb{R}$  (con  $a < b$ ).

- $]a, b[ = (a, b) = \{x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a < x < b\}$
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \text{ t.c. } a \leq x \leq b\}$

## 4 Inferiore, Superiore, Massimo e Minimo

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$  un sottoinsieme *non vuoto*.

$M \in \mathbb{R}$  si dice **maggiorante** di  $A$  se  $M \geq a \forall a \in A$

$m \in \mathbb{R}$  si dice **minorante** di  $A$  se  $m \leq a \forall a \in A$

Minoranti e maggioranti non sono obbligati ad esistere. Ad esempio  $A = \mathbb{N}$  ha minoranti ma non ha maggioranti.

Se esiste un maggiorante invece, ne esistono infiniti. Se  $M$  è un maggiorante, anche  $M + 1$  lo è. Lo stesso vale per i minoranti.

$A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$  si dice **superiormente limitato** se ammette un maggiorante e **inferiormente limitato** se ammette un minorante. Si dice **limitato** se è contemporaneamente superiormente e inferiormente limitato.

**Es:**

- $A = (0, +\infty)$  è inferiormente limitato ma non superiormente
- $B = \left\{ \frac{1-n}{2} : n \in \mathbb{N} \right\}$  è superiormente limitato, ma non inferiormente
- $C = (1, 7]$  è limitato

$M \in \mathbb{N}$  si dice **massimo** di  $A$  (e si scrive  $M = \max A$ ) se  $M \in A \wedge M \geq a \forall a \in A$   
 $m \in \mathbb{N}$  si dice **minimo** di  $A$  (e si scrive  $m = \min A$ ) se  $m \in A \wedge m \leq a \forall a \in A$

$\max$  e  $\min$  non sono obbligati ad esistere, nemmeno per insiemi limitati.

**Es:**

- $A = (0, 1)$  non ha nè  $\max$ , nè  $\min$

$\max$  e  $\min$ , se esistono, sono **unici**.

#### 4.1 Estremo superiore ed Estremo inferiore

Sia  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$ .

Si dice che  $\sup A = +\infty$  se  $A$  non è superiormente limitato o  $\sup A = L \in \mathbb{R}$  se lo è e  $L$  è il minimo dei maggioranti.

Si dice che  $\inf A = -\infty$  se  $A$  non è inferiormente limitato o  $\inf A = l \in \mathbb{R}$  se lo è e  $l$  è il massimo dei minoranti.

**Es:**

- $\sup \mathbb{N} = +\infty$
- $\inf \mathbb{N} = 0$
- $\sup (0, 1) = 1$

**Teo:** Se  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$  è superiormente limitato, allora il minimo dei maggioranti esiste.

**Dim:** Sia  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a \ \forall a \in A\}$  l'insieme dei maggioranti. Allora  $A$  sta tutto a sinistra di  $B$ . Per l'*assioma di continuità* c'è un elemento separatore  $c \in \mathbb{R}$ , ovvero  $c \leq b \ \forall b \in B$  e  $c \geq a \ \forall a \in A \implies c \in B$ . Quindi  $c = \min B$ .

**Esercizio per casa** #todo/compito: Enunciare e dimostrare il teorema analogo per il massimo dei minoranti.

#### 4.1.1 Caratterizzazione di inf e sup

- $\sup A = +\infty$  se  $\forall M \in \mathbb{R} \exists a \in A$  t.c.  $a \geq M$  (*ovvero se posso trovare elementi di  $A$  grandi quanto voglio*)
- $\inf A = -\infty$  se  $\forall M \in \mathbb{R} \exists a \in A$  t.c.  $a \leq M$
- $\sup A = L \in \mathbb{R}$  se
  - $a \leq L \ \forall a \in A$  ( *$L$  è un maggiorante*)
  - $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A$  t.c.  $a \geq L - \varepsilon$
- $\inf A = L \in \mathbb{R}$  se
  - $a \geq L \ \forall a \in A$  ( *$L$  è un minorante*)
  - $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A$  t.c.  $a \leq L + \varepsilon$

Se esiste  $M = \max A$  allora  $\sup A = M$ . Se esiste  $m = \min A$  allora  $\inf A = m$ .  $\sup A$  non è obbligato ad appartenere ad  $A$ , ma se vi appartiene è il **massimo**. Stessa cosa per  $\inf A$ .

## 5 Funzioni reali

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  oppure  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ .

Grafico di  $f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(x)\}$  ( $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ).

Proprietà di simmetria:

- si dice **pari** se  $f(x) = f(-x) \ \forall x \in \mathbb{R}$  (*simmetrica rispetto all'asse  $y$* )

- $f$  si dice **dispari** se  $f(x) = -f(-x) \forall x \in \mathbb{R}$  (*simmetrica rispetto all'origine*)
- $f$  si dice **periodica** se  $\exists T > 0$  t.c.  $f(x+T) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$  (*il grafico si ottiene traslando il pezzo  $[0, T]$  in  $[T, 2T]$ ,  $[T, 3T]$ , ...*)

Se  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è dispari, allora  $f(0) = 0$ .

Se  $T$  è un periodo, anche  $2T, 3T, 4T, \dots$  lo sono. Il **minimo periodo** è il più piccolo  $T$  (se esiste) per cui vale  $f(x+T) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ .

Proprietà di **monotonia**:

- $f$  si dice **monotona**:
  - $f$  si dice **strettamente crescente** se  $x > y \implies f(x) > f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$
  - $f$  si dice **strettamente decrescente** se  $x > y \implies f(x) < f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$
- $f$  si dice **debolmente crescente** se  $x > y \implies f(x) \geq f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$
- $f$  si dice **debolmente decrescente** se  $x > y \implies f(x) \leq f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

Se  $f$  è strettamente crescente allora è anche debolmente crescente. Se  $f$  è strettamente decrescente allora è anche debolmente decrescente.

Se  $f$  è sia deb. crescente che deb. decrescente allora è **costante**.

## 5.1 Grafici, Iniettività e Suriettività

- Suriettiva  $\iff$  in ogni elemento dell'insieme di arrivo termina *almeno* una freccia (*tutto l'asse  $y$  è "coperto"*)
- Iniettiva  $\iff$  in ogni elemento dell'insieme di arrivo termina *al più* (0|1) una freccia (*l'asse  $y$  è "coperto" solo una volta*)
- Retta orizzontale:  $y = \lambda$
- Grafico di  $f$ :  $y = f(x)$
- Intersezioni:  $f(x) = \lambda$

$$f \text{ iniettiva} \iff f(x) = \lambda \text{ ha al più una soluz. } \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$f \text{ suriettiva} \iff f(x) = \lambda \text{ ha almeno una soluz. } \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

Se  $f$  è pari o periodica non è iniettiva. Se  $f$  è strettamente crescente o strettamente decrescente allora è iniettiva.

## 6 Funzioni elementari

### 6.1 Potenze pari

$$f(x) = x^{2k} \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

- Con  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (*non iniettiva o suriettiva*).
- Con  $\mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$  (*iniettiva ma non suriettiva*)
- Con  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  (*non iniettiva ma suriettiva*)
- Con  $\mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  (*biunivoca*)

Quindi l'inverso è

$$g : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$
$$g(x) = \sqrt{x^{2k}}$$

**Oss:**  $f(x) = x^{2k}$  è una funzione *pari*, strettamente crescente su  $[0, +\infty)$  e strettamente decrescente su  $[-\infty, 0)$ .

**Oss:** la funzione  $f(x) = |x|$  ha le stesse proprietà.

### 6.2 Potenze dispari

$$f(x) = x^{2k+1} \quad k \in \mathbb{N}$$

È una funzione dispari.

- $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (*biunivoca*)

L'inverso è definito come

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$g(x) = \sqrt{x^{2k+1}}$$

Vale lo stesso per  $f(x) = \frac{1}{x^k}$

[!warning] Confermare la funzione

| **Oss:**  $f(x) = x^{2k+1}$  è strettamente crescente su  $\mathbb{R}$ .

### 6.3 Esponenziali

$$f(x) = a^x \quad \text{con } a > 1$$

- $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (*iniettiva*)
- $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$  (*biunivoca*)

L'inversa è

$$g : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g(x) = \log_a x$$

| **Ese:** fate lo stesso per  $f(x) = a^x$  con  $0 < a < 1$

| **Oss:** se  $a \in (0, 1)$  allora  $b = \frac{1}{a} \in (1, +\infty)$ .

### 6.4 Funzioni trigonometriche

#### 6.4.1 Seno

$$f(x) = \sin x$$

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è periodica di periodo minimo  $2\pi$  ed è dispari ( $\sin(-x) = -\sin x$ ).

- $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (*non iniettiva e non suriettiva*)
- $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$  (*biunivoca*)

L'inversa è

$$g : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$g(x) = \arcsin x$$

**Oss:**  $\arcsin(\sin(\frac{3}{4}\pi)) = \frac{\pi}{4} \neq \frac{3}{4}\pi$

#### 6.4.2 Coseno

$$f(x) = \cos x$$

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è periodica di periodo minimo  $2\pi$  ed è pari ( $\cos x = \cos(-x)$ ).

- $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (*non iniettiva e non suriettiva*)
- $[0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$  (*biunivoca*)

L'inversa è

$$g : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$g(x) = \arccos x$$

**Oss:**  $\arccos(\cos(\frac{3}{2}\pi)) \neq \frac{3}{2}\pi$

#### 6.4.3 Tangente

$$f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

- $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$  è periodica di periodo minimo  $\pi$  ed è dispari (*solo suriettiva*)
- $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  è dispari (*biunivoca*)

L'inversa è

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$g(x) = \arctan x$$



## 7 Trasformazione di grafici

Dato  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

- **Simmetria** assiale rispetto all'asse  $x$ :  $y = -f(x)$
- **Simmetria** assiale rispetto all'asse  $y$ :  $y = f(-x)$
- **Traslazione** del vettore  $(0, c)$  (verso l'alto se  $c > 0$ ):  $y = f(x) + c$
- **Traslazione** del vettore  $(-c, 0)$  (verso sinistra se  $c > 0$ ):  $y = f(x + c)$
- **Compressione** verso l'asse  $x$  (dilatazione se  $c > 1$ ):  $y = f(x) \cdot c$
- **Dilatazione** verso l'asse  $y$  (compressione se  $c > 1$ ):  $y = f(x \cdot c)$
- **Ribaltamento** sull'asse  $x$ :  $y = |f(x)|$
- **Ribaltamento** sull'asse  $y$ :  $y = f(|x|)$

## 8 Successioni

### 8.1 Terminologia

Sia  $\mathcal{P}(n)$  una affermazione a proposito del numero  $n \in \mathbb{N}$ . Sarà vera o falsa a seconda del valore di  $n$ .

Diciamo che:

- $\mathcal{P}(n)$  è vera **frequentemente** se è vera per infiniti  $n \in \mathbb{N}$
- $\mathcal{P}(n)$  è vera **definitivamente** se è vera “da un certo punto in poi”, cioè se  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  t.c.  $\mathcal{P}(n)$  è vera  $\forall n \geq n_0$

**Oss:** Definitivamente  $\implies$  Frequentemente.

**Es:**

1.  $n^2 \geq 1000$  è vera definitivamente
2.  $n^3$  è multiplo di 8 è vera frequentemente, ma non definitivamente
3.  $n + 1 \geq 3^n$  è falsa definitivamente

## 8.2 Successioni a valori reali

**Def rigida:** una successione a valori reali è una funzione  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Di solito, invece di scrivere  $a(n)$ , si scrive  $a_n$ .

**Oss:** così non è possibile considerare  $a_n = \frac{1}{n}$ .

**Def più elastica:** una successione a valori reali è una funzione  $a : A \rightarrow \mathbb{R}$  con  $A \subseteq \mathbb{N}$ , tale che  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$  per cui  $\forall n \geq n_0, n \in A$  (tale che  $n \in A$  definitivamente).

## 8.3 Limite di una successione

Sia  $a_n$  una successione. Abbiamo 4 possibili comportamenti:

1.  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell$  ( $a_n \rightarrow \ell$ ;  $\ell \in \mathbb{R}$ )
2.  $\lim a_n = +\infty$  ( $a_n \rightarrow +\infty$ )
3.  $\lim a_n = -\infty$  ( $a_n \rightarrow -\infty$ )
4.  $\lim a_n$  non esiste ( $a_n$  è indeterminata)

**Def:**

- Una successione è di tipo 4, se non è di nessun degli altri tipi
- Una successione è di tipo 2, se  $\forall M \in \mathbb{R}, a_n \geq M$  definitivamente ( $\forall M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  t.c.  $a_n \geq M \forall n \geq n_0$ )
- Una successione è di tipo 3, se  $\forall m \in \mathbb{R}, a_n \leq m$  definitivamente ( $\forall m \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}$  t.c.  $a_n \leq m \forall n \geq n_0$ )
- Una successione è di tipo 1, se
  - $\forall \varepsilon > 0, a_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$  definitivamente
  - $\forall \varepsilon > 0, \ell - \varepsilon \leq a_n \leq \ell + \varepsilon$  definitivamente
  - $\forall \varepsilon > 0, |a_n - \ell| \leq \varepsilon$  definitivamente

Varianti di 1.:

- $a_n \rightarrow \ell^+$  tende a  $\ell$  da destra se  $\forall \varepsilon > 0, \ell < a_n \leq \ell + \varepsilon$  definitivamente
- $a_n \rightarrow \ell^-$  tende a  $\ell$  da sinistra se  $\forall \varepsilon > 0, \ell - \varepsilon \leq a_n < \ell$  definitivamente

## 8.4 Teorema di unicità del limite

Una successione ricade sempre in uno e uno solo dei quattro tipi di comportamento.  
Se poi ricade nel tipo 1. ( $\ell \in \mathbb{R}$ ), il valore  $\ell$  è unico.

**Dim:** se  $a_n$  è di tipo 1. cioè  $a_n \rightarrow \ell$ , allora definitivamente  $\ell - 1 \leq a_n \leq \ell + 1$ .  $\ell - 1 \leq a_n$  implica che non può essere di tipo 3..  $a_n \leq \ell + 1$  implica che non può essere di tipo 2.. Inoltre se è di tipo 2., definitivamente si avrà  $a_n \geq 1$ . Se è di tipo 3., definitivamente si avrà  $a_n \leq -1$ . Queste condizioni non possono accadere insieme.

Infine, se  $a_n \rightarrow \ell_1$ ,  $a_n \rightarrow \ell_2$  con  $\ell_1 \neq \ell_2$ , allora fisso  $\varepsilon = \frac{|\ell_1 - \ell_2|}{4}$ . Quindi  $a_n$  si ritrova in due intervalli contemporaneamente:  $\ell_1 - \varepsilon \leq a_n \leq \ell_1 + \varepsilon$  e  $\ell_2 - \varepsilon \leq a_n \leq \ell_2 + \varepsilon$ . Se  $\ell_1 < \ell_2$  allora  $\ell_1 + \varepsilon < \ell_2 - \varepsilon$ . Dunque  $a_n \leq \ell_1 + \varepsilon < \ell_2 - \varepsilon \leq a_n$  definitivamente. Questo è assurdo!

## 8.5 Limitatezza delle successioni convergenti

- Se  $a_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$  allora  $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  è limitato
- Se  $a_n \rightarrow +\infty$  allora  $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  è inferiormente limitato
- Se  $a_n \rightarrow -\infty$  allora  $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  è superiormente limitato

*Dimostrazione nelle slide.* #view-slide

## 8.6 Teorema di permanenza del segno

- Se  $a_n \rightarrow \ell \in (0, +\infty)$  o se  $a_n \rightarrow +\infty$  allora  $a_n > 0$  definitivamente
- Se  $a_n \geq 0$  definitivamente e se  $a_n \rightarrow \ell$  allora  $\ell \geq 0$  oppure  $\ell = +\infty$

*Dimostrazione nelle slide* #view-slide

**Oss:** vale lo stesso risultato con i negativi.

- Se  $a_n \rightarrow \ell \in (-\infty, 0)$  o se  $a_n \rightarrow -\infty$  allora  $a_n < 0$  definitivamente
- Se  $a_n \leq 0$  definitivamente e se  $a_n \rightarrow \ell$  allora  $\ell \leq 0$  oppure  $\ell = -\infty$

## 8.7 Retta reale estesa

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$$

- Posso scrivere  $a_n \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$  per unificare i tipi 1., 2., 3.
- Le operazioni di  $\mathbb{R}$  si estendono a  $\overline{\mathbb{R}}$  *quasi bene*:

$$+x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$$

$$-x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$$

$$x + (\pm\infty) = \pm\infty$$

$$(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$$

$$\frac{x}{+\infty} = 0$$

- Ci sono 2 eccezioni:

1. Le 7 forme indeterminate:

$$(+\infty) + (-\infty)$$

$$0 \cdot (\pm\infty)$$

$$\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\frac{0}{0}$$

$$0^0$$

$$1^{\pm\infty}$$

$$(\pm\infty)^0$$

2. Le divisioni per 0

## 8.8 Teoremi algebrici

Siano  $a_n, b_n$  successioni,  $a_n \rightarrow \ell_1 \in \overline{\mathbb{R}}, b_n \rightarrow \ell_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ , allora:

$$a_n + b_n \rightarrow l_1 + l_2$$

$$a_n - b_n \rightarrow l_1 - l_2$$

$$a_n \cdot b_n \rightarrow l_1 \cdot l_2$$

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{l_1}{l_2}$$

$$a_n^{b_n} \rightarrow l_1^{l_2}$$

Con le dovute eccezioni di  $\infty$ .

## 8.9 Teoremi di confronto

Se  $a_n \leq b_n$  definitivamente, allora:

1. Se  $a_n \rightarrow a$  e  $b_n \rightarrow b$ , allora  $a \leq b$
2. Se  $a_n \rightarrow +\infty$ , allora  $b_n \rightarrow +\infty$
3. Se  $b_n \rightarrow -\infty$ , allora  $a_n \rightarrow -\infty$

Se  $a_n, b_n, c_n$  sono tali che  $a_n \leq b_n \leq c_n$  definitivamente e  $a_n \rightarrow \ell, c_n \rightarrow \ell$  (lo stesso  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ ) allora  $b_n \rightarrow \ell$ . (*teorema del carabiniere*).

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n + \cos n$ .

$$\forall n \in \mathbb{N}, \cos n \geq -1 \implies n + \cos n \geq n - 1$$

Per il teorema del confronto a 2, visto che  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n - 1 = [+\infty - 1] = +\infty$ , ho che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n + \cos n = +\infty$$

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n}$ .

$$\forall n \in \mathbb{N}, -1 \leq \sin n \leq 1 \implies -\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

E poichè  $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ , per il teorema del confronto a 3  $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$ .

## 9 Tecniche di calcolo dei limiti

### Fatto N.1

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^a = +\infty \quad \forall a > 0$$

### Fatto N.2

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^a = 0^+ \quad \forall a < 0$$

**Oss:**  $n^a = \frac{1}{n^{-a}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n^a = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-a}} = \left[ \frac{1}{+\infty} \right] = 0^+$

Ricordare negli esercizi di scrivere *teoremi algebrici dove vengono usati*.

### 9.1 Disuguaglianza di Bernoulli

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \geq -1 \quad \text{si ha} \quad (1+x)^n \geq 1+nx$$

### Fatto N.3

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty \quad \forall a > 1$$

**Dim:**  $a^n = (1 + (a-1))^n \geq 1 + n(a-1) \rightarrow [1 + \infty(a-1)] = +\infty \Rightarrow a^n \rightarrow +\infty$  per il confronto a 2.

### Fatto N.4

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0 \quad \forall 0 < a < 1$$

**Dim:**  $a = \frac{1}{b}$  con  $b > 1$  e  $b^n \rightarrow +\infty$  quindi  $a^n = \frac{1}{b^n} \rightarrow 0^+$ .

**Fatto N.5**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1 \quad \forall a > 1$$

**Dim:**  $a^{\frac{1}{n}} \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

[!warning] Finire la dim dalle slide #todo/uni .

**9.2 Dimostrazione teorema del confronto a 2**

Sappiamo che  $a_n \leq b_n$  definitivamente

1. Se  $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ , vogliamo dimostrare che  $a \leq b$

Per assurdo, se  $b < a$ , posso scegliere  $\varepsilon > 0$  tale che  $\varepsilon < \frac{a-b}{2} \Rightarrow b + \varepsilon < a - \varepsilon$ .

Allora definitivamente  $a_n \geq a - \varepsilon$  e  $b_n \leq b + \varepsilon$ , quindi  $b_n \leq b + \varepsilon < a - \varepsilon \leq a_n$  definitivamente.

Ciò significa che  $b_n < a_n$ , il che è assurdo.

2. Se  $a_n \rightarrow +\infty, \forall M \in \mathbb{R}$ , ho  $a_n \geq M$  definitivamente  $\Rightarrow$  ho  $b_n \geq a_n \geq M$  definitivamente  $\forall M \in \mathbb{R} \Rightarrow b_n \rightarrow +\infty$ .

3. Uguale a 2..

**10 Criterio del rapporto & Criterio della radice****10.1 Criterio del rapporto**

Sia  $a_n$  una successione definitivamente positiva ( $> 0$ ). Supponiamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty]$$

allora

1. se  $\ell < 1, a_n \rightarrow 0$

2. se  $\ell > 1, a_n \rightarrow +\infty$
3. se  $\ell = 1, ??$

## 10.2 Criterio della radice

Sia  $a_n$  una successione definitivamente  $\geq 0$ . Supponiamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \in [0, +\infty]$$

allora

1. se  $\ell < 1, a_n \rightarrow 0$
2. se  $\ell > 1, a_n \rightarrow +\infty$
3. se  $\ell = 1, ??$

**Es:**  $a_n = \frac{n^3}{2^n}$  con i teo. alg. ottengo  $[\frac{+\infty}{+\infty}]$ , quindi

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)^3}{2^{n+1}}}{\frac{n^3}{2^n}} = \frac{1}{2} \left( \frac{n+1}{n} \right)^3 \rightarrow \frac{1}{2}$$

per il criterio del rapporto  $a_n \rightarrow 0$ .

**Fatto N.6** (*Esponenziale batte potenza*)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^a}{b^n} = 0 \quad \forall b > 1, \forall a \in \mathbb{R}$$

## 10.3 Fattoriale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$$

**Fatto N.7** (*Il fattoriale batte l'esponenziale*)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b^n}{n!} = 0 \quad \forall b > 0$$



**\*\*Fatto \*N.7\*\***  $n^n$  batte il fattoriale.\*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

## 10.4 Gerarchia degli infiniti

1.  $n^n$
2.  $n!$
3.  $b^n$
4.  $n^a$
5.  $n$

**Attenzione:** nella gerarchia degli infiniti, dovete rispettare religiosamente le espressioni date.  $n!$  batte  $2^n$ , ma non so cosa fa con  $2^{(n^2)}$ .

## 10.5 Criterio del rapporto-radice

Supponiamo  $a_n > 0$  definitivamente e che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty]$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \quad (\text{stesso } \ell)$$

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = ?$

Applico il criterio rapporto-radice con  $a_n = n$ , che è definitivamente  $> 0$ . Ho che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$$

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^a} = ?$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{a}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n^{\frac{1}{n}})^a = 1$$

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^7 - n^2 + 1} = ?$

Ha senso perchè  $n^7 - n^2 + 1 \rightarrow +\infty \implies$  è definitivamente positiva per il teorema di permanenza del segno.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^7} \cdot \sqrt[n]{1 - \frac{1}{n^5} - \frac{1}{n^7}} = 1 \cdot 1 = 1$$

**Fatto N.8**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\text{polinomio}} = 1 \quad \forall \text{ polinomio}$$

**Fatto N.9**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = ?$

Metodo 1:  $\forall b > 1$  ho che  $n! > b^n$  (per il teo di permanenza del segno:  $\frac{b^n}{n!} \rightarrow 0 \implies$  definitivamente  $\frac{b^n}{n!} < 1 \implies b^n < n!$  definitivamente)  $\implies \sqrt[n]{n!} > b$  definitivamente  $\forall b > 1 \implies \sqrt[n]{n!} \rightarrow +\infty$ .

Metodo 2:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n+1 = +\infty$$

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = ?$

$$= \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e}$$

**Oss:** per  $n$  molto grandi,  $n!$  assomiglia a  $\left(\frac{n}{e}\right)^n$ .

**Es:**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n^2}}{n!} = ?$

Applico il criterio della radice.

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{2^{n^2}}{n!}} = \frac{(2^{n^2})^{\frac{1}{n}}}{(n!)^{\frac{1}{n}}} = \dots$$

## 10.6 Dimostrazione del criterio della radice

Supponiamo che  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \ell > 1$ , allora la media sarà un numero tra 1 e  $\ell$

$$1 < \frac{\ell + 1}{2} < \ell \implies \text{definitivamente } \sqrt[n]{a_n} \geq \frac{\ell + 1}{2} \implies a_n \geq \left(\frac{\ell + 1}{2}\right)^n$$

e poichè  $\frac{\ell+1}{2} > 1$ ,  $\left(\frac{\ell+1}{2}\right)^n \rightarrow +\infty$ . Quindi per il confronto a 2, ho che  $a_n \rightarrow +\infty$ .

Se invece  $0 \leq \ell < 1$ , allora  $0 \leq \frac{\ell+1}{2} < 1 \implies$  definitivamente  $\sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\ell+1}{2}$ , inoltre  $0 \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\ell+1}{2} \implies 0 \leq a_n \leq \left(\frac{\ell+1}{2}\right)^n$  definitivamente e  $0 < \frac{\ell+1}{2} < 1 \implies \left(\frac{\ell+1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ , dunque, per il teo del confronto a 3,  $a_n \rightarrow 0$ .

## 11 Principio di induzione

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$\mathcal{P}(n)$  = affermazione a prop. di  $n$  che può essere vera o falsa

**Es:**  $n^2 = n + 6$  (*definitivamente vera*)

- $n = 0$ : falsa
- $n = 1$ : falsa
- $n = 2$ : falsa
- $n = 3$ : vera!
- $n = 4$ : falsa
- $n = 5$ : falsa

**Es:** se l'insieme  $A$  ha  $n$  elementi, allora  $\mathcal{P}(A)$  ha  $2^n$  elementi (*definitivamente vera*).

**Principio di induzione:** supponiamo di sapere che

1.  $\mathcal{P}(0)$  è vera (*passo base*)
2.  $\mathcal{P}(n) \implies \mathcal{P}(n+1) \forall n \geq 0$  (*passo induttivo*)

allora  $\mathcal{P}(n)$  è vera per ogni  $n \in \mathbb{N}$ .

**Es:** dimostrare che  $0 + 1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

Dimostrazione per induzione:

1.  $n = 0 : 0 = \frac{0(0+1)}{2} = 0 \longrightarrow \text{vero}$
2. Ipotesi (passo  $n$ ) :  $0 + 1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ . Voglio dire che  $0 + 1 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .  
 $0 + 1 + \dots + (n+1) = 0 + 1 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ .

**Ese:** da fare a casa #todo/compito

1.  $0^2 + 1^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
2.  $0^3 + 1^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

### 11.1 Disuguaglianza di Bernoulli (dimostrazione)

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \geq -1 \text{ si ha } (1+x)^n \geq 1+nx$$

**Dimostrazione per induzione su  $n$**

1. *Passo base:*

$$n = 0 \quad (1+x)^0 \geq 1 \quad \forall x > -1$$

$$n = 1 \quad (1+x)^1 \geq 1+x \quad \forall x \geq -1$$

2. *Passo induttivo:*

Ipotesi(passo  $n$ ) :  $(1+x)^n \geq 1+nx$

Tesi(passo  $n+1$ ) :  $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx)(1+x) = \\ &= 1+nx+x+nx^2 = \\ &= 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x \longrightarrow \text{Vero!} \Rightarrow\end{aligned}$$

La disug è dimostrata  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \geq -1$

## 11.2 Coeff. binomiali

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$\binom{n}{k}$  è l'elemento in posizione  $k$  nella riga  $n$  del **triangolo di Tartaglia** (si conta da 0).

**Sviluppo del binomio:**

$$(a+b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \cdot a^{n-j} \cdot b^j$$

## 12 Successioni monotone

Sia  $a_n$  una successione. Diciamo che  $a_n$  è

1. **strettamente crescente** se  $a_{n+1} > a_n \forall n \in \mathbb{N}$
2. **strettamente decrescente** se  $a_{n+1} < a_n \forall n \in \mathbb{N}$
3. **debolmente crescente** se  $a_{n+1} \geq a_n \forall n \in \mathbb{N}$
4. **debolmente decrescente** se  $a_{n+1} \leq a_n \forall n \in \mathbb{N}$

**Oss:** similmente si definiscono i corrispondenti concetti per successioni definitivamente monotone.

**Teo delle successioni monotone:** sia  $a_n$  una successione *debolmente crescente*, allora  $a_n$  ha limite  $\ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ . Più precisamente  $a_n \rightarrow \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ . Lo stesso vale per

le successioni debolmente decrescenti ( $a_n \rightarrow \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ).

### Dim (caso crescente):

**Primo caso:**  $\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = +\infty \implies \forall M \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_{n_0} \geq M$ . Ma se la succ. è debolmente crescente  $\implies \forall n \geq n_0, a_n \geq a_{n_0} \geq M \implies a_n \rightarrow \infty$ .

**Secondo caso:**  $\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \ell \in \mathbb{R} \implies$

- $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq \ell$  ( $\ell$  è un *maggiore*)
- $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \ell - \varepsilon \leq a_{n_0}$  ( $\ell$  è il *minimo tra i maggiori*)

Ma  $a_n$  è debolmente crescente  $\implies \forall n \geq n_0$  ho che  $\ell - \varepsilon \leq a_{n_0} \leq a_n \leq \ell \implies a_n \rightarrow \ell^-$

### Caso decrescente: #todo/compito

#### Oss:

1. Se  $a_n$  è debolmente crescente e superiormente limitata, allora  $a_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$
2. Se  $a_n$  è definitivamente debolmente crescente (o decrescente) allora  $a_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$  (o  $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ ), ma non posso dire che  $\ell = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$

**Es:** Sia  $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ . Allora

1.  $2 \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2.  $a_n \leq 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
3.  $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Per il teo sulle successioni monotone,  $a_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$  e  $2 \leq \ell \leq 3$ .

#### Dim:

1. Per Bernoulli:  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \cdot \frac{1}{n} = 2 \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$
2.  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \cdot 1^{n-j} \cdot \frac{1}{n^j} \rightarrow$  *guardare le slide*
3.  $\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \implies a_n$  è decrescente  $\rightarrow$  *guardare le slide*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

**Es:**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{n}{n-1}\right)} = \frac{1}{e}$$

**Es:**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$$

### 13 Successioni per ricorrenza

Una successione per ricorrenza si presenta così:

- Un punto di partenza:  $a_0 = 2$
- Una regola per calcolare il valore di un elemento dati i precedenti:  $a_n = a_{n-1}^2 + \frac{1}{n+2}$

Possono essere dimostrate per induzione.

**Es 1:**

$$\begin{cases} a_0 = 1 & (I) \\ a_n = n \cdot a_{n-1} & (II) \end{cases}$$

Se voglio calcolare  $a_4 = 4 \cdot a_3 = 4 \cdot 3 \cdot a_2 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_1 = 4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot a_0 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 24$ .

In questo caso si ha  $a_n = n!$ .

**Es 2:**

$$\begin{cases} a_0 = 3 & (I) \\ a_n = 2a_{n-1} - 1 & (II) \end{cases}$$

Calcolando un po' di valori trovo **guess**:  $a_n = 2^{n+1} + 1$ . Si può dimostrare per induzione:

- **P.B.:**  $n = 0$  per (I),  $a_0 = 3 = 2^{0+1} + 1$  (**Ok!**)
- **P.I.:** se  $a_n = 2^{n+1} + 1$  allora  $a_{n+1} = 2 \cdot a_n - 1 = 2(2^{n+1} + 1) - 1 = 2^{(n+1)+1} + 1$  (**Ok!**)

**Attenzione:** Poter trovare una formula esplicita per le successioni per ricorrenza è *rarissimo!*

**Terminologia:** una successione per ricorrenza che dipende dai  $k$  termini precedenti si dice di **ordine**  $k$ . Una successione per ricorrenza senza una dipendenza esplicita da  $n$  si dice **autonoma**.

Tratteremo quasi esclusivamente successioni per ricorrenza di ordine 1, autonome.

$$\begin{cases} a_0 = a \\ a_n = f(a_{n-1}) \quad n \geq 1 \end{cases}$$

**Es 3:**

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_n = a_{n-1}^2 - 1 \quad n \geq 1 \end{cases}$$

$$a_n = f(a_{n-1})$$

$$f(x) = x^2 - 1$$

Intersezioni con la bisettrice  $y = x$ :  $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ .

**Guess:** la successione è crescente e tende a  $+\infty$ .



**Strategia:**

1.  $a_n \geq 2 \quad \forall n \geq 0$
2.  $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n$
3.  $a_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$
4.  $\ell = +\infty$

**Dim 3.:** segue dal punto 2. per il teo sulle successioni monotone.

**Dim 4.:** Se  $\ell \in \mathbb{R}$ , allora posso passare al limite la relazione ricorsiva:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^2 - 1 \\ \implies \ell &= \ell^2 - 1 \\ \implies \ell &= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ oppure } \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Ma  $a_n \geq 2 \quad \forall n$  (per 1.)  $\implies \ell \geq 2$  (permanenza del segno)  $\implies$  nessuno dei valori trovati è accettabile  $\implies \ell = +\infty$ .

**Dim 1.:**  $a_n \geq 2 \quad \forall n$ . Per induzione:

- **P.B.:**  $a_n = 2 \geq 2$  (Ok!)
- **P.I.:** se  $a_n \geq 2$ , allora  $a_{n+1} = a_n^2 - 1 \geq 4 - 1 = 3 \geq 2$  (Ok!)

**Dim 2.:**  $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n$ . Per induzione:

- **P.B.:**  $a_1 = a_0^2 - 1 = 4 - 1 = 3 \geq a_0$  (Ok!)
- **P.I.:** se  $a_n \leq a_{n+1}$ , allora  $f(a_n) \leq f(a_{n+1})$  perchè  $f(x) = x^2 - 1$  è crescente su  $[0, +\infty)$ .

Quindi  $a_n \rightarrow +\infty$ .

## 14 Serie numeriche

### 14.1 Definizione SBAGLIATA

Data una successione  $a_n$ , indico con

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

la somma di tutti i termini della successione (che sono infiniti).

**Questo non ha senso**

## 14.2 Definizione CORRETTA

**Def:** data una successione  $a_n$ , dato  $k \in \mathbb{N}$ , la **somma parziale**  $k$ -esima di  $a_n$  è

$$S_k = a_0 + a_1 + \dots + a_k = \sum_{n=0}^k a_n$$

**Def:** Una **serie numerica**  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  ( $\sum a_n$ ) è il limite della successione  $S_k$ , per  $k \rightarrow \infty$ .  
Cioè

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} (a_0 + a_1 + \dots + a_k)$$

## 14.3 Carattere di una serie (comportamento)

Essendo un limite,  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  ha 4 possibili comportamenti:

1. **Converge** a  $\ell \in \mathbb{R}$  se  $S_k \rightarrow \ell$
2. **Diverge** a  $+\infty$  se  $S_k \rightarrow +\infty$
3. **Diverge** a  $-\infty$  se  $S_k \rightarrow -\infty$
4. È **indeterminata** se  $S_k$  non ha limite

## 14.4 Serie telescopiche

**Es:**

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

$$\bullet S_2 = a_2 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

- $S_3 = a_2 + a_3 = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{1}{3}$
- $S_4 = a_2 + a_3 + a_4 = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{1}{4}$
- $S_k = 1 - \frac{1}{k}$  (*dimostrato per induzione*)

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = 1 \implies \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n} \text{ converge a } 1$$

## 14.5 Serie geometriche

La serie geometrica di ragione  $a \in \mathbb{R}$  è

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n$$

**Lemma:**  $a^0 + a^1 + \dots + a^k = \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1}$  se  $a \neq 1$

**Dim:**

$$\begin{aligned} (a^0 + a^1 + \dots + a^k) \cdot a &= a^1 + a^2 + \dots + a^{k+1} + \\ (a^0 + a^1 + \dots + a^k)(-1) &= -a^0 - a^1 - \dots - a^k = \\ (a^0 + a^1 + \dots + a^k)(a - 1) &= -a^0 + a^{k+1} \end{aligned}$$

Poichè  $a \neq 1$ , posso dividere ed ottengo il teo.

**Oss:** se  $a = 1$ ,  $a^0 + \dots + a^k = k + 1$ .

Dunque si ha

$$S_k = \begin{cases} k + 1 & \text{se } a = 1 \\ \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} & \text{se } a \neq 1 \end{cases}$$

$\lim_{k \rightarrow +\infty} S_k = ?$

1. Se  $-1 < a < 1$  la serie converge a  $\frac{1}{1-a}$
2. Se  $a = 1$  vedere esempio 2.
3. Se  $a > 1$  diverge a  $+\infty$

4. Se  $a < -1$  non ha limite
5. Se  $a = -1$  vedere esempio stupido 4

*Dimostrazioni nelle slide* #view-slide

## 14.6 Strumenti per lo studio delle serie

Il problema è determinare il carattere di una serie senza poter ricavare un'espressione esplicita per le somme parziali. Per farlo abbiamo:

- Teoremi algebrici
- Condizione necessaria alla convergenza
- Serie “note”
- Criteri di convergenza
  - Serie a termini di segno costante ( $a_n \leq 0$  def. o  $a_n \geq 0$  def.)
    - \* Radice
    - \* Rapporto
    - \* Confronto
    - \* Confronto asintotico
    - \* *Condensazione di Cauchy*
  - Serie a termini di segno alterno
    - \* Leibniz
  - Serie a termini di segno qualunque
    - \* Assoluta convergenza

### 14.6.1 Teoremi algebrici

1. Sia  $a_n$  una successione e sia  $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$ . Allora (*come operazione in  $\overline{\mathbb{R}}$* )

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\lambda \cdot a_n) = \lambda \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ (come operazione in } \overline{\mathbb{R}})$$

2. Se  $a_n, b_n$  sono successioni, allora (*con tutte le attenzioni delle operazioni nella retta reale estesa*)

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \lambda \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

### 3. **Attenzione!**

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot b_n \neq \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

#### 14.6.2 Condizione necessaria

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge} \implies a_n \rightarrow 0$$

**Dim:**  $a_n = S_n - S_{n-1}$ . Se  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  converge, allora  $S_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ . Quindi  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = \ell - \ell = 0$ .

Dunque se  $a_n$  non tende a 0, la serie non può convergere (può divergere o essere indeterminata). Se  $a_n \rightarrow 0$ , *potrebbe* convergere.

#### 14.6.3 Serie note

1. Serie geometriche
2. Serie armoniche generalizzate

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a} = \begin{cases} \text{diverge a } +\infty & \text{se } a \leq 1 \\ \text{converge} & \text{se } a > 1 \end{cases}$$

3. Parenti dell'armonica

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^a} = \begin{cases} \text{diverge a } +\infty & \text{se } a \leq 1 \\ \text{converge} & \text{se } a > 1 \end{cases}$$

#### 14.6.4 Serie a termini di segno costante

**Lemma:** sia  $a_n$  una successione def.  $\geq 0$ . Allora la successione  $S_k = (a_0 + \dots + a_k)$  delle somme parziali è def. debolmente crescente.

**Dim:**

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq n_0, a_n \geq 0 \implies$$

$$\forall n \geq n_0, S_n = a_n + S_{n-1} \geq S_{n-1}$$

**Teo:** Se  $a_n$  è una succ. def.  $\geq 0$ , allora  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  ha due comportamenti possibili: converge o diverge a  $+\infty$ .

**Dim:** teo sulle successioni monotone applicato a  $S_k$ .

**Oss:** Vale lo stesso risultato se  $a_n \leq 0$  def. In quel caso  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  converge oppure diverge a  $-\infty$ .

##### 14.6.4.1 Criterio della radice

Sia  $a_n \geq 0$  def. Supponiamo che  $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . Allora:

1. Se  $\ell > 1$  la serie diverge a  $+\infty$
2. Se  $\ell < 1$  la serie converge
3. Se  $\ell = 1$  ???

##### 14.6.4.2 Criterio del rapporto

Sia  $a_n > 0$  def. Supponiamo che  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ . Allora:

1. Se  $\ell > 1$  la serie diverge a  $+\infty$
2. Se  $\ell < 1$  la serie converge
3. Se  $\ell = 1$  ???