

# Семинар 8. Инвариантные и собственные подпространства. Часть 2.

Очевидно, собственные значения не меняются при замене базиса.

Рассмотрим подробнее характеристический многочлен.

$$\begin{aligned} P(\lambda) = \det(A - \lambda E) &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \dots (a_{nn} - \lambda) + \dots + \tilde{P}(0) = \\ &\quad \text{только в этом члене есть } \lambda^n \text{ и } \lambda^{n-1} \\ &= (-1)^n \lambda^n - (-1)^n (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + \dots + \det A \end{aligned}$$

Вспомним, что для квадратного уравнения вида

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

справедлива теорема Виета, которую мы знаем еще из школы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -b/a \\ x_1 x_2 = c/a \end{cases}$$

## Обобщенная теорема Виета:

Произведение корней:  $(-1)^n \cdot \frac{\{\text{свободный член}\}}{\{\text{первый коэффициент}\}}$

Сумма корней:  $-\frac{\{\text{второй коэффициент}\}}{\{\text{первый коэффициент}\}}$

$$\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = (-1)^n \cdot \frac{\det A}{(-1)^n} = \det A$$

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) = \operatorname{tr} A \quad (\text{т.е. след матрицы } A).$$

Т.о. оказывается, что  $\det A$  и  $\operatorname{tr} A$  не зависят от выбора базиса.

## Пример 1

Пусть  $A$  — матрица вращения  $\mathbb{R}^3$ . Найти угол вращения.

*Решение:*

Выберем ортонормированный базис так, что поворот вокруг  $\mathbf{e}_3$ .

В этом базисе:

$$A_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Т.к.  $\operatorname{tr} A = 2 \cos \alpha + 1 = \operatorname{const}$ :

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} (\operatorname{tr} A - 1)$$

## Пример 2

Пусть  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  — собственные значения преобразования  $\varphi$  с матрицей  $A$ . Какие собственные значения у а)  $\varphi^2$ ; б)  $\varphi^{-1}$ ?

*Решение:*

$$\det(A - \lambda E) = 0 \quad (*)$$

$$1). \varphi^2 : \det(A^2 - \tilde{\lambda}E)$$

$$(*)| \cdot \det(A + \lambda E) \Rightarrow \det(A - \lambda E) \det(A + \lambda E) = \det(A^2 - \lambda^2 E) = 0 \Rightarrow \tilde{\lambda} = \lambda^2$$

$$2). \varphi^{-1} : \det(A^{-1} - \tilde{\lambda}E) = \det(A^{-1} - \tilde{\lambda}A^{-1}A) = 0$$

$$\Rightarrow \det A^{-1} \cdot \det(E - \tilde{\lambda}A) = 0$$

Так как  $\det A^{-1} \neq 0$  (матрица  $A$  невырожденная), то верно:

$$\det(E - \tilde{\lambda}A) = 0$$

Разделим равенство на  $(-1)^n \tilde{\lambda}^n$ :

$$\det(A - \frac{E}{\tilde{\lambda}}) = 0 \Rightarrow \tilde{\lambda} = \frac{1}{\lambda} = \lambda^{-1}.$$

Заметим, что собственные векторы при этом не изменятся.

## 1. Проекторы

Пусть  $L = L_1 \oplus L_2$ ;

$\forall \mathbf{x} \in L : \mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$  — единственный прообраз, где  $\mathbf{x}_1 \in L_1, \mathbf{x}_2 \in L_2$

Тогда:  $P_1(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_1$  — проектор на  $L_1 \parallel L_2$

$P_2(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_2$  — проектор на  $L_2 \parallel L_1$

$\text{Im } P_1 = L_1$  и  $\text{ker } P_1 = L_2$

$\text{Im } P_2 = L_2$  и  $\text{ker } P_2 = L_1$

$$P_1(\mathbf{x}) + P_2(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = \mathbf{x} \Rightarrow (P_1 + P_2)(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \Rightarrow P_1 + P_2 = \text{Id}$$

### Пример 3

Рассмотрим ортогональный проектор  $A$  в  $\mathbb{R}^3$ .

Найти собственные значения и собственные векторы.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

*Решение:*

1. Собственное значение  $\lambda = 1$ : собственные векторы  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ .
2. Собственное значение  $\lambda = 0$ : собственный вектор  $\{\mathbf{e}_3\}$ .

### Пример 4

Пусть  $L = L_1 \oplus L_2$ .

$\dim L = n, \dim L_1 = k \Rightarrow \dim L_2 = n - k$ .

Найти собственные значения и собственные векторы  $P_1$ ,

где  $P_1$  — проектор  $L_1 \parallel L_2$

*Решение:*

Пусть базис в  $L_1$ :  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_k\}$ .

Пусть базис в  $L_2$ :  $\{\mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$ .

$P_1(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1, P_1(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_2, \dots, P_1(\mathbf{e}_k) = \mathbf{e}_k$

$$P_1(\mathbf{e}_{k+1}) = \dots = P_1(\mathbf{e}_n) = \mathbf{o}$$

Тогда матрица преобразования будет выглядеть таким образом:

$$A = \left( \begin{array}{c|c} E & O \\ \hline O & O \end{array} \right)$$

1. Собственное значение  $\lambda = 1$ : собственные векторы  $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k\}$ .
2. Собственное значение  $\lambda = 0$ : собственные векторы  $\{\mathbf{e}_{k+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$ .
  - Размерность образа при проектировании равна следу матрицы

$$\boxed{\operatorname{rg} P = \operatorname{tr} A}.$$

### Пример 5

- а) Доказать, что для проектора  $\varphi^2 = \varphi$ .
- б) Доказать, что если  $\varphi^2 = \varphi$  ( $\varphi \neq 0, \neq \operatorname{Id}$ ), то  $\varphi$  — проектор на образ  $\parallel$  ядру.

*Решение:*

а) Т.к. имеем дело с проектором, все пространство раскладывается на прямую сумму двух подпространств:

$$L = L_1 \oplus L_2 \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2.$$

Тогда, применив наше преобразование (т.е. проектор), получим:

$$\varphi(x) = P_1(x) = x_1.$$

Теперь к полученному результату применим преобразование ещё раз. Т.к. вектор  $\mathbf{x}_1$  лежит в  $L_1$ , то его проекция на  $L_1$  и есть сам вектор  $\mathbf{x}_1$ :

$$\varphi^2(x) = \varphi(\varphi(\mathbf{x})) = \varphi(\mathbf{x}_1) = \mathbf{x}_1 \Rightarrow \boxed{\varphi^2 = \varphi}.$$

- б) Пусть  $L$  — линейное пространство,  $\varphi : \varphi^2 = \varphi$ . Пусть  $\mathbf{y} \neq \mathbf{o}$ ,  $\mathbf{y} \in \operatorname{Im} \varphi$ ,  $\mathbf{y} \in \ker \varphi$ .
  1.  $\varphi(\mathbf{y}) = \mathbf{o}$  (т.к.  $\mathbf{y} \in \ker \varphi$ ).
  2.  $\exists \mathbf{x} \in L : \varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$  (т.к.  $\mathbf{y} \in \operatorname{Im} \varphi$ ).
  3.  $\varphi^2(\mathbf{x}) = \varphi(\varphi(\mathbf{x})) \stackrel{\text{п.2)}}{=} \varphi(\mathbf{y}) \stackrel{\text{п.1)}}{=} \mathbf{o}$ , откуда получаем, что  $\mathbf{y} = \mathbf{o}$ . Противоречие. Отсюда же следует, что

$$\ker \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi = \{\mathbf{o}\}$$

Рассмотрим подпространство  $L'$ :

$$L' = \ker \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi \subset L.$$

$$\dim L' = \dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = \dim L.$$

Отсюда следует, что наше подпространство  $L'$  и есть линейное пространство  $L$ :

$$L' \equiv L \Rightarrow L = \ker \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi.$$

Команда **BOTAY!**:

Д. Георгий, [VK](#)

К. Ксения, [VK](#)

Г. Мадина, [VK](#)

С. Паша, [VK](#)

М. Матвей, [VK](#)