

Будем считать заранее выведенным поле E(r) равномерно заряженной сферы произвольного радиуса R:

$$E_R(r) = \begin{cases} 0, & r < R \\ k \frac{q}{r^2} = k \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{r^2}, & r \ge R \end{cases}$$
 (1)

Найдем распределение потенциала (при условии  $\phi(r \to \infty) = 0$ ):

$$\phi_R(r) - \phi_R(r \to \infty) = \phi_R(r) = \int_r^\infty k \frac{q}{r^2} = k \frac{q}{r}, \quad r \ge R$$
 (2)

$$\phi_R(R) = k \frac{q}{R}, \quad \phi_R(0) - \phi_R(R) = \int_0^R 0 dr = 0 \Rightarrow \phi_R(0) = k \frac{q}{R}$$
 (3)

где  $q = q(R) = \sigma \cdot 4\pi R^2$ .

Тогда по принципу суперпозиции потенциал в центре шара будет

$$\phi_0 = \phi_{R_1}(0) + \phi_{R_2}(0) = k\sigma \cdot 4\pi (R_1 + R_2) \tag{4}$$

С учетом того, что в СГСЭ k = 1, а 300 В = 1,

$$\sigma = \frac{\phi_0}{k \cdot 4\pi (R_1 + R_2)} = \frac{1}{4\pi \cdot 30} \approx 0.00265 \ SGSE \tag{5}$$