

Участник:FeelUs/КТП

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Содержание

- 1 символы, обозначения и соглашения
 - 1.1 символы
 - 1.2 соглашения
- 2 основная логика:
- 3 1++. Кинематика и сечения
 - 3.1 Нормировки ВФ
 - 3.2 сечение (Пескин, раздел 4.5.)
- 4 1+. Кванты и представления
 - 4.1 1+1. Шрёдингер:
 - 4.2 1+2. Гайзенберг:
 - 4.3 1+3. Дирак (представление взаимодействия):
 - 4.3.1 1+3.1. из Шрёдингера
 - 4.3.2 1+3.2. из Гайзенберга
 - 4.3.3 1+3.3. новое вакуумное состояние
- 5 1. Лагранжев Формализм
 - 5.1 1.0. Действие 1d, 4d, Вариация = 0
 - 5.2 1.1. Уравнения Лагранжа (из 1.0.)
 - 5.3 1.2. Тензор энергии-импульса (из 1.0. и 1.1. или из 1.3)
 - 5.4 1.3. Теорема Нётер (из 1.0 и 1.1)
 - 5.5 1.5. Гамильтониан, уравнения Гамильтона, Плотность Гамильтониана (из ...)
- 6 2. Свободные поля с пропагаторами и теоремами Вика
 - 6.1 2.1. Скалярное действительное
 - 6.1.1 2.1.1. Классическое
 - 6.1.1.1 2.1.1.0. уравнение К-Г - Клейна-Гордона(-Фока)
 - 6.1.1.2 2.1.1.1. Функции Грина
 - 6.1.2 2.1.2 Квантовое
 - 6.1.2.1 2.1.2.1. Состояния
 - 6.1.2.2 2.1.2.2. Эволюция:
 - 6.1.2.3 2.1.2.3. Пропагатор - амплитуда распространения частицы
 - 6.1.2.4 2.1.2.4. Теорема Вика
 - 6.2 2.2. Скалярное комплексное
 - 6.2.1 2.2.1. Классическое
 - 6.2.1.1 2.1.1.0. уравнение К-Г - Клейна-Гордона(-Фока)
 - 6.2.1.2 2.2.1.1. Функции Грина
 - 6.2.2 2.2.2. Квантовое
 - 6.2.2.1 2.2.2.1. Состояния
 - 6.2.2.2 2.2.2.2. Эволюция:
 - 6.2.2.3 2.2.2.3. Пропагатор - амплитуда распространения частицы
 - 6.2.2.4 2.2.2.4. Теорема Вика
 - 6.3 2.3. Спинорное
 - 6.3.1 2.3.1. Арифметика γ матриц
 - 6.3.2 2.3.2. Преобразования Лоренца
 - 6.3.3 2.3.3. Классическое
 - 6.3.4 2.3.4. Уравнение Дирака
 - 6.3.5 2.3.5. функция Грина
 - 6.3.6 2.3.6. Квантуем
 - 6.3.6.1 2.3.6.1. Состояния
 - 6.3.6.2 2.3.6.2. Пропагатор
 - 6.3.6.3 2.3.6.3. теорема Вика
 - 6.4 2.4. Электромагнитное
 - 6.5 2.5. Векторное массивное
- 7 4. Взаимодействия и правила Фейнмана
 - 7.1 4.1. К-Г $-\frac{\lambda}{4!}\phi^4$

- 7.1.1 Корреляционная функция (Пескин 4.4)
- 7.1.2 Матричный элемент (Пескин 4.6)
- 7.2 4.2. теория Юкавы: Дирак + К-Г $-g\bar{\psi}\psi\phi$
- 7.3 4.3. КЭД: Дирак + Максвелл $-e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$
- 7.4 4.4. скалярная электродинамика: К-Г + $\frac{1}{2}e^2 A^2|\phi|^2$

СИМВОЛЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОГЛАШЕНИЯ

СИМВОЛЫ

$\mathcal{L} \quad \mathcal{H} \quad \mathcal{P} \quad \mathcal{M} \quad \vec{x} \quad \dot{x} \quad \hat{x} \quad \bar{x} \quad \tilde{x} \quad \sqrt{x} \quad \frac{x}{x} \quad \emptyset \quad \phi \quad \varphi \quad \epsilon \quad \varepsilon \quad \theta \quad \vartheta \quad \pm \quad \mp \quad \times \quad \otimes \quad \cdot \quad \Rightarrow \quad \rightarrow \quad \infty \quad \dots$

$$A_0 \langle | \rangle \quad [] \quad \{ \} \quad \int \sum \sin \cos \dim \text{Tr} \text{Tr} \left\{ \begin{matrix} 1, & 2 \\ 3, & 4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1, & 2 \\ 3, & 4 \end{pmatrix} \right. \quad \left. \begin{bmatrix} 1, & 2 \\ 3, & 4 \end{bmatrix} \right.$$

СОГЛАШЕНИЯ

у Пескина: $p_i = -p^i = \vec{p}$
 я привык: $p^i = -p_i = \vec{p}$

ОСНОВНАЯ ЛОГИКА:

- В кинематике и сечении понимаем, что для вычисления сечения нужно посчитать матричный элемент
- В квантах и представлениях мы понимаем, что для вычисления матричного элемента в возмущенной теории достаточно посчитать Т упорядочение в невозмущенной.
- В каждом поле имеется теорема Вика, которая говорит, что Т упорядочение можно вычислить через нормальное упорядочение и свертки
- И в конце мы из этих свертки конструируем диаграммы

1++ . Кинематика и сечения

Нормировки ВФ

Распределение $(f(x) = f(x')dx'/dx)$ на массовой поверхности:

$$\frac{dp'^z}{dp^z} = \beta + \beta\gamma \frac{dE}{dp^z} = \beta + \beta\gamma \frac{d\sqrt{p^2 + m^2}}{dp^z} = \beta + \beta\gamma \frac{p^z}{\sqrt{p^2 + m^2}} = \frac{\beta E + \beta\gamma p^z}{E} = \frac{E'}{E} \Rightarrow \text{если}$$

$$f(p) = |\phi(p)|^2, \text{ то } \sqrt{2E_p}\phi(p) = \sqrt{2E_{p'}}\phi(p').$$

2 - удобен из-за похожего множителя в квантовом решении, а может из-за знаменателя в пропагаторе.

$$\langle \vec{p} | \vec{k} \rangle = 2E_p (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{k}) - \text{лоренц-инвариантно}$$

$$\langle \vec{x} | \vec{y} \rangle = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{x} - \vec{y}) - \text{кажется уже нет (?)}$$

$$|\psi\rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{\psi_p(\vec{p})}{\sqrt{2E_p}} |\vec{p}\rangle = \int d^3\vec{x} \psi_x(\vec{x}) |\vec{x}\rangle$$

$$\text{НКМ: } \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle = \vec{p} \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle = -i\vec{\nabla} \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle \Rightarrow \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle = e^{+i\vec{p}\vec{x}}$$

$$\text{КТП: } \langle \vec{x} | \vec{p} \rangle = \sqrt{2E_p} e^{+i\vec{p}\vec{x}}$$

$$\psi_p(\vec{q}) = \int d^3\vec{x} e^{-i\vec{q}\vec{x}} \psi_x(\vec{x}); \quad \psi_x(\vec{y}) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} e^{+i\vec{p}\vec{y}} \psi_p(\vec{p})$$

$$|\vec{q}\rangle = \sqrt{2E_q} \int d^3\vec{x} e^{+i\vec{q}\vec{x}} |\vec{x}\rangle; \quad |\vec{y}\rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\vec{p}\vec{y}}}{\sqrt{2E_p}} |\vec{p}\rangle$$

сечение (Пескин, раздел 4.5.)

$$\langle f | S | i \rangle = \langle f | 1 + iT | i \rangle - \text{отбрасываем то, что не взаимодействует}$$

$$\langle \vec{p}_1 \vec{p}_2 \dots | iT | \vec{p}_A \vec{p}_B \rangle = (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 + \dots - p_A - p_B) i \mathcal{M}(p_1, p_2, \dots, p_A, p_B) - \text{закон сохранения импульсов}$$

выполнится в любом случае

начальное состояние зависит от прицельного параметра b : $|\phi_A \phi_B\rangle = \int \frac{d^3 \vec{k}_A}{(2\pi)^3} \frac{\phi_A(\vec{k}_A)}{\sqrt{2E_{k_A}}} \frac{d^3 \vec{k}_B}{(2\pi)^3} \frac{\phi_B(\vec{k}_B)}{\sqrt{2E_{k_B}}} e^{-i\vec{k}_B \vec{b}} |\vec{k}_A \vec{k}_B\rangle$

где $|\phi_A(\vec{k}_A)|^2 = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{k}_A - \vec{p}_A)$; $|\phi_B(\vec{k}_B)|^2 = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{k}_B - \vec{p}_B)$

$$d\sigma = \int d^2 \vec{b} P(\vec{b}); \quad P(\vec{b}) = \frac{d^3 \vec{p}_1 d^3 \vec{p}_2 \dots}{(2\pi)^3 2E_{p_1} (2\pi)^3 2E_{p_2} \dots} |\langle \vec{p}_1 \vec{p}_2 \dots | iT | \phi_A \phi_B \rangle|^2$$

$$d\sigma = \frac{|\mathcal{M}(p_1, p_2, \dots, p_A, p_B)|^2}{2E_A 2E_B |v_A - v_B|} \frac{d^3 \vec{p}_1 d^3 \vec{p}_2 \dots}{(2\pi)^3 2E_{p_1} (2\pi)^3 2E_{p_2} \dots} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 + \dots - p_A - p_B)$$

В системе центра масс для двух конечных частиц:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}(p_1, p_2, p_A, p_B)|^2}{2E_A 2E_B |v_A - v_B|} \frac{|\vec{p}_1|}{16\pi^2 E_{CM}}$$

Для полного сечения: если есть n тождественных частиц (каждого сорта), то его надо будет разделить на $n!$ (каждого сорта).

Ширины вычисляются по аналогии, но будут доказаны в Пескине 7.3.

1+. Кванты и представления

1+.1. Шрёдингер:

$i \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = H\psi(x, t)$ - Ландавшиц выводил из ур-я Гамильтона-Якоби

$H\psi_n(x) = E_n \psi_n(x)$ - разделение переменных, все дела...

$$\psi(x, t) = \sum_n a_n \psi_n(x) e^{-iE_n t}$$

$$\psi(x, t) = e^{-i\hat{H}t} \psi(x, 0)$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1$$

вероятность, что ψ есть ϕ равна $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$

вероятность, что ψ перейдет в ϕ за t равна $|\langle \phi | e^{-i\hat{H}t} | \psi \rangle|^2$

$$\langle M \rangle = \langle \psi | \hat{M} | \psi \rangle$$

подробнее про измерения - Нильсен-Чанг, Квантовые вычисления, раздел 2.2.

1+.2. Гайзенберг:

$$\langle O(t) \rangle = \langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | e^{i\hat{H}t} \hat{O} e^{-i\hat{H}t} | \psi(0) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{O}(t) | \psi(0) \rangle$$

$$i \frac{\partial \hat{O}(t)}{\partial t} = [\hat{O}(t), \hat{H}] - \text{подставляем, проверяем.}$$

В частности выр-я для \hat{q} и \hat{p} соответствуют ур-ям Гамильтона.

по прежнему

вероятность, что ψ есть ϕ равна $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$

вероятность, что ψ перейдет в ϕ за t равна $|\langle \phi | e^{-i\hat{H}t} | \psi \rangle|^2$

1+.3. Дирак (представление взаимодействия):

$H = H_0 + V$. Для H_0 решать умеем, т.е. знаем $e^{-iH_0 t}$. V - возмущение.

1+.3.1. из Шрёдингера

$$i \frac{\partial \psi_S}{\partial t} = H \psi_S$$

будем искать в виде $\psi_S = e^{-iH_0 t} \psi_I$

$$\text{тогда (*) } i \frac{\partial \psi_I}{\partial t} = e^{iH_0 t} V e^{-iH_0 t} \psi_I = V(t) \psi_I$$

$$\psi_I(t) = U(t, t_0) \psi_I(t_0)$$

$U(t, t_0) = T \{ \exp(-i \int_{t_0}^t dt_1 V(t_1)) \}$ - в ряд Тейлора и упорядочение по времени - в каждом учебнике имеется картиночка

$$U^+ U = I; \quad U^{-1}(t, t_0) = U^+(t, t_0) = U(t_0, t); \quad U(t_2, t_1) U(t_1, t_0) = U(t_2, t_0)$$

S-матрица: $S = \lim_{t_0 \rightarrow -\inf; t \rightarrow +\inf} U(t, t_0)$; $\langle fin|S|ini \rangle$ - матричный элемент

1+3.2. из Гайзенберга

далее по Пескину - раздел 4.2.

$$\begin{aligned} \text{хотим: } \hat{\phi}(t) &= e^{+i(H_0+V)t} \hat{\phi}(0) e^{-i(H_0+V)t} \\ \text{знаем: } \hat{\phi}_I(t) &= e^{+iH_0t} \hat{\phi}(0) e^{-iH_0t} \\ \hat{\phi}(t) &= U^+(t, 0) \hat{\phi}_I(t) U(t, 0) = U(0, t) \hat{\phi}_I(t) U(t, 0) \\ U(t, t_0) &= e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} \\ i \frac{\partial U}{\partial t} &= e^{iH_0t} V e^{-iH_0t} U = V(t) U, \text{ а это тоже самое, что и } (*) \end{aligned}$$

1+3.3. новое вакуумное состояние

$$\begin{aligned} \text{Было: } H_0|0\rangle &= 0|0\rangle. \text{ Стало: } H|\Omega\rangle = E_0|\Omega\rangle. \\ \text{разложим: } e^{-iHT}|0\rangle &= e^{-iE_0T}|\Omega\rangle\langle\Omega|0\rangle + \sum_{n \neq 0} e^{-iE_nT}|n\rangle\langle n|0\rangle \\ \text{ненормированное } \Rightarrow |\Omega\rangle_{nn} &= \lim_{T \rightarrow \infty(1+i\epsilon)} e^{-iHT}|0\rangle = U(0, -T)|0\rangle \\ \text{для произвольных } \hat{\phi}_1(t_1), \hat{\phi}_2(t_2), \hat{\phi}_3(t_3) \\ \langle\Omega|\hat{\phi}_1\hat{\phi}_2\hat{\phi}_3|\Omega\rangle &= \frac{\langle\Omega|\hat{\phi}_1\hat{\phi}_2\hat{\phi}_3|\Omega\rangle_{nn}}{\langle\Omega|\Omega\rangle_{nn}} = \lim_{T \rightarrow \infty(1+i\epsilon)} \frac{\langle 0|T\{\hat{\phi}_{I1}\hat{\phi}_{I2}\hat{\phi}_{I3} \exp(-i \int_{t_0}^T dt_1 V(t_1))\}|0\rangle}{\langle 0|T\{\exp(-i \int_{t_0}^T dt_1 V(t_1))\}|0\rangle} \end{aligned}$$

1. Лагранжев Формализм

1.0. Действие 1d, 4d, Вариация = 0

$$\begin{aligned} S &= \int L dt; \quad \delta S = 0 \\ S &= \int \mathcal{L} d^4x; \quad \delta S = 0 \end{aligned}$$

1.1. Уравнения Лагранжа (из 1.0.)

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial q} &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \text{для каждого } q \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} &= \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} - \text{для каждого } \phi \end{aligned}$$

1.2. Тензор энергии-импульса (из 1.0. и 1.1. или из 1.3)

$$\begin{aligned} E &= \sum_q p v - L(q, \dot{q}); \quad p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}; \quad v = \dot{q} \\ T^{\mu\nu} &= \sum_\phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \partial^\nu \phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L} \end{aligned}$$

1.3. Теорема Нётер (из 1.0 и 1.1)

$$\begin{aligned} \text{Если при } \delta\phi: \quad L &\rightarrow L + \frac{df}{dt}; \text{ или } \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \partial_\mu J^\mu, \text{ то } \delta S = 0 \text{ (если } \phi \text{ удовлетворяет ур-ям Лагранжа)} \\ \Rightarrow j^\mu &= \sum_\phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} \delta\phi - J^\mu = \text{const}(x) \end{aligned}$$

1.5. Гамильтониан, уравнения Гамильтона, Плотность Гамильтониана (из ...)

$$H(q, p) = \sum_q p v(q, p) - L(q, p) - \text{преобразование Лежандра}$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{q}; \quad \dot{q} = \frac{\partial \mathcal{H}}{p}$$

$$\mathcal{H} = T^{00} = \sum_{\phi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_0 \phi} \partial^0 \phi - \mathcal{L} = \sum_{\phi} \pi \dot{\phi} - \mathcal{L}; \quad H = \int d^3 \vec{x} \mathcal{H}$$

$$\vec{P} = T^{0i} = \sum_{\phi} \pi \vec{\nabla} \phi; \quad \vec{P} = \int d^3 \vec{x} \vec{P}; \quad \pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_0 \phi}$$

2. Свободные поля с пропагаторами и теоремами Вика

2.1. Скалярное действительное

2.1.1. Классическое

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_{\mu} \phi \partial^{\mu} \phi - \frac{m^2}{2} \phi^2$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_{\mu} \phi} = \partial^{\mu} \phi$$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)^2 + (\nabla \phi)^2 + m^2 \phi^2 \right)$$

$$\vec{P} = \partial_0 \phi \vec{\nabla} \phi$$

Глобальные калибровочные преобразования: $\phi \rightarrow e^{i\delta\alpha} \phi \Rightarrow \delta\phi = i\delta\alpha\phi \Rightarrow J^{\mu} = 0 \Rightarrow$

$$j^{\mu} = i\partial^{\mu} \phi\phi = i\frac{1}{2}\partial^{\mu}(\phi^2) - \text{ток чисто мнимый}$$

2.1.1.0. уравнение К-Г - Клейна-Гордона(-Фока)

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0$$

ищем решение в виде: $\phi(\vec{x}, t) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} e^{+i\vec{p}\vec{x}} \phi(\vec{p}, t)$

$$(*) \text{ получаем } \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + E_p^2 \right) \phi(\vec{p}, t) = 0$$

$$\phi(\vec{p}, t) = a(\vec{p}) e^{-iE_p t} + a^*(\vec{p}) e^{+iE_p t},$$

$$\phi(x) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} (a(\vec{p}) e^{-ipx} + a^*(-\vec{p}) e^{+ipx})$$

нормировка абсолютно не имеет значения, но чтобы всё было лоренц-инвариантно (? : почему мы делим а не умножаем на $\sqrt{2E_p}$? - может чтобы $\langle 0 | \phi(\vec{x}) | \vec{p} \rangle = e^{i\vec{p}\vec{x}}$):

$$\phi(x) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a(\vec{p}) e^{-ipx} + a^*(-\vec{p}) e^{+ipx})$$

2.1.1.1. Функции Грина

$$(\partial^2 + m^2)\phi_0(x) = 0$$

$$(\partial^2 + m^2)G(x) = -i\delta^4(x)$$

$$(\partial^2 + m^2)\phi(x) = j(x)$$

$$\phi(x) = \phi_0(x) + i \int d^4 y G(x-y) j(y)$$

$$G(p) = \frac{i}{p^2 - m^2}$$

$$G(x) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2} e^{-ipx} = \frac{i}{2\pi} \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dp_0}{p_0^2 - E_p^2} e^{-ipx}$$

при комплексном p_0 экспонента становится действительной, и мы замыкаем контур с той стороны, где она убывает (а не возрастает), т.е. при $x_0 < 0$ - сверху, а при $x_0 > 0$ - снизу

запаздывающая (retarded) (знаем источник, хотим найти поле) - оба полюса обходим сверху

$$G_R(x) = \begin{cases} 0, & x_0 < 0 \\ \frac{i}{2\pi} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (-2\pi i) \left(\frac{e^{-ipx}}{2E_p} - \frac{e^{+ipx}}{2E_p} \right), & x_0 > 0 \end{cases}$$

опережающая (advanced) (знаем поле, хотим найти источник (?)) - оба полюса обходим снизу

$$G_A(x) = \begin{cases} \frac{i}{2\pi} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (2\pi i) \left(\frac{e^{-ipx}}{2E_p} - \frac{e^{+ipx}}{2E_p} \right), & x_0 < 0 \\ 0, & x_0 > 0 \end{cases}$$

фeyнмановская (для частиц - запаздывающая, для античастиц - опережающая (fixme)) - отрицательный полюс обходим снизу, а положительный - сверху

$$D_F(x) = G_F(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ipx} = \begin{cases} \frac{i}{2\pi} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (2\pi i) \frac{e^{-ipx}}{2E_p}, & x_0 < 0 \\ \frac{i}{2\pi} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (2\pi i) \frac{e^{+ipx}}{2E_p}, & x_0 > 0 \end{cases}$$

$$D_F(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}; \quad D_F(x) = D_F(-x)$$

2.1.2 Квантовое

в квантовом случае: ϕ - оператор "координаты поля"

в одноточечном случае для (*)

[показать]

$$\hat{\mathcal{H}}(\vec{p}) = \frac{1}{2}(\hat{\pi}^2(\vec{p}) + E_p^2 \hat{\phi}^2(\vec{p})) = E_p(a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + \frac{1}{2})$$

$$[\hat{\phi}(\vec{p}), \hat{\pi}(\vec{p})] = i; \quad [\hat{a}(\vec{p}), \hat{a}^+(\vec{p})] = 1$$

$$\hat{\phi}(\vec{p}) = \frac{\hat{a}(\vec{p}) + \hat{a}^+(\vec{p})}{\sqrt{2E_p}}; \quad \hat{\pi}(\vec{p}) = -i\sqrt{\frac{E_p}{2}}(\hat{a}(\vec{p}) - \hat{a}^+(\vec{p}))$$

(далее операторы без шляпок)

но мы хотим $[\phi(\vec{x}), \pi(\vec{x}')] = i\delta(\vec{x} - \vec{x}')$; $[a(\vec{p}), a^+(\vec{p}')] = (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{p}')$ + нормировка фи

остальные коммутаторы =0

и тогда $\phi(\vec{p}) = \frac{a(\vec{p}) + a^+(-\vec{p})}{\sqrt{2E_p}}; \quad \pi(\vec{p}) = -i\sqrt{\frac{E_p}{2}}(a(\vec{p}) - a^+(-\vec{p}))$

механизм возникновения двойки в $\sqrt{2E_p}$: записываем коммутационные соотношения для $a \rightarrow$ записываем $\phi \rightarrow$ находим $\pi \rightarrow$ проверяем коммутационные соотношения для $[\phi, \pi]$

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\vec{p}} e^{+i\vec{p}\vec{x}} + a_{\vec{p}}^+ e^{-i\vec{p}\vec{x}})$$

$$\pi(\vec{x}) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{E_p}{2}} (a_{\vec{p}} e^{+i\vec{p}\vec{x}} - a_{\vec{p}}^+ e^{-i\vec{p}\vec{x}})$$

$\phi^+ = \phi$ - поле действительное

Н можно находить двумя способами: подставить фи в гамильтониан поля или подставить фи и пи в гамильтониан гарм. осциллятора

$$H = \int d^3\vec{x} \mathcal{H} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_p \frac{a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^+}{2} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_p (a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + \frac{1}{2} [a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^+]) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_p a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + const$$

$$[H, a_{\vec{p}}^+] = E_p a_{\vec{p}}^+; \quad [H, a_{\vec{p}}] = -E_p a_{\vec{p}}$$

$$\vec{P} = \int d^3\vec{x} \vec{P} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}}$$

$Q = ?$

2.1.2.1. Состояния

2 - удобен из-за похожего множителя в квантовом решении, а может из-за знаменателя в пропагаторе.

$$\begin{aligned}
|\vec{p}\rangle &= \sqrt{2E_p} a_p^+ |0\rangle; \quad \langle \vec{p} | \vec{q} \rangle = 2E_p (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{q}) \\
\phi(\vec{x})|0\rangle &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p}\vec{x}} |\vec{p}\rangle; \quad \langle 0 | \phi(\vec{x}) | \vec{p} \rangle = e^{i\vec{p}\vec{x}} \\
|\vec{x}\rangle &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} e^{-i\vec{p}\vec{x}} |\vec{p}\rangle; \quad - \text{(по словам Наумова) его нельзя выразить через } \phi \Rightarrow \text{(а может } \Leftarrow \text{) решением ур-я КГ не является}
\end{aligned}$$

2.1.2.2. Эволюция:

$$\begin{aligned}
i \frac{\partial \phi}{\partial t} &= [\phi, H] = i\pi; \quad i \frac{\partial \pi}{\partial t} = [\pi, H] = -i(-\nabla^2 + m^2)\phi; \\
Ha_p &= a_p(H - E_p) \Rightarrow H^n a_p = a_p(H - E_p)^n \\
\Rightarrow e^{iHt} a_p e^{-iHt} &= a_p e^{-iE_p t}; \quad e^{iHt} a_p^+ e^{-iHt} = a_p^+ e^{+iE_p t} \\
\phi(x) &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_p e^{-ipx} + a_p^+ e^{+ipx})|_{p^0=E_p}; \quad \pi(x) = \frac{\partial \phi}{\partial t} \\
e^{-i\vec{P}\vec{x}} a_p e^{+i\vec{P}\vec{x}} &= a_p e^{+i\vec{p}\vec{x}}; \quad e^{-i\vec{P}\vec{x}} a_p^+ e^{+i\vec{P}\vec{x}} = a_p^+ e^{-i\vec{p}\vec{x}} \\
P &= (H, \vec{P}) \Rightarrow \phi(x) = e^{iPx} \phi(0) e^{-iPx}
\end{aligned}$$

2.1.2.3. Пропагатор - амплитуда распространения частицы

$$\begin{aligned}
D(y-x) &:= \langle 0 | \phi(y) \phi(x) | 0 \rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-ip(y-x)} \\
\text{Если } A(x) &= \sum_n a_n \phi^{2n}(x) \quad \text{и} \quad B(y) = \sum_n a_n \phi^{2n}(y) \quad - \text{операторы измерений в соотв. точках, и } x \text{ и } y \text{ - разнесены} \\
&\text{пространственно-подобно,} \\
\text{то } B(y)A(x)|\psi\rangle &= A(x)B(y)|\psi\rangle \Leftrightarrow [A(x), B(y)] = 0 \Leftarrow [\phi(x), \phi(y)] = 0 \text{ or } \{\phi(x), \phi(y)\} = 0
\end{aligned}$$

$$[\phi(y), \phi(x)] = \langle 0 | [\phi(y), \phi(x)] | 0 \rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-ip(y-x)} - e^{+ip(y-x)}}{2E_p} = \begin{cases} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\vec{p}\vec{r}} - e^{+i\vec{p}\vec{r}}}{2E_p} = 0, & x^0 = y^0 \\ \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-iE_p t} - e^{+iE_p t}}{2E_p}, & \vec{x} = \vec{y} \end{cases}$$

$D(y-x) \neq 0$ при пространственно-подобном интервале, т.е. квантовая телепортация остается возможной.
если $y^0 > x^0$ то $[\phi(y), \phi(x)] = G_R(y-x) = D(y-x) - D(x-y)$

$$\langle 0 | T\{\phi(y)\phi(x)\} | 0 \rangle = D_F(y-x) = \begin{cases} \langle 0 | \phi(y)\phi(x) | 0 \rangle = D(y-x), & y^0 > x^0 \\ \langle 0 | \phi(x)\phi(y) | 0 \rangle = D(x-y), & x^0 > y^0 \end{cases}$$

2.1.2.4. Теорема Вика

T упорядочение: слева новые, справа старые

N упорядочение: слева a^+ , справа a , при перестановке знак не меняется.

$$\phi(x) = \phi^{(+)}(x) + \phi^{(-)}(x); \quad \phi^{(+)}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_p e^{-ipx}; \quad \phi^{(-)}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_p^+ e^{+ipx}$$

$$\text{свертка } \phi(x)\phi(y) := \begin{cases} [\phi^{(+)}(x), \phi^{(-)}(y)] = \langle 0 | \phi(x)\phi(y) | 0 \rangle, & x^0 > y^0 \\ .[\phi^{(+)}(y), \phi^{(-)}(x)] = \langle 0 | \phi(y)\phi(x) | 0 \rangle, & y^0 > x^0 \end{cases}$$

$$\text{свертка } \phi(x)\phi(y) = D_F(x-y) = D_F(y-x)$$

$$\text{теорема: } T\{\phi_1 \dots \phi_n\} = N\left\{ \sum_{\text{all contrs}} \phi_1 \dots \phi_n \right\}$$

2.2. Скалярное комплексное

2.2.1. Классическое

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^* \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi} &= \partial^\mu \phi^*; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi^*} = \partial^\mu \phi; \\
\mathcal{H} &= \left| \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|^2 + |\nabla \phi|^2 + m^2 |\phi|^2 \\
\vec{P} &= \partial_0 \phi^* \vec{\nabla} \phi + \partial_0 \phi \vec{\nabla} \phi^*
\end{aligned}$$

Глобальные калибровочные преобразования: $\phi \rightarrow e^{i\delta\alpha}\phi \Rightarrow \delta\phi = i\delta\alpha\phi \Rightarrow J^\mu = 0 \Rightarrow$

$$j^\mu = i(\partial^\mu \phi^* \phi - \partial^\mu \phi \phi^*)$$

2.1.1.0. уравнение К-Г - Клейна-Гордона(-Фока)

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0$$

ищем решение в виде: $\phi(\vec{x}, t) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} e^{+i\vec{p}\vec{x}} \phi(\vec{p}, t)$

$$(*) \text{ получаем } \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + E_p^2 \right) \phi(\vec{p}, t) = 0$$

$$\phi(\vec{p}, t) = a(\vec{p})e^{-iE_p t} + b^*(\vec{p})e^{+iE_p t},$$

$$\phi(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (a(\vec{p})e^{-ipx} + b^*(-\vec{p})e^{+ipx})$$

2.2.1.1. Функции Грина

по моему здесь всё так же как и для скалярного действительного

2.2.2. Квантовое

в квантовом случае: ϕ - оператор "координаты поля"

в одноточечном случае для (*)

[показать]

$$\hat{\mathcal{H}}(\vec{p}) = \frac{1}{2}(\hat{\pi}^2(\vec{p}) + E_p^2 \hat{\phi}^2(\vec{p})) = E_p(b_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + \frac{1}{2})$$

$$[\hat{\phi}(\vec{p}), \hat{\pi}(\vec{p})] = i; \quad [\hat{a}(\vec{p}), \hat{b}^+(\vec{p})] = 1$$

$$\hat{\phi}(\vec{p}) = \frac{\hat{a}(\vec{p}) + \hat{b}^+(\vec{p})}{\sqrt{2E_p}}; \quad \hat{\pi}(\vec{p}) = -i\sqrt{\frac{E_p}{2}}(\hat{a}(\vec{p}) - \hat{b}^+(\vec{p}))$$

(далее операторы без шляпок)

но мы хотим $[\phi(\vec{x}), \pi(\vec{x}')] = i\delta(\vec{x} - \vec{x}'); \quad [a(\vec{p}), a^+(\vec{p}')] = (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{p}') \quad [b(\vec{p}), b^+(\vec{p}')] = (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{p}')$

остальные коммутаторы =0

$$\text{и тогда } \phi(\vec{p}) = \frac{a(\vec{p}) + b^+(-\vec{p})}{\sqrt{2E_p}}; \quad \pi(\vec{p}) = -i\sqrt{\frac{E_p}{2}}(b(\vec{p}) - a^+(-\vec{p}))$$

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\vec{p}} e^{+i\vec{p}\vec{x}} + b_{\vec{p}}^+ e^{-i\vec{p}\vec{x}})$$

$$\pi(\vec{x}) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (-i)\sqrt{\frac{E_p}{2}} (b_{\vec{p}} e^{+i\vec{p}\vec{x}} - a_{\vec{p}}^+ e^{-i\vec{p}\vec{x}})$$

$$H = \int d^3\vec{x} \mathcal{H} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_p (b_{\vec{p}}^+ b_{\vec{p}} + a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^+) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_p (b_{\vec{p}}^+ b_{\vec{p}} + a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + [a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^+]) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_p (a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + b_{\vec{p}}^+ b_{\vec{p}}) + const$$

$$[H, a_{\vec{p}}^+] = E_p a_{\vec{p}}^+; \quad [H, a_{\vec{p}}] = -E_p a_{\vec{p}} \quad [H, b_{\vec{p}}^+] = E_p b_{\vec{p}}^+; \quad [H, b_{\vec{p}}] = -E_p b_{\vec{p}}$$

$$\vec{P} = \int d^3\vec{x} \vec{P} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} (a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} + b_{\vec{p}}^+ b_{\vec{p}})$$

$$Q = \int d^3\vec{x} j^0 = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (a_{\vec{p}}^+ a_{\vec{p}} - b_{\vec{p}}^+ b_{\vec{p}})$$

2.2.2.1. Состояния

вроде всё то же самое, только 2 типа частиц

$$|\vec{p}\rangle = \sqrt{2E_p} a_{\vec{p}}^+ |0\rangle; \quad \langle \vec{p} | \vec{q} \rangle = 2E_p (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{q})$$

$$\phi(\vec{x})|0\rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-i\vec{p}\vec{x}} |\vec{p}\rangle; \quad \langle 0|\phi(\vec{x})|\vec{p}\rangle = e^{i\vec{p}\vec{x}}$$

$$|\vec{x}\rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} e^{-i\vec{p}\vec{x}} |\vec{p}\rangle; \quad - \text{ (по словам Наумова) его нельзя выразить через } \phi \Rightarrow \text{ (а может } \Leftarrow \text{) решением ур-я КГ не является}$$

2.2.2.2. Эволюция:

вроде всё то же самое, только 2 типа частиц

$$i \frac{\partial \phi}{\partial t} = [\phi, H] = i\pi^+; \quad i \frac{\partial \pi^+}{\partial t} = [\pi^+, H] = -i(-\nabla^2 + m^2)\phi;$$

$$H a_{\vec{p}} = a_{\vec{p}}(H - E_p) \Rightarrow H^n a_{\vec{p}} = a_{\vec{p}}(H - E_p)^n$$

$$\Rightarrow e^{iHt} a_{\vec{p}} e^{-iHt} = a_{\vec{p}} e^{-iE_p t}; \quad e^{iHt} a_{\vec{p}}^\dagger e^{-iHt} = a_{\vec{p}}^\dagger e^{+iE_p t}$$

$$\phi(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_{\vec{p}} e^{-ipx} + b_{\vec{p}}^\dagger e^{+ipx})|_{p^0=E_p}; \quad \pi(x) = \frac{\partial \phi^+}{\partial t}$$

$$e^{-i\vec{P}\vec{x}} a_{\vec{p}} e^{+i\vec{P}\vec{x}} = a_{\vec{p}} e^{+i\vec{p}\vec{x}}; \quad e^{-i\vec{P}\vec{x}} a_{\vec{p}}^\dagger e^{+i\vec{P}\vec{x}} = a_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\vec{x}}$$

$$P = (H, \vec{P}) \Rightarrow \phi(x) = e^{iPx} \phi(0) e^{-iPx}$$

2.2.2.3. Пропагатор - амплитуда распространения частицы

$$D(y-x) := \langle 0|\phi^+(y)\phi(x)|0\rangle = \langle 0|\phi(y)\phi^+(x)|0\rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-ip(y-x)}$$

Если $A(x) = \sum_n (a_n \phi^{2n}(x) + b_n \phi^{+2n}(x))$ и $B(y) = \sum_n (a_n \phi^{2n}(y) + b_n \phi^{+2n}(y))$ - операторы измерений в соотв.

точках, и x и y - разнесены пространственно-подобно,

$$\text{то } B(y)A(x)|\psi\rangle = A(x)B(y)|\psi\rangle \Leftrightarrow [A(x), B(y)] = 0 \Leftrightarrow [\phi^{[+]}(x), \phi^{[+]}(y)] = 0 \text{ or } \{\phi^{[+]}(x), \phi^{[+]}(y)\} = 0$$

$$[\phi(y), \phi(x)] = [\phi^+(y), \phi^+(x)] = 0$$

$$[\phi^+(y), \phi(x)] = \langle 0|[\phi^+(y), \phi(x)]|0\rangle = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-ip(y-x)} - e^{+ip(y-x)}}{2E_p} = \begin{cases} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\vec{p}\vec{r}} - e^{+i\vec{p}\vec{r}}}{2E_p} = 0, & x^0 = y^0 \\ \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-iE_p t} - e^{+iE_p t}}{2E_p}, & \vec{x} = \vec{y} \end{cases}$$

$D(y-x) \neq 0$ при пространственно-подобном интервале, т.е. квантовая телепортация остается возможной.

если $y^0 > x^0$ то $[\phi^+(y), \phi(x)] = G_R(y-x) = D(y-x) - D(x-y)$

$$\langle 0|T\{\phi^+(y)\phi(x)\}|0\rangle = D_F(y-x) = \begin{cases} \langle 0|\phi^+(y)\phi(x)|0\rangle = D(y-x), & y^0 > x^0 \\ \langle 0|\phi^+(x)\phi(y)|0\rangle = D(x-y), & x^0 > y^0 \end{cases}$$

2.2.2.4. Теорема Вика

T упорядочение: слева новые, справа старые

N упорядочение: слева a^+, b^+ , справа a, b , при перестановке знак не меняется.

$$\phi(x) = \phi^a(x) + \phi^{b+}(x); \quad \phi^a(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_{\vec{p}} e^{-ipx}; \quad \phi^{a+}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} a_{\vec{p}}^\dagger e^{+ipx}$$

$$\phi^+(x) = \phi^{a+}(x) + \phi^b(x); \quad \phi^b(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} b_{\vec{p}} e^{-ipx}; \quad \phi^{b+}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} b_{\vec{p}}^\dagger e^{+ipx}$$

$$\text{свертка } \phi(x)\phi^+(y) := \begin{cases} [\phi^a(x), \phi^{a+}(y)] = \langle 0|\phi(x)\phi^+(y)|0\rangle, & x^0 > y^0 \\ [\phi^b(y), \phi^{b+}(x)] = \langle 0|\phi(y)\phi^+(x)|0\rangle, & y^0 > x^0 \end{cases}$$

$$\text{свертка } \phi^+(x)\phi(y) := \begin{cases} [\phi^b(x), \phi^{b+}(y)] = \langle 0|\phi^+(x)\phi(y)|0\rangle, & x^0 > y^0 \\ [\phi^a(y), \phi^{a+}(x)] = \langle 0|\phi^+(y)\phi(x)|0\rangle, & y^0 > x^0 \end{cases}$$

свёрток $\phi\phi$ или $\phi^+\phi^+$ не бывает

$$\text{свертка } \phi^+(x)\phi(y) = \phi(x)\phi^+(y) = D_F(x-y) = D_F(y-x)$$

$$\text{теорема: } T\{\phi_1 \dots \phi_n\} = N\left\{\sum_{\text{all contr}} \phi_1 \dots \phi_n\right\}$$

2.3. Спинорное

2.3.1. Арифметика γ матриц

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad i = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \cos \varphi + i \sin \varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{Tr } \sigma_i = 0$$

$$\sigma^1 = ? \quad \sigma^2 = ? \quad \sigma^3 = ?$$

$$\sigma_i \sigma_j = i \varepsilon_{ijk} \sigma_k - \delta_{ij}; \quad [\sigma_i \sigma_j] = 2i \varepsilon_{ijk} \sigma_k; \quad \{\sigma_i \sigma_j\} = (?) 2\delta_{ij}; \quad \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 = 1$$

$$(\vec{\sigma} \vec{a})(\vec{\sigma} \vec{b}) = (\vec{a} \vec{b}) + i(\vec{\sigma} [\vec{a} \times \vec{b}])$$

$$e^{i \vec{a} \vec{\sigma}} = \cos |\vec{a}| + i \frac{\vec{a} \vec{\sigma}}{|\vec{a}|} \sin |\vec{a}| \Rightarrow \text{Tr } e^{i \vec{a} \vec{\sigma}} = 2 \cos |\vec{a}|$$

$$e^{\vec{a} \vec{\sigma}} = \text{ch } |\vec{a}| + i \frac{\vec{a} \vec{\sigma}}{|\vec{a}|} \text{sh } |\vec{a}| \Rightarrow \text{Tr } e^{\vec{a} \vec{\sigma}} = 2 \text{ch } |\vec{a}|$$

Представление Дирака:

$$\gamma^0 = \beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \vec{\gamma} = \beta \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ -\vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\beta^2 = 1; \quad \vec{\alpha} \beta = -\beta \vec{\alpha}; \quad \alpha^k \alpha^n = \delta^{kn}$$

Другие представления:

$$\tilde{\psi} = V \psi; \quad \tilde{\gamma}^\mu = V \gamma^\mu V^+; \quad V V^+ = V^+ V = 1; \quad \sigma_\pm^\mu = (1, \pm \vec{\sigma})$$

$$\text{Вейля(у Пескина): } V = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} / \sqrt{2} \Rightarrow \gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_+^\mu \\ \sigma_-^\mu & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Спинорное: } V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} / \sqrt{2} \Rightarrow \gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_+^\mu \\ \sigma_+^\mu & 0 \end{pmatrix}$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}; \quad \text{Tr } \gamma^\mu = 0$$

$$\gamma^5 = \gamma_5 = \frac{i}{4!} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma = i \varepsilon_{0123} \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3; \quad \varepsilon_{0123} = +1$$

$$\gamma^5 \gamma^\mu = -\gamma^\mu \gamma^5; \quad \gamma^{5^2} = 1; \quad \text{Tr } \gamma_{\mu_1} \dots \gamma_{\mu_{2n+1}} = 0$$

$$\text{Tr } \gamma^\mu \gamma^\nu = 4g^{\mu\nu}; \quad \text{Tr } \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^5 = 0$$

$$\text{Tr } \gamma_\alpha \gamma_\beta \gamma_\mu \gamma_\nu = \text{Tr } \gamma_\nu \gamma_\alpha \gamma_\beta \gamma_\mu = \text{Tr}(2g_{\nu\alpha} - \gamma_\alpha \gamma_\nu) \gamma_\beta \gamma_\mu = \dots = 8g_{\alpha\nu} g_{\beta\mu} - 8g_{\beta\nu} g_{\alpha\mu} + 8g_{\mu\nu} g_{\alpha\beta} - \text{Tr } \gamma_\alpha \gamma_\beta \gamma_\mu \gamma_\nu$$

$$\Rightarrow \text{Tr } \gamma_\alpha \gamma_\beta \gamma_\mu \gamma_\nu = 4(+g_{\alpha\beta} g_{\mu\nu} + g_{\beta\mu} g_{\nu\alpha} - g_{\alpha\mu} g_{\beta\nu}); \quad \text{Tr } \gamma_{\mu_1} \dots \gamma_{\mu_{2n}} - \text{аналогично}$$

$$\text{Tr } \gamma_\alpha \gamma_\beta \gamma_\mu \gamma_\nu \gamma_5 = -i 4 \varepsilon_{\alpha\beta\mu\nu}$$

- скаляр: 1
- вектор: γ_μ
- тензор (6 шт.): $\sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2} [\gamma_\mu, \gamma_\nu]$
- псевдовектор: $\gamma_\mu \gamma_5$
- псевдоскаляр: γ_5

$$\gamma^\mu \gamma^\nu = g^{\mu\nu} - i \sigma^{\mu\nu}; \quad \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^5 = g^{\mu\nu} \gamma^5 - \frac{i}{2} \varepsilon^{\mu\nu\alpha\beta} \gamma_\alpha \gamma_\beta$$

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4; \quad \gamma^\mu \gamma^\nu R \gamma_\mu + \gamma^\nu \gamma^\mu R \gamma_\mu = 2R \gamma^\mu; \quad \gamma^\mu \not{A} R \gamma_\mu + \not{A} \gamma^\mu R \gamma_\mu = 2R \not{A};$$

$$\gamma^\mu \not{A} \gamma_\mu = -2\not{A}; \quad \gamma^\mu \not{A} \not{B} \gamma_\mu = +4A^\mu B_\mu; \quad \gamma^\mu \not{A} \not{B} \not{C} \gamma_\mu = -2\not{C} \not{B} \not{A}$$

$$(\gamma^\alpha)^+ = \gamma^0 \gamma^\alpha \gamma^0; \quad (\gamma^0 \gamma^\alpha)^+ = \gamma^0 \gamma^\alpha; \quad (\gamma^\alpha \gamma^0)^+ = \gamma^\alpha \gamma^0$$

$$\gamma^0 \gamma^2 \gamma^\mu \gamma^0 \gamma^2 = -(\gamma^\mu)^T; \quad \text{Tr}(\gamma^\alpha \gamma^\beta \gamma^\mu \dots) = \text{Tr}(\dots \gamma^\mu \gamma^\beta \gamma^\alpha)$$

2.3.2. Преобразования Лоренца

$$\psi \rightarrow L \psi; \quad \bar{\psi} = \psi^+ \gamma^0 \rightarrow \psi^+ L^+ \gamma^0 = \psi^+ \gamma^0 L^{-1} = \bar{\psi} L^{-1}; \quad L^{-1} \gamma^\mu L = \Lambda^\mu_\nu \gamma^\nu;$$

$$L = \exp(-\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu}); \quad S^{\mu\nu} = \frac{i}{4} [\gamma^\mu, \gamma^\nu]$$

где $\omega_{\mu\nu}$ - антисимметричный тензор, задающий бесконечно малые(?) углы.

Например при $\omega_{12} = -\omega_{21} = \theta$ будет поворот, а при $\omega_{01} = -\omega_{10} = \eta$ будет буст.

Пескин в разделе 3.1. и 3.2 подробнее рассказывает как с этим связаны алгебры Ли.

2.3.3. Классическое

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \bar{\psi}(i\vec{\partial} - m)\psi \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \psi} &= \bar{\psi} i \gamma^\mu; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \bar{\psi}} = 0; \quad \pi = \bar{\psi} i \gamma^0 = i\psi^+ \\ \mathcal{H} &= \bar{\psi}(i\vec{\gamma}\vec{\nabla} + m)\psi, \text{ но у Пескина в 3.5 } \mathcal{H} = \bar{\psi}(-i\vec{\gamma}\vec{\nabla} + m)\psi \\ \vec{P} &= i\psi^+ \vec{\nabla} \psi, \text{ но у Пескина в 3.5 } \vec{P} = -i\psi^+ \vec{\nabla} \psi \\ \psi &\rightarrow e^{i\alpha} \psi \Rightarrow j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi; \quad j^0 = \psi^+ \psi; \quad \vec{j} = \psi^+ \vec{\alpha} \psi \\ \mathcal{L} &= \bar{\psi} i \vec{\partial} \psi: \quad \psi \rightarrow e^{i\alpha \gamma^5} \psi \Rightarrow j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi;\end{aligned}$$

2.3.4. Уравнение Дирака

$$(i\vec{\partial} - m)\psi = 0$$

$$\psi(x) = e^{-ipx} u(p); \quad p^2 = m^2$$

далее ищем собственные векторы алгебраического уравнения

$$\begin{aligned}(\not{p} - m)u &= 0, \quad E_p > 0 \\ u_r(\vec{p}) &= \begin{pmatrix} \sqrt{E_p + m} \\ r\sqrt{E_p - m} \end{pmatrix} \otimes \chi_r - \text{в представлении Дирака} \\ u_r^+ u_s &= 2E_p \delta_{rs}; \quad \bar{u}_r u_s = 2m \delta_{rs}; \quad \sum_r u_r \otimes \bar{u}_r = \not{p} + m \\ (\not{p} + m)v &= 0, \quad E_p < 0 \Rightarrow p \rightarrow -p \\ v_r(\vec{p}) &= \begin{pmatrix} r\sqrt{E_p - m} \\ \sqrt{E_p + m} \end{pmatrix} \otimes \eta_r - \text{в представлении Дирака} \\ v_r^+ v_s &= 2E_p \delta_{rs}; \quad \bar{v}_r v_s = -2m \delta_{rs}; \quad \sum_r v_r \otimes \bar{v}_r = \not{p} - m \\ \frac{\vec{p}\vec{\sigma}}{|\vec{p}|} \chi_r &= r \chi_r; \quad \frac{\vec{p}\vec{\sigma}}{|\vec{p}|} \eta_r = r \eta_r; \quad \sum_s \chi_s \otimes \chi_s^+ = 1\end{aligned}$$

$r=+1$ - вдоль импульса, $r=-1$ - против - спиральность

но можно(?) выбрать и другой базис поляризаций, если решать в представлении Вейля

Итого:

$$\psi(x) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_r (a_r(\vec{p}) u_r(\vec{p}) e^{-ipx} + b_r^*(\vec{p}) v_r(\vec{p}) e^{+ipx})$$

2.3.5. функция Грина

$$\begin{aligned}(i\vec{\partial} - m)\psi_0(x) &= 0 \\ (i\vec{\partial} - m)G(x) &= +i\delta^4(x) \\ (i\vec{\partial} - m)\psi(x) &= j(x) \\ \psi(x) &= \psi_0(x) - i \int d^4 y G(x-y) j(y) \\ G(p) &= \frac{i}{\not{p} - m} = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2} \\ G(x) &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2} e^{-ipx} = (i\vec{\partial} + m) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2} e^{-ipx} \\ G_R(x) &= \begin{cases} 0, & x_0 < 0 \\ (i\vec{\partial} - m)(D(x) - D(-x)), & x_0 > 0 \end{cases} \\ G_A(x) &= \begin{cases} (i\vec{\partial} - m)(D(x) - D(-x)), & x_0 < 0 \\ 0, & x_0 > 0 \end{cases} \\ S_F(x) = G_F(x) &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ipx} = (i\vec{\partial} - m)D_F(x) = (i\vec{\partial} - m) \begin{cases} D(x), & x_0 < 0 \\ D(-x), & x_0 > 0 \end{cases} \\ S_F(p) &= \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}; \quad S_F(x) = S_F(-x)\end{aligned}$$

2.3.6. Квантуем

под произведением операторов ψ понимаем тензорное произведение

$$\{\psi(\vec{x}), \pi(\vec{y})\} = i\delta^3(\vec{x} - \vec{y}) \Rightarrow \{\psi(\vec{x}), \psi^+(\vec{y})\} = \delta^3(\vec{x} - \vec{y})$$

$$\{a_{\vec{p}}^r, a_{\vec{q}}^{s+}\} = \{b_{\vec{p}}^r, b_{\vec{q}}^{s+}\} = (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{q}) \delta^{rs}$$

остальные АНТИкоммутаторы =0

$$\psi(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_r (a_{\vec{p}}^r u^r(\vec{p}) e^{-ipx} + b_{\vec{p}}^{r+} v^r(\vec{p}) e^{+ipx})$$

$$\bar{\psi}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_r (b_{\vec{p}}^r \bar{v}^r(\vec{p}) e^{-ipx} + a_{\vec{p}}^{r+} \bar{u}^r(\vec{p}) e^{+ipx})$$

$$H = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_p \sum_s (a_{\vec{p}}^{s+} a_{\vec{p}}^s + b_{\vec{p}}^{s+} b_{\vec{p}}^s)$$

$$\vec{P} = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} \sum_s (a_{\vec{p}}^{s+} a_{\vec{p}}^s + b_{\vec{p}}^{s+} b_{\vec{p}}^s)$$

$$Q = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \sum_s (a_{\vec{p}}^{s+} a_{\vec{p}}^s - b_{\vec{p}}^{s+} b_{\vec{p}}^s)$$

2.3.6.1. Состояния

$$|\vec{p}, s\rangle = \sqrt{2E_p} a_{\vec{p}}^{s+} |0\rangle; \quad \langle \vec{p}, r | \vec{q}, s \rangle = 2E_p (2\pi)^3 \delta^3(\vec{p} - \vec{q}) \delta^{rs}$$

2.3.6.2. Пропагатор

$$\langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{\psi}(x) \psi(y) | 0 \rangle = (i \not{\partial}_x + m) D(x - y)$$

$$\langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle = \langle 0 | \psi(y) \bar{\psi}(x) | 0 \rangle = -(i \not{\partial}_x + m) D(y - x)$$

$$\{\psi(x) \bar{\psi}(y)\} = \langle 0 | \{\psi(x) \bar{\psi}(y)\} | 0 \rangle = (i \not{\partial}_x + m) \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-ip(y-x)} - e^{+ip(y-x)}}{2E_p} =$$

$$= (i \not{\partial}_x + m) \begin{cases} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-ip\vec{r}} - e^{+ip\vec{r}}}{2E_p} = 0, & x^0 = y^0 \\ \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-iE_p t} - e^{+iE_p t}}{2E_p}, & \vec{x} = \vec{y} \end{cases}$$

$$\langle 0 | T \{ \psi(x) \bar{\psi}(y) \} | 0 \rangle = S_F(x - y) = (i \not{\partial}_x + m) D_F(x - y) = \begin{cases} \langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle, & x^0 > y^0 \\ -\langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle, & y^0 > x^0 \end{cases}$$

2.3.6.3. теорема Вика

T упорядочение: слева новые, справа старые, при перестановке знак меняется.

N упорядочение: слева a^+, b^+ , справа a, b , при перестановке знак меняется.

$$\psi(x) = \psi^a(x) + \psi^{b+}(x) = \psi^{(+)}(x) + \psi^{(-)}(x); \quad \bar{\psi}(x) = \psi^{a+}(x) + \psi^b(x) = \bar{\psi}^{(-)}(x) + \bar{\psi}^{(+)}(x)$$

$$\psi^a(x) = \psi^{(+)}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_r a_{\vec{p}}^r u^r(\vec{p}) e^{-ipx}; \quad \psi^{a+}(x) = \bar{\psi}^{(-)}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_r a_{\vec{p}}^{r+} \bar{u}^r(\vec{p}) e^{+ipx}$$

$$\psi^b(x) = \bar{\psi}^{(+)}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_r b_{\vec{p}}^r \bar{v}^r(\vec{p}) e^{-ipx}; \quad \psi^{b+}(x) = \psi^{(-)}(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_r b_{\vec{p}}^{r+} v^r(\vec{p}) e^{+ipx}$$

$$\text{свертка } \psi(x) \bar{\psi}(y) := \begin{cases} \{\psi^a(x), \psi^{a+}(y)\} = \langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle, & x^0 > y^0 \\ -\{\psi^b(y), \psi^{b+}(x)\} = -\langle 0 | \psi(y) \bar{\psi}(x) | 0 \rangle, & y^0 > x^0 \end{cases}$$

$$\text{свертка } \bar{\psi}(x) \psi(y) := \begin{cases} \{\psi^b(x), \psi^{b+}(y)\} = \langle 0 | \bar{\psi}(x) \psi(y) | 0 \rangle, & x^0 > y^0 \\ -\{\psi^a(y), \psi^{a+}(x)\} = \langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle, & y^0 > x^0 \end{cases}$$

свёрток $\psi\psi$ или $\bar{\psi}\bar{\psi}$ не бывает

$$\text{свертка } \bar{\psi}(x) \psi(y) = \psi(x) \bar{\psi}(y) = S_F(x - y) = S_F(y - x)$$

$$\text{теорема: } T\{\psi_1 \dots \psi_n\} = N\left\{ \sum_{\text{all contrs}} \psi_1 \dots \psi_n \right\}$$

$$\text{причем свертка } N(\psi_1 \psi_2 \bar{\psi}_3 \bar{\psi}_4) = -S_F(x_1 - x_3) N(\psi_2 \bar{\psi}_4)$$

2.4. Электромагнитное

2.5. Векторное массивное

4. Взаимодействия и правила Фейнмана

4.1. К-Г $-\frac{\lambda}{4!}\phi^4$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4$$
$$(\partial^2 + m^2)\phi = \frac{\lambda}{3!}\phi^3$$
$$H = H_0 + V = H_0 + \frac{\lambda}{4!} \int d^3\vec{x} \phi(\vec{x})\phi(\vec{x})\phi(\vec{x})\phi(\vec{x})$$

Корреляционная функция (Пескин 4.4)

$$\langle 0|N\{\sum_{all\ convs} \phi(x)\phi(y)exp(-i\frac{\lambda}{4!} \int d^4z \phi(z)\phi(z)\phi(z)\phi(z))\}|0\rangle =$$

| | координатное | импульсное |
|---------------|-------------------------|--|
| вершины | $(-i\lambda) \int d^4x$ | $(-i\lambda) + \text{ЗСИ}$ |
| внешние точки | 1 | e^{-ipx} |
| свертки | $D_F(x-y)$ | $D_F(p)$ |
| | | $\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}$ по каждому импульсу |

и разделить на порядок симметрии диаграммы

все вакуумные поддиаграммы из всех вкладов можно вынести как один фазовый множитель

Матричный элемент (Пескин 4.6)

$$\langle \vec{p}_1 \dots \vec{p}_n | iT | \vec{p}_A \vec{p}_B \rangle = i\mathcal{M}(2\pi)^4 \delta^4(p_1 + \dots + p_n - p_A - p_B) =$$
$$= A_0 \langle \vec{p}_1 \dots \vec{p}_n | N\{\sum_{all\ convs} exp(-i\frac{\lambda}{4!} \int d^4z \phi(z)\phi(z)\phi(z)\phi(z))\} | \vec{p}_A \vec{p}_B \rangle_0$$

- связный, ампутированный

A=1, если нет петель

все вакуумные поддиаграммы из всех вкладов можно вынести как один фазовый множитель

ампутированные части - эволюция внешних состояний

несвязные - вклад в 1 в S - когда начальное и конечное состояния тождественны (? - а частично несвязные)

свертка $\phi(x)|\vec{p}\rangle = e^{-ipx}$

свертка $\langle \vec{p}|\phi(x) = e^{+ipx}$

| | координатное $\rightarrow \langle \cdot iT \cdot \rangle$ | импульсное $\rightarrow i\mathcal{M}$ |
|---------------|---|---|
| вершины | $(-i\lambda) \int d^4x$ | $(-i\lambda) + \text{ЗСИ}$ |
| внешние линии | e^{-ipx} | 1 |
| свертки | $D_F(x-y)$ | $D_F(p)$ |
| | | $\int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}$ по каждому незафиксированному импульсу |

и разделить на порядок симметрии диаграммы

Пескин обещает строго вывести через корреляционную функцию в 7.3. - оптическая теорема

4.2. теория Юкавы: Дирак + К-Г $-g\bar{\psi}\psi\phi$

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi + \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - g\bar{\psi}\psi\phi$$

т.к. гамильтониан взаимодействия всегда содержит чётное число спиноров, то знак минус в определении Т упорядочения для фермионов не нарушает корректность вычислений

4.3. КЭД: Дирак + Максвелл $-e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 - e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2$$

$$D_\mu := \partial_\mu + ieA_\mu(x)$$

Глобальные калибровочные преобразования, сохраняющие лагранжиан:

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x); \quad A_\mu \rightarrow A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha(x)$$

$$(i\hat{D} - m)\psi = 0$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = e\bar{\psi}\gamma^\nu\psi = ej^\nu$$

4.4. скалярная электродинамика: К-Г + $\frac{1}{2}e^2 A^2|\phi|^2$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}|D_\mu\phi|^2 - \frac{1}{2}m^2|\phi|^2 = \frac{1}{2}|\partial_\mu\phi|^2 - \frac{1}{2}m^2|\phi|^2 + \frac{1}{2}e^2 A^2|\phi|^2$$

Источник — «<https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Участник:FeelUs/КТП&oldid=83528533>»

-
- Последнее изменение этой страницы: 14:28, 7 февраля 2017.
 - Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
- Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.