

## [XXX] 前列腺患癌的可能性危险

前列腺可能存在肿瘤。

建议接受经直肠超声波和下腹CT检查。

若无法确定病灶,有可能是微细癌,需要通过复诊进行不断的监测。

## 患癌原因

诱发前列腺癌的主要危险因素有雄性激素异常,糖尿病,家族史,肥胖或者过多摄取动物脂肪等。 可通过改善日常生活习惯来预防前列腺癌。

建议50岁以上的男性以1年为周期进行前列腺特异性抗原(PSA)检查和直肠指检检查。研究证明过度肥胖会提高前列腺癌的诱发概率,建议进行保持正常体重的健康管理。

## 主要症状

一般情况下在初期阶段前列腺癌没有任何症状。

癌细胞扩散转移到周边器官时会出现排尿困难,尿频,尿血,排尿疼痛,急性尿闭,排尿不畅等症状。

当前列腺癌转移到盆腔或脊椎时会伴随出现严重的骨痛,腰痛,下肢麻痹等症状。

## 诊断方法

诊断前列腺癌方法有直肠指检,血清前列腺特异抗原(PSA)检查,前列腺活体组织和经直肠超声扫查。

在确诊为癌症后,为明确病期需通过腹部计算机断层扫描(CT),核磁共振成像检查(MRI)和骨骼扫描来确认癌组织有无转移。