



## 郑化龙 前列腺患癌的可能性 注意

前列腺组织可能存在炎症以上的症状，或功能异常。  
通过1年以内复查确认甲基化变化的趋势之后，建议采取其他诊断手段。

### 患癌原因

诱发前列腺癌的主要危险因素有雄性激素异常，糖尿病，家族史，肥胖或者过多摄取动物脂肪等。  
可通过改善日常生活习惯来预防前列腺癌。  
建议50岁以上的男性以1年为周期进行前列腺特异性抗原（PSA）检查和直肠指检检查。  
研究证明过度肥胖会提高前列腺癌的诱发概率，建议进行保持正常体重的健康管理。

### 主要症状

一般情况下在初期阶段前列腺癌没有任何症状。  
癌细胞扩散转移到周边器官时会出现排尿困难，尿频，尿血，排尿疼痛，急性尿闭，排尿不畅等症状。  
当前列腺癌转移到盆腔或脊椎时会伴随出现严重的骨痛，腰痛，下肢麻痹等症状。

### 诊断方法

诊断前列腺癌方法有直肠指检，血清前列腺特异抗原（PSA）检查，前列腺活体组织和经直肠超声扫描。  
在确诊为癌症后，为明确病期需通过腹部计算机断层扫描（CT），核磁共振成像检查（MRI）和骨骼扫描来确认癌组织有无转移。