



贾小平

子宫内膜患癌的可能性 警告

子宫内膜组织中可能存在癌前病变以上的症状。
需要在6个月之内进行复查。
当产生自觉症状时，建议进行经阴道超声波检查。

患癌原因

子宫内膜癌主要发生在绝经后女性中，它的恶性度随着年龄的增长而增加。
绝经后女性的雌激素替代疗法，绝经延迟或初潮年龄过早，不孕不育以及肥胖等都会增加子宫内膜癌的危险性。
若患有女性荷尔蒙分泌肿瘤，也会增加子宫内膜癌的患病概率。
家族中若有子宫内膜癌，乳腺癌或大肠癌患者，建议进行定期的子宫检查。

主要症状

子宫内膜癌有早期症状，发现率比其他癌症高。
当在50岁以上绝经后的女性中会出现非正常性阴道出血；未绝经的女性中会出现不规律性子宫出血，阴道分泌物增加，阴道出血或月经过多等症状出现时，需要留心检查是否患有子宫内膜癌。

诊断方法

通过专业医生诊查手段，如采用内部检查和超声图像观察子宫内膜的形状，厚度等来确认有无异常，还可以通过子宫内膜活组织检查和子宫内镜检查来确诊。
在确定是子宫内膜癌之后，可以采用CT、MRI或PET-CT等诊断方法进行检查是否癌组织存在转移等情况。