



黄如兰 大肠患癌的可能性 注意

大肠可能存在溃疡性结肠炎等炎症。
通过1年以内复查确认甲基化变化的趋势之后，建议采取其他诊断手段。

患癌原因

若有大量摄取红肉或肉类加工品，肥胖，饮酒，家族中存在大肠癌患者，家族性大肠息肉症，腺瘤性大肠息肉等大肠疾病危险因素时，需要采取积极的防备措施。
年龄在50岁以上的建议1年内多次进行大便隐血反应检查，若出现异常症状建议进行大肠内镜检查。
大肠癌的主要症状有腹泻，便秘，大便不尽感，血便，粘液便，腹痛，腹胀，疲劳，消化不良等。

主要症状

一般情况下大肠癌在早期阶段没有任何症状。
随着病情发展会出现右侧下腹疼痛，腹部不适，食欲减退，消化不良，排便习惯变化，贫血，体重下降等症状，并且偶尔抚摸腹部时会有肿块感的现象。
随着病情的快速发展会出现大肠流通障碍或肠梗塞症状。

诊断方法

大肠癌可通过直肠指检的方式来确认有无异常肿块和出血的症状。
除此之外，还有便潜血检测，大肠影像，正电子发射型计算机断层显像（PET），PET-CT检测以及能够检查活组织的大肠内镜检测的方法。