



徐洁星

卵巢患癌的可能性 注意

卵巢可能存在炎症以上的症状或功能降低。

通过1年以内复查确认甲基化变化的趋势之后，建议采取其他诊断手段。

患癌原因

排卵是诱发卵巢癌的主要因素。

人的一生中，排卵期较长者比排卵期较短者的卵巢癌诱发率要高。

初潮过早或绝经过晚都会增加卵巢癌的诱发概率。

多次怀孕或生育，以及经过母乳喂养等使无排卵期延长的方式，可减少卵巢癌的发病因素。

若存在遗传性家族史卵巢癌情况，生育后建议进行卵巢切除手术来预防癌症的发生。

主要症状

一般情况下卵巢癌在初期阶段没有任何症状。

若早期能够发现卵巢癌，则治愈率会很高。

卵巢癌发病的主要症状是腹痛，腹胀，消化不良以及阴道出血。

诊断方法

即使没有出现卵巢癌症状，也需要在1年内通过健康体检或妇科超声波检查进行早期的诊断。

若要辨别出是良性肿瘤还是恶性肿瘤，可通过盆腔检查，血液肿瘤标志物检查（CA-125）以及盆腔超声波等检查，还可以通过MRI，CT或PET进一步确认有无病变和转移。