



赵壁裕

肺患癌的可能性 **注意**

患有炎症性肺病以上的症状，或肺功能异常。

通过1年以内复查确认甲基化变化的趋势之后，建议采取其他诊断手段。

患癌原因

包括吸二手烟的所有吸烟都是诱发肺癌的主要因素。

吸烟为首的生活因素，以及长期接触石棉，砷，铬的职业性因素，空气中的致癌物质，放射物质等环境因素都会诱发肺癌。

为了预防肺癌需要戒烟，若存在环境因素和家族史的情况，建议缩短定期体检的周期。

建议40岁以上吸烟者进行每年1次的低剂量CT检查，痰脱落细胞检查或胸部X线检查。

主要症状

一般情况下肺癌在早期阶段没有任何症状。

随着病情的发展会出现与感冒相类似的呼吸困难，咳痰，咳嗽等症状，因此很难区分是否是肺癌。

伴随癌细胞转移的部位，还会出现声音沙哑，吞咽困难，没有食欲，体重下降，上腔静脉综合症等症状。

诊断方法

可通过胸部X光，胸部计算机断层显像（CT），支气管镜检查以及经胸壁针吸活检等检测来判断是否患癌，癌发部位及癌状态程度。

被确诊为肺癌以后，需进行全身骨骼扫描，脑磁共振影像检测（MRI），PET等检查来推断肺癌病期。