

$$\begin{aligned}
& x^1 \equiv x, \quad x^2 \equiv y \\
& X^1 \equiv X, \quad X^2 \equiv Y \\
(X, Y) : & \begin{cases} x^1 = \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2}\ln Y \\ x^2 = \frac{2}{3}X^3 - \frac{1}{2}Y \end{cases}, \quad M : (1, \quad 1), \quad \vec{a} : \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$1. \quad Q_J^I = \frac{\partial x^I}{\partial X^J}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial x^1}{\partial X} = X(1, 1) = 1 \\ \frac{\partial x^1}{\partial Y} = \frac{1}{2Y}(1, 1) = \frac{1}{2} \\ \frac{\partial x^2}{\partial X} = 2X^2(1, 1) = 2 \\ \frac{\partial x^2}{\partial Y} = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow Q_J^I = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} - \text{матрица перехода}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$$

$$P_J^I = \frac{\partial X^I}{\partial x^J}$$

$$(P_J^I) = (Q_J^I)^{-1}$$

$$(Q_J^I)^{-1} = \frac{1}{Q} \begin{pmatrix} Q_2^2 & -Q_2^1 \\ -Q_1^2 & Q_1^1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-\frac{3}{2}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P_J^I = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} - \text{обратная матрица перехода}$$

$$P = \left( \frac{1}{3} \cdot -\frac{2}{3} - \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{3} \right) = -\frac{2}{3} = Q^{-1}$$

$$2. \quad \vec{R}_i = Q_i^j \vec{e}_j$$

$$\vec{R}_i = Q_i^1 \vec{e}_1 + Q_i^2 \vec{e}_2$$

$$\begin{cases} \vec{R}_1 = Q_1^1 \vec{e}_1 + Q_1^2 \vec{e}_2 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{R}_2 = Q_2^1 \vec{e}_1 + Q_2^2 \vec{e}_2 = \frac{1}{2} \cdot \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \cdot \vec{e}_2 \end{cases}$$

$$\vec{R}_i = Q_i^1 \vec{e}_1 + Q_i^2 \vec{e}_2$$

$$\begin{cases} \vec{R}_1 = Q_1^1 \vec{e}_1 + Q_1^2 \vec{e}_2 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{R}_2 = Q_2^1 \vec{e}_1 + Q_2^2 \vec{e}_2 = \frac{1}{2} \cdot \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \cdot \vec{e}_2 \end{cases}$$

$$\vec{R}_i = Q_i^1 \vec{e}_1 + Q_i^2 \vec{e}_2$$

$$\begin{cases} \vec{R}_1 = Q_1^1 \vec{e}_1 + Q_1^2 \vec{e}_2 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{R}_2 = Q_2^1 \vec{e}_1 + Q_2^2 \vec{e}_2 = \frac{1}{2} \cdot \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \cdot \vec{e}_2 \end{cases}$$

$$3. \quad g_{ij} = \vec{R}_i \cdot \vec{R}_j$$

$$\begin{aligned}
& \left\{ \begin{aligned} g_{11} &= (1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2)(1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2) = 1^2 + 2^2 = 5 \\ g_{12} &= (1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2) \left( \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \right) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} \\ g_{21} &= g_{12} = -\frac{1}{2} \\ g_{22} &= \left( \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \right) \left( \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right. \\
& g_{IJ} = \begin{pmatrix} 5 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
& g = \begin{pmatrix} 5 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{5}{2} - \frac{1}{4} = \frac{9}{4} \\
& (g^{IJ}) = (g_{IJ})^{-1} = \frac{4}{9} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{20}{9} \end{pmatrix} \\
& q^{IJ} = g^{IJ} \\
& q = \frac{16}{81} \cdot \left( \frac{5}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{16}{81} \cdot \frac{9}{4} = \frac{4}{9} \\
& qg = 1
\end{aligned}$$

$$4. \vec{R}^i = g^{ij} \vec{R}_j$$

$$\begin{aligned}
& \vec{R}^i = g^{i1} \vec{R}_1 + g^{i2} \vec{R}_2 \\
& \left\{ \begin{aligned} \vec{R}^1 &= g^{11} \vec{R}_1 + g^{12} \vec{R}_2 = \frac{2}{9} (1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2) + \frac{2}{9} \left( \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \right) = \frac{1}{3} \vec{e}_1 + \frac{1}{3} \vec{e}_2 \\ \vec{R}^2 &= g^{21} \vec{R}_1 + g^{22} \vec{R}_2 = \frac{2}{9} (\vec{e}_1 + 2 \vec{e}_2) + \frac{20}{9} \left( \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \right) = \frac{4}{3} \vec{e}_1 - \frac{2}{3} \vec{e}_2 \end{aligned} \right.
\end{aligned}$$

$$5. \vec{a} = a^I \vec{e}_I = b^I \vec{R}_I = b_I \vec{R}^I$$

$$\begin{aligned}
& b^I = P_J^I a^J = P_1^I a^1 + P_2^I a^2 \\
& \left\{ \begin{aligned} b^1 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1 \\ b^2 &= \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1 \end{aligned} \right. \\
& b_I = Q_I^J a_J = Q_I^J \delta_{JK} a^K = Q_I^1 \cdot a^1 + Q_I^2 \cdot a^2 \\
& \left\{ \begin{aligned} b_1 &= 1 \cdot \frac{3}{2} + 2 \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{2} \\ b_2 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = 0 \end{aligned} \right.
\end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned}
& \vec{R}^I \cdot \vec{R}_J = \delta_J^I \\
& \left\{ \begin{aligned} \vec{R}^1 \cdot \vec{R}_1 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 = \delta_1^1 \\ \vec{R}^1 \cdot \vec{R}_2 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = 0 = \delta_2^1 \\ \vec{R}^2 \cdot \vec{R}_1 &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{4}{3} - \frac{4}{3} = 0 = \delta_1^2 \\ \vec{R}^2 \cdot \vec{R}_2 &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1 = \delta_2^2 \end{aligned} \right.
\end{aligned}$$

$$g_{IJ} = Q_I^K Q_J^L \delta_{KL} = Q_I^1 \cdot Q_J^1 + Q_I^2 \cdot Q_J^2$$

$$\left( \begin{array}{l} g_{11} = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 5 \\ \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} g_{12} = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \\ \end{array} \right\}$$

$$g_{21} = g_{21}$$

$$\left( \begin{array}{l} g_{22} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + -\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ \end{array} \right.$$

$$g^{IJ} = P_K^I P_L^J \delta^{KL} = P_1^I \cdot P_1^J + P_2^I \cdot P_2^J$$

$$\left( \begin{array}{l} g^{11} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \\ \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} g^{12} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} + \frac{1}{3} \cdot -\frac{2}{3} = \frac{2}{9} \\ \end{array} \right\}$$

$$g^{21} = g^{12}$$

$$\left( \begin{array}{l} g^{22} = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} + -\frac{2}{3} \cdot -\frac{2}{3} = \frac{20}{9} \\ \end{array} \right.$$

$$g^{IJ} = \overrightarrow{R^I} \cdot \overrightarrow{R^J}$$

$$\left( \begin{array}{l} g^{11} = \left( \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \right) \circ \left( \begin{array}{c} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{array} \right) = \frac{2}{9} \\ \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} g^{12} = \left( \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \right) \circ \left( \begin{array}{c} \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{array} \right) = \frac{2}{9} \\ \end{array} \right\}$$

$$g^{21} = g^{12}$$

$$\left( \begin{array}{l} g^{22} = \left( \frac{4}{3} \quad -\frac{2}{3} \right) \circ \left( \begin{array}{c} \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{array} \right) = \frac{20}{9} \\ \end{array} \right.$$

$$\vec{R}_J = g_{IJ} \vec{R}^I = g_{1J} \vec{R}^1 + g_{2J} \vec{R}^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_1 = 5 \cdot \left( \frac{1}{3} \vec{e}_1 + \frac{1}{3} \vec{e}_2 \right) + -\frac{1}{2} \cdot \left( \frac{4}{3} \vec{e}_1 - \frac{2}{3} \vec{e}_2 \right) = \left( \frac{5}{3} - \frac{2}{3} \right) \vec{e}_1 + \left( \frac{5}{3} + \frac{1}{3} \right) \vec{e}_2 = \vec{e}_1 + 2 \vec{e}_2 \\ \vec{R}_2 = -\frac{1}{2} \cdot \left( \frac{1}{3} \vec{e}_1 + \frac{1}{3} \vec{e}_2 \right) + \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{4}{3} \vec{e}_1 - \frac{2}{3} \vec{e}_2 \right) = \left( -\frac{1}{6} + \frac{2}{3} \right) \vec{e}_1 + \left( -\frac{1}{6} - \frac{1}{3} \right) \vec{e}_2 = \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \end{array} \right.$$

$$b_I = g_{IJ} b^J = g_{I1} b^1 + g_{I2} b^2$$

$$\left( \begin{array}{l} b_1 = 5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \\ \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} b_2 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 \\ \end{array} \right\}$$

$$b^I = g^{IJ} b_J = g^{I1} b_1 + g^{I2} b_2$$

$$\left( \begin{array}{l} b^1 = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{2} + 0 = 1 \\ \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} b^2 = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{2} = 1 \\ \end{array} \right\}$$

$$b_I = \vec{a} \cdot \vec{R}_I$$

$$b^I = \vec{a} \cdot \vec{R}^I$$

$$\left( \begin{array}{l} b_1 = \left( 1 \quad 2 \right) \circ \left( \begin{array}{c} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{array} \right) = \frac{9}{2} \\ \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} b_2 = \left( \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \right) \circ \left( \begin{array}{c} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{array} \right) = 0 \\ \end{array} \right\}$$

$$\left( \begin{array}{l} b^1 = \left( \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \right) \circ \left( \begin{array}{c} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{array} \right) = 1 \\ \end{array} \right.$$

$$\left( \begin{array}{l} b^2 = \left( \frac{4}{3} \quad -\frac{2}{3} \right) \circ \left( \begin{array}{c} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \end{array} \right) = 1 \\ \end{array} \right.$$

$$X^i = \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ z \end{pmatrix}$$

$$\tilde{x}^i = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}$$

$$e^i = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$X^i = e^j$$