

13/02/2025

Уравнение второго порядка от 2 переменных  
Уравнение, линейное относительно старших производных:  
Линейное уравнение второго порядка:

$b_1$	$u_x$
$b_2$	$u_y$
$a_{11}$	$u_{xx}$
$2a_{12}$	$u_{xy}$
$a_{22}$	$u_{yy}$

Убедиться, что результат будет линейным

$$A_{11}u_{\xi\xi} + 2A_{12}u_{\xi\eta} + A_{22}u_{\eta\eta} + B_1u_\xi + B_2u_\eta = F$$

$$A_{11} = 0 \Leftrightarrow a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2 = 0$$

$\xi(x, y)$  — частное решение  $\Rightarrow \dots$

Утверждение 1

$\xi(x, y)$  — частное решение  $\Leftrightarrow \xi(x, y) = C$  — Общий интеграл следующего ОДУ:

$$\text{ОДУ: } a_{11}dy^2 - 2a_{12}dydx + a_{22}dx^2 = 0$$

Доказательство:

$$\Rightarrow) a_{11}\left(-\frac{\xi_x}{\xi_y}\right)^2 - 2a_{12}\left(-\frac{\xi_x}{\xi_y}\right) + a_{22} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\xi_x}{\xi_y}|_{y=y(x,C)} \text{ — Производная неявной функции}$$

$\Leftrightarrow \xi(x, y) = C$  — Общий интеграл

$$a_{11}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2a_{12}\frac{dy}{dx} + a_{22} =$$

$$= a_{11}\left(-\frac{\xi_x}{\xi_y}\right)^2 - 2a_{12} \cdot -\frac{\xi_x}{\xi_y} + a_{22} = 0$$

$$a_{11} \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{12} \frac{dy}{dx} + a_{22} = 0 \quad - \text{Характеристическое уравнение}$$

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} \pm \sqrt{\Delta}}{a_{11}}$$

Решение интегральных уравнений будем называть характеристиками

$$\xi(x, y) = C \text{ и } \eta(x, y) = C \quad - \text{независимые} \implies$$

$$\Delta > 0 \quad - \text{гиперболическое}$$

$$\Delta = 0 \quad - \text{параболическое}$$

$$\Delta < 0 \quad - \text{эллиптическое}$$

Задача: Доказать, что

$$A_{12}^2 - A_{11}A_{22} = (a_{12}^2 - a_{11}a_{22})$$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$$

### 1. Гиперболические уравнения

$$a_{11}u_{xx} + F(x, u, \dots) = 0$$

$$a) u_{\xi\xi} + \tilde{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0, \tilde{F} = -\frac{F}{2A_{12}}$$

$$б) \begin{cases} \xi = \alpha + \beta \\ \eta = \alpha - \beta \end{cases}, \begin{cases} \alpha = \frac{\xi + \eta}{2} \\ \beta = \frac{\xi - \eta}{2} \end{cases}$$

$$u_\xi = u_\alpha \alpha_\xi + u_\beta \beta_\xi = \frac{1}{2}(u_\alpha + u_\beta)$$

$$u_\eta = \dots = \frac{1}{2}(u_\alpha - u_\beta)$$

$$u_{\xi\eta} = \dots = \frac{1}{4}(u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta})$$

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + G(\alpha, \beta, \dots) = 0$$

Доказать, что  $A_{22} = 0$

### 2. Параболические уравнения

$$\begin{cases} \xi(x, y) = C \\ \eta(x, y) = C \end{cases} \quad - \text{независима от } \xi$$

$$\text{Доказать: } A_{11} = (\sqrt{a_{11}}\xi_x + \sqrt{a_{22}}\xi_y)^2 = 0$$

$$A_{12} = (\sqrt{a_{11}}\xi_x + \sqrt{a_{22}}\xi_y)(\sqrt{a_{11}}\eta_x + \sqrt{a_{22}}\eta_y) = 0$$

$$A_{22} = \dots$$

$$u_{\eta\eta} + \tilde{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0, \tilde{F} = -\frac{F}{A_{22}}$$

### 3. Эллиптические уравнения


$$u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + F(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0$$

20/02/2025

Уравнение колебаний на отрезке. Метод разделения переменных

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ \text{Граничные условия} \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$f(x, t)$  - плотность мощности воздействия на струну



Перейдём к вспомогательной задаче. Будет искать её решение в виде  $z(x, t) = T(t)X(x)$

$$\begin{cases} z_{tt} = a^2 z_{xx}, & 0 < x < l, t > 0 \\ z|_{x=0} = z|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

$$T''X = a^2TX''$$

$$\frac{T''}{a^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda, \quad T(t)X(0) = T(t)X(l) = 0$$

$$\begin{cases} -X'' - \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$$

$X$  - нетривиальное решение

$$-\frac{d^2}{dt^2} : X \rightarrow -X''$$

1) Априорная оценка знака  $\lambda$

$$\mathcal{A} : L \rightarrow L$$

$$\mathcal{A} \subseteq L$$

$-\frac{d^2}{dx^2}$  - дважды непрерывно дифференцируемый оператор

$$-X'' - \lambda X = 0$$

$$\int_0^l (-X''X - \lambda X^2) dx = 0$$

$$\cancel{-X'X|_0^l}^0 + \int_0^l (X')^2 dx - \lambda \int_0^l X^2 dx = 0$$

$$\int_0^l (X')^2 dx - \lambda \int_0^l X^2 dx = 0,$$

Теорема о сохранении знака непрерывной функции:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |x^2(r) - x_0^2| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \int_0^l X^2 dx > 0 \Rightarrow \lambda \geq 0$$

Пусть  $\lambda = 0 \Rightarrow$

$$\int_0^l (x')^2 dx = 0 \Rightarrow X'(x) = 0 \Rightarrow X = C \Rightarrow X = 0 - \text{тривиальное решение}$$

Где-то в решении использовалась теорема Гильберта-Шмидта

$\lambda > 0 :$

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x, \quad A^2 + B^2 \neq 0$$

$$X(0) = A = 0 \Rightarrow B \neq 0$$

$$X(l) = B \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \Rightarrow \sin \sqrt{\lambda}l = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda = \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2$$

$$X(x) = \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right), \quad n \in \mathbb{Z}_{>0}$$

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x),$$

Проверить систему на ортогональность:

$$\int_0^l \sin\left(\frac{\pi n x}{l}\right) \sin\left(\frac{\pi m x}{l}\right) dx = C \cdot \delta_m^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n'' X_n = a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n X_n'' + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\varphi_nX_n(x)\sim\varphi(x)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\psi_nX_n(x)\sim\psi(x)$$

$$\begin{cases} T_n''+a^2\lambda_nT_n=f_n(t)\\ T_n(0)=\varphi_n\\ T_n'(0)=\psi_n \end{cases}$$

$$f_n(t)=\frac{2}{l}\int_0^lf(x,t)\sin\Big(\frac{\pi nx}{l}\Big)dx$$

$$\varphi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\varphi(x)\sin\Big(\frac{\pi nx}{l}\Big)dx$$

$$\psi_n=\frac{2}{l}\int_0^l\psi_n\sin\Big(\frac{\pi nx}{l}\Big)dx$$

$$\{ \, u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x,t)$$



$$\left. \begin{array}{l} u|_{x=0} = \alpha(t) \\ u|_{x=l} = \beta(t) \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} u|_{t=0} = \varphi(t) \\ u_t|_{t=0} = \psi(t) \end{array} \right\}$$

$$u_t|_{t=0}=\psi(t)$$

$$u=v+A(t)x+B(t)$$

$$\mathcal{B}u=\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix},\mathcal{B}v=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$



$$\begin{cases} A(t) \cdot 0 + B(t) = \alpha(t) \\ A(t) \cdot l + B(t) = \beta(t) \end{cases}$$

$$A(t)x + B(t) = \alpha(t) + \frac{x}{l}(\beta(t) - \alpha(t))$$

$$u_t = v_t + A'(t)x + B'(t)$$

$$u_{tt} = v_{tt} + A''(t)x + B''(t)$$

$$u_x = v_x + A(t)$$


$$u_{xx} = v_{xx}$$



$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f(x, t) = -A''x - B'' \\ v|_{x=0} = v|_{x=l} = 0 \\ v|_{t=0} = \varphi' - A(0)x - B(0) \\ v_t|_{t=0} = \psi - A'(0)x - B'(0) \end{cases}$$

**27/02/2025**



$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) - \text{уравнение теплопроводности} \\ u_x|_{x=0} = u_x|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Вспомогательная задача









$$\begin{cases} C = \frac{\beta - \alpha}{l} \\ D = \alpha \end{cases}$$

$$u_{xx} = 0$$

$$u = Cx + D$$

Вспомогательная задача

$$\begin{cases} z_t = a^2 z_{xx}, 0 < x < l, t > 0 \\ z_x|_{x=0} = z_x|_{x=l} = 0 \end{cases}$$

$$z(x, t) = T(t)X(x)$$

$$T'X = a^2TX''$$

$$\frac{T'}{a^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

$$z_x(0, t) = T(t)0 \equiv 0 \Rightarrow X(0) = 0 \Rightarrow X(l) = 0 - \text{противоречие}$$

$$\begin{cases} -X'' - \lambda X = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$$

Что-то про априорную оценку

$$\int_0^l (-X''X - \lambda X^2) dX = 0$$

$$\underbrace{-X'X|_0^l}_{>0} + \underbrace{\int_0^l X'^2 dx}_{\geq 0} - \lambda \underbrace{\int_0^l X^2 dX}_{\geq 0} = 0$$

$$X \not\equiv 0$$

$$1) \lambda = 0 \Rightarrow X \equiv 1 \Rightarrow$$

$$-X'' = 0$$

$$X = Ax + B$$

$$X' = A = 0 \Rightarrow B \neq 0$$

$$1) \lambda > 0$$

$$2) y(x) = A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x$$

$$y'(x) = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}x + B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda}x$$

$$y(0) = B\sqrt{\lambda} = 0, \lambda \neq 0 \Rightarrow B = 0 \Rightarrow A \neq 0$$

$$y'(l) = \underbrace{A\sqrt{\lambda}}_{\neq 0} \underbrace{\sin \sqrt{\lambda}l}_{=0} = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k, \lambda_k = \left(\frac{\pi k}{l}\right)^2, k \in \mathbb{Z}_{>0}$$

$$\begin{cases} \lambda_n = \left(\frac{\pi(n-1)}{l}\right)^2 \\ X_n = \cos\left(\frac{\pi(n-1)x}{l}\right), n \in \mathbb{Z}_{>0} \end{cases}$$

$$n - \frac{1}{2}?$$

$$\alpha X'(l) + \beta X(l) = 0$$

Ищем решение вида  $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} T'_n X_n = a^2 \sum_{n=1}^{\infty} T_n (-\lambda_n X_n) + \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n$$

$$\varphi(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n X_n(x)$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n$$

$$C_n = \frac{(f, X_n)}{(X_n, X_n)}$$

$$\begin{cases} T'_n + a^2 \lambda_n T_n = f_n(t) \\ T_n(0) = \varphi_n, n \in \mathbb{Z}_{>0} \end{cases}$$

Задать вопрос, что делать, если  $f_n$  ЛНЗ с общим решением?

$$\begin{cases} -X'' - \lambda X = 0 \\ X(0) = 0 \\ X'(l) = 0 \end{cases}$$

Дома: доказать, что  $\lambda$  больше 0, и что

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$$

$$X'(x) = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda} x + B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} x$$

$$X(0) = A = 0 \Rightarrow B \neq 0$$

$$X'(l) = B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} l = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} l = \pi \left( n - \frac{1}{2} \right)$$

$$\lambda_n = \left( \frac{\pi \left( n - \frac{1}{2} \right)}{l} \right)^2$$

$$X_n = \sin \left( \frac{\pi \left( n - \frac{1}{2} \right) x}{l} \right)$$

$$X(x) = \sin \sqrt{\lambda} x$$

$$\begin{cases} -X'' - \lambda X = 0 \\ X'(0) = 0 \\ X(l) = 0 \end{cases}$$

$$X(x) = \sin \sqrt{\lambda} (l - x)$$

$$\begin{cases} -X'' - \lambda X = 0 \\ X'(0) = X(2\pi) X'(0) = X'(2\pi) \end{cases}$$

$$X(x + 2\pi k) = X(x)$$

Очевидно, что решение периодическое

Автономное уравнение - уравнение, которое не зависит от  $x$ .

**06/03/2025**

$$-y'' - \lambda y = 0$$

$$\lambda > 0 :$$

$$y = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$$

$$y = \sin \sqrt{\lambda} x$$

Теорема Штурма

“Pasted image 20250306133238.png” не может быть найдена.

$$D : y(0) = y(l) = 0$$

$$N : y'(0) = y'(l) = 0$$

$$\begin{cases} -y'' - \lambda y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(l) + \sigma y(l) = 0 \end{cases}$$

$$\int_0^l (-y'' - \lambda y) dy = -y' y|_0^l + \int_0^l y'^2 dx - \lambda \int_0^l y^2 dx = 0$$

$$\underbrace{\sigma y^2(l)}_{\geq 0} + \underbrace{\int_0^l y'^2 dx}_{\geq 0} - \lambda \underbrace{\int_0^l y^2 dx}_{> 0} = 0 \Rightarrow \lambda > 0 \text{ (если } \lambda \neq 0)$$

$$y(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$$

$$y'(x) = -A\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda} x + B\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} x$$

$$A = 0$$

$$B \neq 0, \text{ пусть } B = 1$$

$$y = \sin \sqrt{\lambda} x$$


$$\sqrt{\lambda} \cos \sqrt{\lambda} l + \sigma \sin \sqrt{\lambda} l = 0$$

$$\sqrt{\lambda} = \mu$$

$$\mu = -\sigma \operatorname{tg} \mu l$$

$$t = \mu l$$

$$\operatorname{tg} t = -\frac{t}{\sigma l}$$



$$\pi \left( n - \frac{1}{2} \right) < t_n < \pi \left( n + \frac{1}{2} \right)$$

$$\lambda < 0 : y = A \operatorname{ch} \sqrt{-\lambda} x + B \operatorname{sh} \sqrt{-\lambda} x$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0, B \neq 0, B = 1$$

$$y = \operatorname{sh} \sqrt{-\lambda} x$$

$$y' = \sqrt{-\lambda} \operatorname{ch} \sqrt{-\lambda} x$$

$$\sqrt{-\lambda} x = z$$

$$z \operatorname{ch} z + \sigma l \operatorname{sh} z = 0$$

$$\operatorname{th} z = -\frac{z}{\sigma l}$$

