

AM 2C – Exame Epoca Especial 2023

Resolução

Felipe B. Pinto 61387 – MIEQB

11 de janeiro de 2024

Conteúdo

Questão 1	2	Questão 8	9
Questão 2	3	Questão 9	10
Questão 3	4	Questão 10	11
Questão 4	5	Questão 11	12
Questão 5	6	Questão 12	13
Questão 6	7	Questão 13	14
Questão 7	8	Questão 14	15

Questão 1

$$\begin{cases} \cos(\pi + t_0) = 1 \\ \sin(\pi + t_0) = 0 \\ \sqrt{3} t_0 = 3 \sqrt{3} \pi \end{cases} \implies t_0 = 3 \pi$$

$$r'(t) = \frac{d \cos(\pi + t)}{dx} \hat{i} \dots$$

Questão 2

- Eq plano tg a sup

$$\nabla F(x, y, z)(x - a, y - b, z - c) = 0$$

Resposta

$$\begin{aligned}\nabla F(x, y, z)(x - a, y - b, z - c) &= \begin{pmatrix} 3x^2 + e^z, \\ 3y^2 \\ (x + 1)e^z \end{pmatrix} (1, -1, 0) = (4, 3, 2) \implies \\ \implies 4(x - 1) + 3(y + 1) + 2z &= 4x + 3y + 2z - 1\end{aligned}$$

Resposta D.

Questão 3

- Conjuntos
- Feixo, aderencia, pontos isolados

Questão 4

Integrais de curva: Parametrizar o segmento e multiplicar pela derivada da parametrização

$$\int_{C,t} f(s) \, ds = \int_a^b f(\phi(t)) \|\phi'(t)\| \, dt$$

$$\phi(t) = A + (B - A) = (0, 0) + ((1, 1) - (0, 0))t = (1, 1)t = (t, t) : t \in [0, 1]$$

$$\implies \int_{C,t} f(s) \, ds = \int_a^b f(\phi(t)) \|\phi'(t)\| \, dt = \int_0^1 f((t, t)) \|(1, 1)\| \, dt = \int_0^1 (t^2 + t) \sqrt{2} \, dt = \frac{\sqrt{2}}{3} (t^3 + 3t^2)$$

Questão 5

- limites direcionais:

Resposta

Q5 a.

B

$$|f(x, y) - 0| = \left| \frac{x y^2}{x^4 + y^2} \right| = \frac{y^2 |x|}{x^4 + y^2} \leq \|(x, y)\| \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x y^2}{x^4 + y^2} &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos(\theta) (r \sin(\theta))^2}{(r \cos(\theta))^4 + (r \sin(\theta))^2} = \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \cos(\theta) \sin^2(\theta)}{r^2 \cos^4(\theta) + \sin^2(\theta)} = \frac{0}{0 + \sin^2(\theta)} = 0 \end{aligned}$$

$\therefore f$ é continua em $(0, 0)$

Questão 6

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{3(y-1) \exp(-(x-1)^2)}{\sqrt{x-1}^2 + (y-1)^2}$$

Resposta

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{3(y-1) \exp(-(x-1)^2)}{\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1, y = m(x-1)+1} \frac{3(m(x-1) + 1 - 1) \exp(-(x-1)^2)}{\sqrt{(x-1)^2 + (m(x-1) + 1 - 1)^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1, y = m(x-1)+1} \frac{3(m(x-1)) \exp(-(x-1)^2)}{\sqrt{(m^2 + 1)(x-1)^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1, y = m(x-1)+1} \frac{3m \exp(-(x-1)^2)}{\frac{|x-1|}{x-1} \sqrt{(m^2 + 1)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1, y = m(x-1)+1} \frac{3m \exp(-(x-1)^2)}{\frac{|x-1|}{x-1} \sqrt{(m^2 + 1)}} \implies \\ &\implies \lim_{x \rightarrow 1^+, y = m(x-1)+1} \frac{3m \exp(-(x-1)^2)}{\frac{|x-1|}{x-1} \sqrt{(m^2 + 1)}} = \frac{3m \exp(0)}{\sqrt{(m^2 + 1)}} = \frac{3m}{\sqrt{(m^2 + 1)}}; \\ &\lim_{x \rightarrow 1^-, y = m(x-1)+1} \frac{3m \exp(-(x-1)^2)}{\frac{|x-1|}{x-1} \sqrt{(m^2 + 1)}} = \frac{3m \exp(0)}{-\sqrt{(m^2 + 1)}} = \frac{3m}{-\sqrt{(m^2 + 1)}} \end{aligned}$$

Questão 7

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x y^2}{x^4 + y^2} & : (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & : (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h \cdot 0^2}{h^4 + 0^2}}{h} = 0;$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot k^2}{0^4 + k^2}}{k} = 0;$$

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}} f(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + t/\sqrt{2}, 0 + t/\sqrt{2}) - f(0, 0)}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{(t/\sqrt{2}) \cdot (t/\sqrt{2})^2}{(t/\sqrt{2})^4 + (t/\sqrt{2})^2}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1/2 \sqrt{2}}{t^2/4 + 1/2} = \frac{1/2 \sqrt{2}}{1/2} = 1/\sqrt{2} \end{aligned}$$

Questão 8

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; C^1 \in \mathbb{R}^2 : \nabla f(1/2, 0) = (-1, 1)$$

$$H(x, y) = f\left(\frac{\sin y}{1+x^2}, x + \cos(2y)\right)$$

Resposta

$$H(x, y) = f\left(\frac{\sin y}{1+x^2}, x + \cos(2y)\right) = f(\phi(x, y), \rho(x, y));$$

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dx}(1, \pi/2) &= \frac{df}{d\phi(x, y)}\left(\frac{\sin \pi/2}{1+1^2}, 1 + \cos(2\pi/2)\right) \frac{d\phi}{dx}(1, \pi/2) = \\ &= -1 \frac{\sin \pi/2}{(1+1^2)^2} 2(1+1^2) = -1;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dx}(1, \pi/2) &= \frac{df}{dx}\left(\frac{\sin \pi/2}{1+1^2}, 1 + \cos(2\pi/2)\right) \frac{d\frac{\sin y}{1+x^2}}{dx}(1, \pi/2) = \\ &= \frac{df}{dx}\left(\frac{1}{2}, 0\right) \frac{\sin \pi/2}{(1+1^2)^2} 2 * 1 = \frac{df}{dx}\left(\frac{1}{2}, 0\right) \frac{\sin \pi/2}{(1+1^2)^2} 2 * 1 = -2\end{aligned}$$

Questão 9

Seja $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^2 em \mathbb{R} tal que $\varphi'(0) = 5$, $\varphi''(0) = -1$. Considere $u(x, t) = \varphi(x^2 - 2t)$. Tem-se:

Resposta

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(2, 2) &= \frac{\partial^2(\varphi(x^2 - 2t))}{\partial x^2}(2, 2) = \frac{\partial(\varphi'(x^2 - 2t) 2x)}{\partial x}(2, 2) = \\ &= 2 \left(\varphi''(2^2 - 2 * 2) 2 + \varphi'(2^2 - 2 * 2) \right) = \\ &= 2 (-1 * 2 + 5) = 6\end{aligned}$$

Questão 10

Seja

$$\int_0^2 \int_y^2 \exp(x^2) \, dx \, dy$$

Tem-se:

Sugestão: Troque a ordem de integração

Resposta

$$\begin{cases} y \in [0, 2] \\ x \in [y, 2] \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} y \in [0, x] \\ x \in [0, 2] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_y^2 \exp(x^2) \, dx \, dy &= \int_0^2 \int_0^x \exp(x^2) \, dy \, dx = \int_0^2 \exp(x^2) (x - 0) \, dx = \\ &= \int_0^2 \exp(x^2) x \, dx = (\exp(x^2)/2) \Big|_0^2 = (\exp(4) - 1)/2 \end{aligned}$$

Questão 11

A equação

$$\exp(xz) + y \sin x - y^2 + z^3 + 2x = 2\pi$$

define implicitamente x como função de y e z numa vizinhança do ponto $(x_0, y_0, z_0) = (\pi, 1, 0)$. Para essa função tem-se:

Resposta

$$\frac{\partial x}{\partial y}(1, 0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\pi, 1, 0)}{\frac{\partial f}{\partial x}(\pi, 1, 0)} = -\frac{\sin(\pi) - 2 * 1}{\exp(\pi * 0) 0 + 1 \cos \pi + 2} = 2$$

Questão 12

Considere a função

$$f(x, y) = y^4/2 - x y^2 + x^2 - 4 x$$

Escolha a afirmativa correta

Resposta

$$\begin{aligned}\det H_f &= \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2y \\ -2y & 6y^2 - x \end{vmatrix} = \\ &= 12y^2 - 4x + 4y^2 = 16y^2 - 4x;\end{aligned}$$

$$\det H_f(4, -2) = 16(-2)^2 - 4 * 4 = 48$$

\therefore Crítico mínimo Local;

$$\det H_f(2, 0) = 16(0)^2 - 4 * 2 = -8$$

\therefore Ponto de sela

Questão 13

Considere a superfície

$$\rho = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{3} x, (x, y) \in [0, 1] \times [0, 2] \right\}$$

orientada com a terceira componente do campo vetorial normal não negativa, e o campo vetorial

$$\vec{F}(x, y, z) = -3 \left(x^2 + \sqrt{z^2} 4 \hat{j} \right)$$

Seja \mathcal{L} o bordo de σ orientado positivamente de acordo com σ . O valor do integral curvilíneo

$$\int_{\mathcal{L}} -\frac{z^3}{4} dx + x^3 dz$$

body

Questão 14

Seja $f(x, y)$ uma função contínua em \mathbb{R}^2 . Considere a igualdade

$$\iint_{\mathcal{R}} f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy$$

Tem se:

Resposta

$$\begin{cases} x = \sqrt{2 - y^2} \implies |y| = \sqrt{2 - x^2} \\ x = y^2 \implies \sqrt{x} = |y| \end{cases}$$

Integra com

$$\int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy =$$