

AM3C – Teste 2024.1 Resolução

Felipe B. Pinto 71951 – EQB

10 de janeiro de 2025

Conteúdo

Grupo I	–	3	Questão 5	7
Questão 1	3	Grupo II	–	9
Questão 2	4	Grupo III	–	12
Questão 3	5	Grupo IV	–	15
Questão 4	6	Grupo V	–	17

Grupo I

Questão 1

A equação diferencial linear de primeira ordem

$$\frac{dy}{dx} + \frac{\cos(x)}{\sin(x)} y = -x; \quad x \in]0, \pi[$$

Tem como solução geral

$$\blacksquare y = \frac{c}{\sin x} - x \frac{\cos x}{\sin x} + 1$$

$$\square y = \frac{c}{\sin x} + x \frac{\sin x}{\cos x} - 1$$

$$\square y = \frac{c}{\sin x} - x \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\square y = \frac{c}{\cos x} - x \frac{\cos x}{\sin x} + 1$$

$$\square y = \frac{c}{\cos x} + x \frac{\cos x}{\sin x} - 1$$

$$\square y = \frac{c}{\cos x} + x \frac{\sin x}{\cos x}$$

Resposta (1.1)

General solution

$$\begin{aligned} y &= \frac{c_0}{\varphi(x)} + \frac{1}{\varphi(x)} P_x(-x \varphi(x)) = \\ & \hspace{15em} \text{using (1.2) (1.3)} \\ &= \frac{c_0}{c_1 \sin x} + \frac{1}{c_1 \sin x} (-c_1 (x \cos x - (c_2 + \sin x))) = \\ &= \frac{c_0}{c_1 \sin x} + \frac{c_2}{\sin x} - x \frac{\cos x}{\sin x} + 1 = \frac{c_4}{\sin x} - x \frac{\cos x}{\sin x} + 1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

Finding $\varphi(x)$

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \exp \left(P_x \left(\frac{\cos x}{\sin x} dx \right) \right) = \\ & \hspace{15em} d(\sin x) = \cos x dx \\ &= \exp \left(\int \left(\frac{d(\sin x)}{\sin x} \right) \right) = \exp (c_0 + \ln (\sin x)) = c_1 \sin x \end{aligned} \quad (1.2)$$

Integrating

$$\begin{aligned} P_x(-x \varphi(x)) &= \\ & \hspace{15em} \text{using (1.2)} \\ &= P_x(-x c_1 \sin x) = \\ & \hspace{10em} P_x(u v') = u v - P_x(u' v) \begin{cases} u = x \\ v = \cos x \end{cases} \\ &= x \cos x - P_x(\cos x) = -c_1 (x \cos x - (c_2 + \sin x)) \end{aligned} \quad (1.3)$$

Questão 2

A solução da equação de Bernoulli

$$\frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y}$$

que satisfaz a condição $y(0) = 2$, é:

- ☐ $y = \sqrt{e^{+2x} + 3}$
- ☐ $y = \sqrt{3e^{+2x} + 1}$
- ☐ $y = \sqrt{2e^{+2x} + 2}$
- ☐ $y = \sqrt{e^{-2x} + 3}$
- ☒ $y = \sqrt{3e^{-2x} + 1}$
- ☐ $y = \sqrt{2e^{-2x} + 2}$

Resposta (1.6)

General solution

$$y = z^{1/2} = \tag{1.4}$$
$$= \left(\frac{c_0}{\varphi(x)} + \frac{1}{\varphi(x)} \text{P}_x(2 * 1 \varphi(x)) \right)^{1/2} =$$

using (1.8) (1.9)

$$= \left(\frac{c_0}{c_1 e^{2x}} + \frac{1}{c_1 e^{2x}} c_1 e^{2x} \right)^{1/2} = \left(\frac{c_0}{c_1 e^{2x}} + 1 \right)^{1/2} = (c_2 e^{-2x} + 1)^{1/2} = \tag{1.5}$$

using (1.7)

$$= (3 e^{-2x} + 1)^{1/2} \tag{1.6}$$

Finding c_2

$$y(0) = 2 =$$

using (1.5)

$$= (c_2 e^{-2*0} + 1)^{1/2} \implies c_2 = 4 - 1 = 3 \tag{1.7}$$

Bernoulli's substitution

$$y' + y = y^{-1} \implies$$

using (1.4)

$$\implies z' + 2z = 2$$

Finding $\varphi(x)$

$$\varphi(x) = \exp(\text{P}_x(2)) = c_1 e^{2x} \tag{1.8}$$

Integrating

$$\text{P}_x(2 * 1 \varphi(x)) =$$

using (1.8)

$$= 2 c_1 e^{2x} / 2 = c_1 e^{2x} \tag{1.9}$$

Questão 3

A equação diferencial

$$(5x y^2 - 2y) dx + (3x^2 y - x) dy = 0$$

Admite um fator integrante na forma $\phi(x, y) = x^m y^n$, com $m, n \in \mathbb{N}$. Então:

☐ $m = 3, n = 2$

☐ $m = 2, n = 2$

☐ $m = 1, n = 3$

☐ $m = 1, n = 1$

☐ $m = 2, n = 1$

☒ $m = 3, n = 1$

Resposta (1.10)

Finding m, n

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} \varphi(x) &= \frac{\partial}{\partial y} (x^m y^n (5x y^2 - 2y)) = \frac{\partial}{\partial y} (5x^{m+1} y^{n+2} - 2y^{n+1} x^m) = \\ &= 5x^{m+1} (n+2) y^{n+1} - 2(n+1) y^n x^m = \\ &= \frac{\partial v}{\partial x} \varphi(x) = \frac{\partial}{\partial x} (x^m y^n (3x^2 y - x)) = \frac{\partial}{\partial x} (3x^{2+m} y^{n+1} - x^{m+1} y^n) = \\ &= 3(2+m) x^{1+m} y^{n+1} - (m+1) x^m y^n \implies \\ &\implies \begin{cases} 2(n+1) = m+1 \implies m = 2n+1 = 3 \\ 5(n+2) = 3(m+2) \implies n = 1 \end{cases} \end{aligned} \tag{1.10}$$

Questão 4

A equação diferencial linear homogénea

$$x y'' + x^2 y' + 4 y = 0, \quad x > 0$$

Tem como solução geral a função $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$. Então a equação não homogénea

$$x y'' + x^2 y' + 4 y = x^3$$

admite como solução geral a função $y(x) = c_1(x) y_1(x) + c_2(x) y_2(x)$, onde as funções $c_1(x), c_2(x)$ são determinadas a partir do sistema

$$\begin{array}{ll} \blacksquare \begin{cases} c_1'(x) y_1 + c_2'(x) y_2 = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' = x^2 \end{cases} & \square \begin{cases} c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2 = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' = x^2 \end{cases} \\ \square \begin{cases} c_1'(x) y_1 + c_2'(x) y_2 = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' = x \end{cases} & \square \begin{cases} c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2 = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' = x \end{cases} \\ \square \begin{cases} c_1'(x) y_1 + c_2'(x) y_2 = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' = 1 \end{cases} & \square \begin{cases} c_1(x) y_1 + c_2(x) y_2 = 0 \\ c_1'(x) y_1' + c_2'(x) y_2' = 1 \end{cases} \end{array}$$

Resposta (1.11)

Crammers equation system

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1'(x) D_x^0 y_1(x) + c_2'(x) D_x^0 y_2(x) = 0 \\ c_1'(x) D_x y_1(x) + c_2'(x) D_x y_2(x) = \frac{x^3}{x} = x^2 \end{array} \right\} \quad (1.11)$$

Questão 5

Acerca de uma função $f(x)$ definida e com derivadas até à segunda ordem em \mathbb{R}_0^+ sabe-se que admite transformada de Laplace $F(s)$, que $f(0) = 1$, $f'(0) = -2$. Então a transformada de Laplace da função

$$e^{-t} f''(t) + t f'(t)$$

é:

$$\square (s+1)^2 F(s+1) - s + 2 + s F'(s)$$

$$\square s^2 F(s) - s + 1 + s F'(s) - F(s)$$

$$\square (s+1)^2 F(s+1) - s + 1 - s F'(s) - F(s) \quad \square s^2 F(s) - s + 1 + s F'(s+1) - F(s+1)$$

$$\square (s+1)^2 F(s+1) - s + 1 + s F'(s) + F(s) \quad \square s^2 F(s) - s + 1 + s F'(s+1) + F(s+1)$$

Resposta

$$(s+1)^2 F(s+1) - s + 1 - s F'(s) - F(s)$$

Grupo II

Determine a solução geral da equação diferencial linear homogénea e de coeficientes constantes

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - y = 0$$

Resposta

Resposta (2.12)

General solution for y

$$y =$$
$$= e^{+2x} c_0 + e^{-3x} c_1$$

using (2.13)
(2.12)

Mapping roots of (2.14) to solution

$$\begin{cases} r_0 = +2 \implies e^{+2x} c_0; \\ r_1 = -3 \implies e^{-3x} c_1 \end{cases}$$

(2.13)

Roots for characteristic equation for y

$$P = D_x^2 + D_x - 6 \implies$$
$$\implies r^2 + r - 6 = 0 \implies r = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 * -6}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2} \implies$$
$$\implies \begin{cases} r_0 = +2 \\ r_1 = -3 \end{cases}$$

$$D_x^i \rightarrow r^i$$

(2.14)

Grupo III

Q1 a.

Determine todas as soluções da equação de Clairaut

$$y = x \frac{dy}{dx} - \left(\frac{dy}{dx} \right)^3$$

Q1 b.

Utilizando a mudança de variável definida por $x = 1/t$, resolva a equação

$$y' = -x \frac{dy}{dx} + x^6 \left(\frac{dy}{dx} \right)^3, \quad x > 0$$

Sug: Após a mudança de variável utilize (Q1 a.).

Grupo IV

Utilize a transformada de Laplace para resolver o problema de valores iniciais

$$y'' + y' + y \, 5/2 = \delta(t - 2), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

Sug: tenha em conta que $s^2 + s + 5/2 = (s + 1/2)^2 + 9/4$.

Grupo V

Considere a equação diferencial linear de ordem n e coeficientes constantes

$$\left(D_x^n + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k D_x^k \right) y = e^{\alpha x}, \alpha \in \mathbb{R} \quad (5.25)$$

Seja $P(r) = r^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k r^k$. admitimos que $r = \alpha$ é raiz da equação $P(r) = 0$ com grau de multiplicidade um. Justifique $P'(\alpha) \neq 0$.

A equação (5.25) tem uma solução particular da forma

$$\bar{y} = \frac{c}{2P'(\alpha)} x e^{\alpha x}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Sabendo que

$$D_x^k (x e^{\alpha x}) = k \alpha^{k-1} e^{\alpha x} + \alpha^k x e^{\alpha x}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad D_x^k = \frac{d^k}{dx^k}$$

Determine, justificando detalhadamente, o valor de c .