

# CN A – Areas?

Felipe B. Pinto 61387 – MIEQB

16 de outubro de 2023

## Conteúdo

Questão 1	. . . . .	2	Questão 8	. . . . .	5
Exemplo 1	. . . . .	3	Questão 11	. . . . .	6
Questão 2	. . . . .	4	Questão 13	. . . . .	7

## Questão 1

$$I = \int_{\pi/6}^{\pi/2} e^{\sin x} \, dx$$

---

---

Resposta

Q1 a.

---

---

Resposta

$$g(x) = e^{\sin(x)}; \hat{I} = h g((a+b)/2) = \frac{I}{3} g(\pi/3) = \pi/3 e^{\sin(\pi/3)} \approx 2.489652;$$

$$|\varepsilon| = \left| \frac{h^3}{24} g''(\gamma) \right| \leq \left| \frac{(\pi/3)^3}{24} e \right| \leq |0.0130068|, \gamma \in ]\pi/6, \pi/2[;$$

$$g'(x) = \cos(x) e^{\sin x}$$

$$g''(x) = -\sin(x) e^{\sin x} + \cos^2(x) e^{\sin x} = e^{\sin x} (\cos^2(x) - \sin^2(x))$$

Q1 b.

Repita as regras mas para o ponto médio de Simpson

# Exemplo 1

$$I = \int_1^2 \ln x \, dx$$

---

Resposta

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{h}{3} (g(a) + 4g((a+b)/2) + g(b)) = \frac{\frac{b-a}{2}}{3} (g(a) + 4g((a+b)/2) + g(b)) = \\ &= \frac{\frac{2-1}{2}}{3} (g(1) + 4g((1+2)/2) + g(2)) = \frac{1}{6} (0 + 4(0.405465) + (0.693147)) \approx \\ &\approx 0.385835;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|E| &= \left| -\frac{h^2}{90} \frac{d^4 g(\gamma)}{dx^4} \right| = \left| -\frac{h^2}{90} \frac{d^4 \ln(\gamma)}{dx^4} \right| = \left| -\frac{h^2}{90} \frac{d^3 1/\gamma}{dx^3} \right| = \left| -\frac{h^2}{90} \frac{d^2 - 1/\gamma^2}{dx^2} \right| = \\ &= \left| -\frac{h^2}{90} \frac{d2/\gamma^3}{dx} \right| = \left| -\frac{h^2}{90} (-6/\gamma^4) \right| \leq \left| -\frac{1/4}{90} 6 \right| \leq 0.002084\end{aligned}$$

## Questão 2

Considere o Integral

$$I = \int_{0.7}^{1.7} \pi^x \, dx$$

Q2 a.

Determina uma aproximação  $\hat{I}$ , de  $I$  utilizando a regra dos trapézios compostos com  $h = 0.25$ .  
Obtenha um majorante do erro absoluto cometido no cálculo do valor aproximado  $\hat{I}$

Nota: Nos cálculos intermédios utilize 6 casas decimais, devidamente arredondadas.

Resposta

$$h = \frac{b-a}{2n} \implies n = \frac{b-a}{2h} = \frac{1}{2 * 0.25} = 2 \implies$$

$$\begin{aligned} \implies I_{S,2} &= \frac{h}{3} (f_{(x_0)} + 4(f_{(x_1)} + f_{(x_3)}) + 2f_{(x_2)} + f_{(x_4)}) = \\ &= \frac{0.25}{3} (\pi^{0.7} + 4(\pi^{.95} + \pi^{1.45}) + 2\pi^{1.2} + \pi^{1.7}) \implies \end{aligned}$$

$$\implies |I - I_{S,2}| \leq n \frac{h^5}{90} M_4 = 2 \frac{0.25^5}{90} * 12.021728 \cong 260.89 \text{ E}-6$$

Q2 b.

Repita a alínea anterior para a regra de Simpson.

Q2 c.

Quantos subintervalos teria que considerar se pretendesse calcular um valor aproximado de  $I$  com um erro inferior a  $10^{-6}$  usando

(i) A regra do ponto médio

(ii) A regra dos trapézios.

(iii) A regra de Simpson.

## Questão 8

$$I = \int_0^4 f(x) \, dx, \quad f(x) \in C^n([0, 4])$$
$$\left| f_{(x)}^n \right| \leq \frac{2^n}{n!} \quad \forall x \in [0, 4] \wedge n \in \mathbb{N}$$

---

---

Resposta

$$\begin{aligned} \left| I - \hat{I}_S \right| &\leq \left| -n \frac{h^5}{90} f_{(\theta)}^4 \right| \leq \left| -n \frac{\left( \frac{b-a}{2n} \right)^5}{90} \frac{2^4}{4!} \right| = \\ &= n \frac{\left( \frac{4-0}{2n} \right)^5}{90} \frac{2^4}{4!} = \frac{4^4}{2 * n^4 * 3! * 90} \leq 0.5 \text{ E } -4 \implies \\ &\implies n = \lceil 8.2978 \rceil = 9 \end{aligned}$$

$\therefore$  18 Numero de aplicações da regra de Simpson

## Questão 11

Seja

$$I = \int_1^5 f(x) \, dx$$

Considere a seguinte tabela da função  $f$ , função polinomial de grau 2, da qual se sabe que  $f''(x) = 4$ :

$x$	1	2	3	4	5
$f(x)$	-2	-1	1	$\alpha$	9

Q11 a.

Recorrendo à regra dos trapézios, com duas aplicações, determine um valor aproximado de  $I$  e o valor exato de  $I$ .

Q11 b.

Recorrendo à regra do ponto médio, com  $n = 2$ , determine um valor aproximado de  $I$  e o valor de  $I$  como função de  $\alpha$ .

Q11 c.

Recorrendo às alíneas anteriores, determine o valor de  $\alpha$ .

Q11 d.

Utilize duas aplicações da regra de Simpson para determinar um valor aproximado de  $I$ .

## Questão 13

Cosidere a seguinte tabela para a função  $f$ :

$x$	$-3$	$-2$	$-1$	$0$	$1$	$2$	$3$
$f(x)$	$40$	$21$	$8$	$1$	$0$	$5$	$16$

Resposta

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-(-3)}{n} < 3 \implies n > 2 \wedge n < 4 \implies n \in ]2, 4[$$

Q13 a.

Utilizando a regra dos trapézios composta, obtenha uma aproximação de  $\hat{I}_T$  de

$$I = \int_{-3}^3 f(x) \, dx, \quad h < 3 \wedge n < 4$$

Resposta

$$\hat{I}_T = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2 f(x_2) + 2 f(x_4) + f(x_6)) = 72$$

Q13 b.

Resposta

$$\begin{aligned} \hat{I}_{pm} &= 2 \left( f\left(\frac{-1+x_0}{2}\right) + f\left(\frac{-1+x_4}{2}\right) + f\left(\frac{-1+x_6}{2}\right) \right) = \\ &= 2 (f_{(-3)} + f_{(0)} + f_{(3)}) = 54 \end{aligned}$$

Q13 c.

Resposta

$$\begin{aligned} I - \hat{I}_{pm} &= n \frac{h^3}{24} f''(\theta) = 3 \frac{2^3}{24} k = 6 \implies \\ \implies k &= 6 \end{aligned}$$

$$I - \hat{I}_T = -n \frac{h^3}{12} f''(\theta) = -3 \frac{2^3}{12} k = -3 \frac{2^3}{12} 6 = -12$$