

title here

Felipe B. Pinto 61387 - MIEQB

8 de outubro de 2022

Conteúdo

III Ficha Formativa	2	Questão 2	10
Questão 1	2	VI Ficha Formativa	11
Questão 2	6	Questão 1	11
Questão 3	7	VII Espaços Vetoriais	14
IV Ficha Formativa	8	Questão 1	14
Questão 1	8	Questão 2	15

III – Ficha Formativa

Questão 1

Q1.1)

(i) A

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{l_3 += l_1 \\ l_4 += -l_1 \\ l_2 += l_4 \\ l_3 += 2l_4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\therefore \exists A^{-1}$

(ii) M

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{l_3 += l_2 \\ l_1 += -2l_2}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$\therefore \nexists M^{-1}$

(iii) N

$$N \in \mathcal{M}_{3 \times 4} \therefore \nexists N^{-1}$$

(iv) P

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{l_3 += -l_1 l_2 += -l_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore \exists P^{-1}$

(v) Q

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{l_1 += -2l_2 l_3 += -l_2 l_2 += -l_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\therefore \exists Q^{-1}$

Q1.2)

Pelas mesmas razões que a): A, P, Q.

Q1.3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} l_3 += l_1 \\ l_4 += -l_1 \\ l_2 += l_4 \\ l_3 += 2l_4 \\ l_3 += -2l_2 \\ l_2 += 3l_3 \\ l_4 += l_3 - l_2 \\ l_1 += -l_2 + l_4 \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

$$\therefore X = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Q1.4)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[l_3 += -l_2]{l_3 += l_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right]$$

$$\implies r(N) = r(N|C) < 4$$

\therefore Sistema possível indeterminado com grau de indeterminação 1

Questão 2

$$A_{(\alpha)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & \alpha \\ 3 & 1 & 2\alpha \end{bmatrix} : \alpha \in \mathbb{R}$$

Q2.1)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & \alpha \\ 3 & 1 & 2\alpha \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{l_3 += -2l_2 \\ l_3 += l_1 \\ l_2 += -2l_1 + l_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \alpha - 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \alpha \neq 1$$

Q2.2)

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{l_2 += -2l_1 \\ l_3 += -3l_1 \\ l_3 += -l_2 \\ l_1 += -l_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Questão 3

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & \alpha & 2 \\ 0 & 1 & \beta & \alpha - 2 & \beta \\ 4 & \beta & 0 & 4 & \alpha - 4 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & \alpha & 2 \\ 0 & 1 & \beta & \alpha - 2 & \beta \\ 4 & \beta & 0 & 4 & \alpha - 4 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} l_4 += -4l_1 \\ l_3 += -l_2 \\ l_2 += -2l_1 \\ l_3 += 2l_1 \\ l_3 \rightarrow l_3/\beta \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \alpha - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & \beta & 0 & 0 & \alpha \end{array} \right]$$

IV – Ficha Formativa

Questão 1

Q1.1)

(i) A

$$= -\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ +1\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ -1\det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 10 \\ +(9 - 2) \\ -(15 - 2) \end{pmatrix} = -10$$

(ii) D

$$= \begin{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix} \\ -\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix} \\ -2 \det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix} \\ -\det \begin{pmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 * (6 * 6 - 2 * 4) \\ -3 * 6 - 5 * 4 \\ +3 * 2 - 5 * 6 \end{pmatrix} \\ - \begin{pmatrix} 6 * 6 - 2 * 4 \\ -3 * 6 - 5 * 4 \\ +3 * 2 - 5 * 6 \end{pmatrix} \\ - \begin{pmatrix} 3 * 6 - 5 * 4 \\ -3 * (3 * 6 - 5 * 4) \\ +3 * 5 - 5 * 3 \end{pmatrix} \\ - \begin{pmatrix} 3 * 2 - 5 * 6 \\ -3 * (3 * 2 - 5 * 6) \\ +3 * 5 - 3 * 5 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = 4$$

(iii) E

$$= 7 * 2 * -1 * -2 = 28$$

(iv) C

$$= -\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2 * 1 = -2$$

Q1.6)

$$= -\det \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

Questão 2

Q2.1)

$$= 15 * (-1) * (1/5) = -3$$

Q2.2)

$$= -\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = -(1 - (-3)) = -4$$

Q2.3)

$$= \det \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

Q2.4)

$$\alpha = \frac{\det B}{\det A} = \frac{4 \det B(1|1)}{3 \det A(1|1)} = 4/3$$

VI – Ficha Formativa

Questão 1

$$\left. \begin{array}{l} u_1 = (1, 1, 0, 1) \\ u_2 = (0, 0, 1, 0) \\ u_3 = (1, 0, 1, 0) \end{array} \right\} \in \mathbb{R}^4$$

$$\mathcal{B} = ((0, 1, 0, 0), (0, 0, -2, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 2))$$

$$\mathcal{B}' = ((2, 2, -4, 1), (0, 0, 1, 0), (0, -1, 2, 1), (0, 0, 2, -3))$$

Q1.1)

$$y(w) : (x, y, z, w) \in \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \implies \alpha_3 = y \wedge \alpha_3 = w \implies y = w$$

Q1.2)

$t : (u_1, u_2, u_3, (1, 0, 3, t))$ é base de \mathbb{R}^4

$$t : r \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & t \end{bmatrix} \right) = 4; \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & t \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{l_4 += -l_2 \\ l_1 += -l_4/t - l_2 \\ l_3 += -l_1 - l_4 3/t}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

Q1.3)

$v \in \mathbb{R}^4 : (u_1, u_2, u_3, v)$ é base de $\mathbb{R}^4 \wedge$
 $\wedge \langle u_1, u_2, u_3, v \rangle (3, 0, -1, -1) = (2, -1, 1, -1)$

$$v = (v_1, v_2, v_3, v_4) \wedge \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & v_1 \\ 1 & 0 & 0 & v_2 \\ 0 & 1 & 0 & v_3 \\ 0 & 0 & 0 & v_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v = \begin{bmatrix} -1 - 2 \\ 3 + 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = (-3, 4, -1, 1)$$

Q1.4)

$$x : \mathcal{B}'v = x \wedge \mathcal{B}v = (0, 4, 4, 1)$$

$$\begin{aligned}
 x = \mathcal{B}'\mathcal{B}^{-1}(0, 4, 4, 1) &= \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \frac{\text{adj } \mathcal{B}}{\det \mathcal{B}} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \left(\left(1 * (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 4 & 0 & -4 & 0 \\ -4 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \right) \\
 \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4/4 & 0 & 4/4 & 0 \\ 4/4 & 0 & -8/4 & 0 \\ 0 & 2/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \\ 2 \\ -2/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -33/2 \\ 2 \\ 23/2 \\ 11/2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

VII – Espaços Vetoriais

Questão 1

$\{F, G\}$ subespaços \mathbb{R}^4 :

$$F = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a = b + c \wedge d - 2a = 0\} \wedge$$

$$G = \langle (1, 1, 1, 1), (1, 0, 2, 3), (0, 0, 0, 1) \rangle$$

$$S_1 = ((1, 1, 1, 1))$$

$$S_2 = ((0, 1, -1, 0))$$

$$S_3 = ((1, 1, 0, 2), (1, 0, 1, 2))$$

$$S_4 = ((0, -1, 1, 0), (1, 2, -1, 2)),$$

$$S_5 = ((1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 2))$$

$$S_6 = ((1, 1, 0, 2), (1, 0, 1, 2), (1, 2, -1, 2))$$

$$S_7 = ((1, 0, 2, 3), (1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 1))$$

$$S_8 = ((1, 1, 0, 2), (1, 0, 1, 2), (1, 0, 2, 3), (0, 0, 0, 1))$$

$$S_9 = ((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$$

$$S_{10} = ((1, 1, 0, 2), (1, 0, 1, 2), (1, 0, 2, 3), (1, 1, 1, 1), (0, 0, 0, 1))$$

Q1.1)

$$\begin{aligned} i : S_i \text{ gera } F \wedge F &= \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a = b + c \wedge d - 2a = 0\} = \\ &= \{(b + c, b, c, 2a) : \{a, b, c\} \in \mathbb{R}\} = \\ &= \langle (0, 0, 0, 2), (1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0) \rangle = \\ &= \langle (1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 2) \rangle = \langle S_5 \rangle \\ \therefore i &= \{5\} \end{aligned}$$

Questão 2

$$\begin{aligned}
 i : S_i \text{ base de } F \wedge F &\leq \left\langle \begin{array}{c} (1, 0, 0, 0), \\ (0, 1, 0, 0), \\ (0, 0, 1, 0), \\ (0, 0, 0, 1) \end{array} \right\rangle \wedge \\
 \wedge F &\leq \langle (1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 2) \rangle \wedge \\
 \wedge F &\leq \langle (1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 2) \rangle
 \end{aligned}$$