


CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

BIOLOGIA - LISTA 6


Citatana	Endfortune.	Page and	L		Citata I	0	Citata I	Tto out on a
Sistema	Endócrino:	roco em	normonios	sexuais.	CICIO (Ovariano e	CICIO	Uterino

Aluno:									
SÉRIF:	CURSO:	DATA:							

1. O gráfico abaixo representa as variações nos níveis de dois importantes hormônios relacionados com o ciclo menstrual na espécie humana. Que fenômenos ocorrem, respectivamente, nos momentos 1 e 2 do ciclo?




- a) Fecundação e ovulação.
- b) Ovulação e menstruação.
- c) Ovulogênese e menstruação.
- d) Menstruação e ovulação.
- e) Ovulogênese e ovulação.
- 2. O gráfico mostra os níveis dos hormônios progestacionais (progesterona) no sangue de uma mulher num período de 90 dias. Que fato deve estar associado à queda do nível de hormônio por volta do 90° dia ?



- a) Ovulação.
- b) Fecundação.
- c) Menopausa.
- d) Puberdade.
- e) Aborto.
- 3. Sabemos que o período entre o início de uma menstruação e o início de outra é chamado de ciclo menstrual. Esse ciclo é controlado pelo aumento e diminuição de alguns hormônios. Marque a alternativa em que aparecem os hormônios hipofisários relacionados ao ciclo menstrual:
- a) FSH e LH. b) LH e GH. c) Progesterona e LH. d) Estrogênio e Progesterona.
- 4. A menstruação é um processo em que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação, junto ao sangue, através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis:
- a) de LH aumentam e FSH diminuem.
- b) de LH e FSH aumentam.
- c) de progesterona e estrógeno diminuem.
- d) de progesterona e estrógeno aumentam.
- e) de progesterona aumentam e estrógeno diminuem.

- 1) LETRA B) Ovulação e Menstruação
- 2) LETRA E)ABORTO
- 3) LETRAA) FSH e LH
- 4) LETRA C) de progesterona e estrógeno diminuem.

5. H1 e H2 representados na figura só podem ser:



- a) Os hormônios produzidos na hipófise, estrógeno e progesterona.
- b) Os hormônios produzidos nos ovários FSH e LH.
- c) Os hormônios que atuam sobre células ovarianas, estrógeno e progesterona.
- d) Os hormônios FSH e LH, que atuam sobre o folículo e sobre o ovócito II, respectivamente.
- e) O LH e o FSH, respectivamente.
- 6. Uma mulher, por volta do terceiro dia do ciclo menstrual, foi submetida a uma cirurgia para retirada dos ovários. Alguns dias após a cirurgia, espera-se encontrar no sangue dessa mulher.
- a) alta concentração de estrógeno e baixa concentração de progesterona.
- b) alta concentração de FSH e baixa concentração de estrógeno.
- c) alta concentração de LH e baixa concentração de FSH.
- d) baixa concentração de FSH e alta concentração de estrógeno.
- e) baixa concentração de progesterona e alta concentração de LH.
- 7. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio encontrava-se num nível muito abaixo do normal esperado. Imediatamente buscou ajuda médica, pedindo a reversão da vasectomia a que se submetera havia dois anos. A vasectomia consiste no seccionamento dos ductos deferentes presentes nos testículos. Diante disso, o pedido do homem:
- a) não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por glândulas situadas acima dos ductos, próximo à próstata.
- b) não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos espermatozoides dos testículos para o pênis.
- c) tem fundamento, pois a secção dos ductos deferentes impede o transporte da testosterona dos testículos para o restante do corpo.
- d) tem fundamento, pois a produção da testosterona ocorre nos ductos deferentes e, com seu seccionamento, essa produção cessa.
- e) tem fundamento, pois a testosterona é produzida no epidídimo e dali é transportada pelos ductos deferentes para o restante do corpo.

- 5) LETRA D) Os hormônios FSH e LH, que atuam sobre o folículo e sobre o ovócito II, respectivamente
- 6) LETRA C) alta concentração de FSH e baixa concentração de estrógeno
- 7) LETRA B) não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos espermatozóides dos testículos para o pênis.