

# Quizz 07

## Cálculo Numérico / Análise Numérica

Prof.: Fabrício Murai

$$\text{Dado } X = \begin{bmatrix} -0.20000 \\ 0.50000 \\ 0.90000 \\ 1.30000 \\ 1.60000 \\ 2.10000 \end{bmatrix} \text{ e } Y = \begin{bmatrix} -0.72800 \\ -0.87500 \\ 0.44900 \\ 3.22700 \\ 6.61600 \\ 14.98100 \end{bmatrix}.$$

- 1) Começando a contar a partir do índice 0, determine  $P_2(x)$  e  $P_6(x)$ .
- 2) Qual é o coeficiente que multiplica  $P_2(x)$ , no polinômio de Lagrange?
- 3) Quanto vale  $P_2(1,55)$ ?
- 4) Quanto vale  $L_5(1,6)$ ?

1)

$$P_k(x) = \prod_{i=0, i \neq k}^n (x - x_i)$$

$$P_2(x) = (x - (-0.2)) \times (x - 0.5) \times (x - 1.3) \times (x - 1.6) \times (x - 2.1)$$

$$P_5(x) = (x - (-0.2)) \times (x - 0.5) \times (x - 0.9) \times (x - 1.3) \times (x - 1.6)$$

2)

$$c_2 = \frac{y_2}{P_2(x_2)}$$

$$P_2(x) = (x - (-0.2)) \times (x - 0.5) \times (x - 1.3) \times (x - 1.6) \times (x - 2.1)$$

$$P_2(x_2) = (0.9 - (-0.2)) \times (0.9 - 0.5) \times (0.9 - 1.3) \times (0.9 - 1.6) \times (0.9 - 2.1) = -0.14784$$

$$c_2 = \frac{0.499}{-0.14784} = -3.375271$$

3)

$$P_2(x) = (x - (-0.2)) \times (x - 0.5) \times (x - 1.3) \times (x - 1.6) \times (x - 2.1)$$

$$P_2(x) = (1.55 - (-0.2)) \times (1.55 - 0.5) \times (1.55 - 1.3) \times (1.55 - 1.6) \times (1.55 - 2.1)$$

$$P_2(1,55) = 0.012633$$

4)

$$L_5(x) = c_0 \times P_0(x) + c_1 \times P_1(x) + c_2 \times P_2(x) + c_3 \times P_3(x) + c_4 \times P_4(x) + c_5 \times P_5(x)$$

$$P_0(1.6) = P_1(1.6) = P_2(1.6) = P_3(1.6) = P_5(1.6) = 0$$

$$L_5(1.6) = c_4 \times P_4(1, 6)$$

$$P_4(x) = (x - (-0.2)) \times (x - 0.5) \times (x - 0.9) \times (x - 1.3) \times (x - 2.1)$$

$$P_4(1.6) = -0.2079$$

$$P_4(x_4) = -0.2079$$

$$c_4 = \frac{6.616}{-0.2079} = -31.822992$$

$$L_5(1.6) = c_4 \times P_4(1.6) = 6.616 \text{ (Note que como } (1.6, 6.616) \text{ é um ponto dado, temos necessariamente que } L_5(1.6) = 6.616)$$