

Quiz 21

Cálculo Numérico / Análise Numérica

Prof.: Fabrício Murai

Nome:

Nº de matrícula:

1. Encontre o par (x,y) que minimiza $f(x,y) = -x^2 - y^2$, usando o método de Newton para duas dimensões, começando a partir do ponto $(1,1)$.

$$z_{n+1} = x_n + (H(z_n))^{-1} \nabla f(z_n)$$

onde $z_n = (x_n, y_n)$ e H é a matriz Hessiana de $f(x, y)$.

$$\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(z_n) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(z_n) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(z_n) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(z_n) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_p}(z_n) \\ \frac{\partial f}{\partial y_n}(z_n) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

É necessário apenas uma iteração porque como o valor obtido de $(x,y) = (0,0)$, isso faz com que ∇f na segunda iteração seja 0, ou seja, teríamos a seguinte equação:

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{-1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$