

# Quizz Teórico sobre Interpolação

## Cálculo Numérico / Análise Numérica

Prof.: Fabrício Murai

**Não esqueça de escrever seu nome. Esse quizz não vale nota.** Considere as sentenças a seguir. Marque **V** se a sentença for verdadeira e **F** se a sentença for falsa. **Escrever uma justificativa é um bom exercício.**

(V) É possível obter um polinômio de grau 3 a partir da interpolação polinomial de 5 pontos.

A partir da interpolação de 5 pontos, iremos obter um polinômio de grau máximo 4. Usando o método de Newton, por exemplo, é possível que a diferença dividida de ordem 4 seja nula (i.e.,  $\Delta^4 y_0 = 0$ ), dando origem a um polinômio de grau 3. Isso é equivalente ao caso em que a interpolação de 3 pontos dá origem a uma reta.

(V) Se  $f(x)$  é um polinômio de grau  $n$ , as diferenças finitas  $\Delta^{n+1} y_i$  são identicamente nulas quando calculadas para quaisquer  $(x_i, y_i)$  dados, onde  $y_i = f(x_i)$ .

O teorema visto em sala versa sobre as diferenças divididas. No entanto, vimos que a relação entre  $\Delta^n y_i$  e  $\Delta^n y_i$  é dada por

$$\Delta^n y_i = \frac{\Delta^n y_i}{n! h^n}.$$

Logo, se o polinômio é de grau  $n$ , então  $\Delta^{n+1} y_i = 0$ , o que implica que  $\Delta^n y_i = 0$ .

(F) Seja  $f(x)$  uma função desconhecida. São conhecidos apenas 3 pontos  $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3$ , para os quais  $y_i = f(x_i)$ . Calculando-se as diferenças divididas, notamos que  $\Delta^2 y_0 = 0$ . Conclui-se que  $f(x)$  é um polinômio de grau 1 (uma reta).

Esta sentença corresponde a recíproca do teorema visto em sala, que não é verdadeira. O fato de que a interpolação deu origem a uma reta só indica que os pontos são colineares. No entanto, existem infinitas funções que passam por 3 pontos colineares.

(F) Os diferentes métodos de interpolação vistos em sala podem dar origem a diferentes polinômios de grau  $n$  quando interpolados sobre um mesmo conjunto de  $n + 1$  pontos.

Todos os métodos dão origem ao mesmo polinômio quando interpolados a partir de um mesmo conjunto de pontos.

(V) O processo de Horner diminui o número de multiplicações necessárias no método de Gregory-Newton.

O processo de Horner coloca termos em evidência, reduzindo o número de multiplicações no método de Gregory-Newton (assim como no método de Newton).

(V) Considere a escolha de pontos para a interpolação polinomial na abscissa  $z$ . Dado que já foram escolhidos  $x_i < z$  e  $x_j > z$ , se  $|x_k - z| = |x_m - z|$ , pode-se escolher tanto  $x_k$  quanto  $x_m$ .

O método de escolha de pontos visto em sala considera apenas a distância entre os pontos e a abscissa a ser interpolada. Logo, podem ser escolhidos  $x_k$  ou  $x_m$ .

(F) Considere a escolha de pontos para a interpolação polinomial na abscissa  $z$ . Dado que já foram escolhidos  $x_i < z$  e  $x_j > z$ , se  $|x_k - z| = |x_m - z|$ , a escolha de  $x_k$  resultará no mesmo erro de truncamento que  $x_m$ .

Escolhas de pontos diferentes vão dar origens a polinômios diferentes e, portanto, a erros de interpolação diferentes. Até mesmo o limitante superior para o erro de truncamento irá depender do intervalo determinado pela escolha de pontos.

(F) Seja  $f(x) = x \sin x$ . O erro de truncamento de um polinômio interpolador obtido a partir dos pontos  $(0, 0)$ ,  $(\pi/6, \pi/12)$ ,  $(\pi/4, \pi\sqrt{2}/8)$ ,  $(\pi/3, \pi\sqrt{3}/6)$ ,  $(\pi/2, \pi/2)$  é igual para qualquer  $z \in [0, \pi/2]$ .

(Cuidado: embora você possa ficar compelido a verificar se a sentença é verdade, esta questão não requer nenhuma conta.) O erro de um mesmo polinômio interpolador varia de ponto para ponto.

(V) Sempre que o método de Gregory-Newton é aplicável, a interpolação de Lagrange também é.

Dentre os métodos vistos em sala, o método de Gregory-Newton é o único que apresenta restrição em relação ao espaçamento entre as abscissas dos pontos usados na interpolação.

(F) O método de Gregory-Newton requer menos espaço na memória do que o método de Newton.

Ambos podem ser executados com o uso do vetor auxiliar *Dely* e mais algumas variáveis auxiliares para armazenar resultados parciais do somatório.