

# Übungsblatt 7

Felix Kleine Bösing

November 26, 2024

## Aufgabe 7.1

Gegeben ist die lineare Abbildung  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  mit den Eigenschaften

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f\left(\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

### Teil (a)

Wir berechnen  $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$  und  $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

**Beweis:**

Da  $f$  linear ist, gilt für beliebige Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$ :

$$f(a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2) = af(\mathbf{v}_1) + bf(\mathbf{v}_2),$$

wobei  $a, b \in \mathbb{R}$  sind. Wir stellen  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  und  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  als Linearkombination der gegebenen Vektoren  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  und  $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$  dar.

1. Für  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  lösen wir das Gleichungssystem:

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Daraus folgen die Gleichungen:

$$a - 3b = 1, \quad 2a = 0$$

Aus  $2a = 0$  folgt  $a = 0$ . Einsetzen in  $a - 3b = 1$  ergibt  $b = -\frac{1}{3}$ . Somit gilt:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Daraus folgt:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0 \cdot f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) - \frac{1}{3} \cdot f\left(\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = -\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. Für  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  lösen wir:

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dies ergibt die Gleichungen:

$$a - 3b = 0, \quad 2a = 1$$

Aus  $2a = 1$  folgt  $a = \frac{1}{2}$ . Einsetzen in  $a - 3b = 0$  ergibt  $b = \frac{1}{6}$ . Somit gilt:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Daraus folgt:

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2} \cdot f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) + \frac{1}{6} \cdot f\left(\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

### Teil (b)

Wir untersuchen, ob  $f$  injektiv und/oder surjektiv ist.

#### **Beweis:**

##### **1. Injektivität:**

Eine lineare Abbildung  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ist genau dann injektiv, wenn ihr Kern nur den Nullvektor enthält, d.h.  $\ker(f) = \{\mathbf{0}\}$ .

Um den Kern zu bestimmen, lösen wir:

$$f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \mathbf{0},$$

was mit der Darstellung von  $f$  äquivalent ist zu:

$$x \cdot f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + y \cdot f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \mathbf{0}$$

Einsetzen der Ergebnisse aus Teil (a):

$$x \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Daraus erhalten wir das Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} -y &= 0, \\ x + \frac{1}{2}y &= 0 \end{aligned}$$

Aus der ersten Gleichung folgt  $y = 0$ . Einsetzen in die zweite Gleichung ergibt  $x = 0$ . Somit ist  $\ker(f) = \{\mathbf{0}\}$ , und  $f$  ist injektiv.

### 2. Surjektivität:

Eine lineare Abbildung  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  ist surjektiv, wenn ihr Bild  $\operatorname{im}(f)$  den gesamten Zielraum  $\mathbb{R}^2$  umfasst, d.h.  $\operatorname{im}(f) = \mathbb{R}^2$ .

Das Bild von  $f$  ist der von  $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$  und  $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$  aufgespannte Unterraum. Da diese beiden Vektoren linear unabhängig sind (ihre Determinante ist ungleich null), spannen sie  $\mathbb{R}^2$  auf. Somit ist  $f$  surjektiv.

### Schlussfolgerung:

Die Abbildung  $f$  ist sowohl injektiv als auch surjektiv, d.h.  $f$  ist bijektiv.

## Teil (c)

Wir beschreiben, was  $f$  mit einem gegebenen Vektor macht.

### Beschreibung:

Die Abbildung  $f$  transformiert Vektoren im  $\mathbb{R}^2$  gemäß der durch  $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  und  $f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$  definierten Transformation. Diese Transformation entspricht einer Kombination aus einer Drehung und einer Streckung/Scherung.

### Skizze:

Zur Veranschaulichung können wir die Bilder der Basisvektoren und die von ihnen aufgespannten Bereiche skizzieren. Damit wird sichtbar, wie  $f$  den Raum transformiert. (Hier wird eine schematische Darstellung empfohlen, die die Transformation von Basisvektoren zeigt.)

## Aufgabe 7.2

Sei  $K$  ein Körper.

### Teil (a)

**Aufgabe:** Gibt es eine  $K$ -lineare Abbildung  $\varphi : K^4 \rightarrow K^2$  mit 1-dimensionalem Kern?

**Beweis:**

1. Nach dem Dimensionssatz gilt für eine  $K$ -lineare Abbildung  $\varphi : K^n \rightarrow K^m$ :

$$\dim \ker(\varphi) + \dim \operatorname{im}(\varphi) = n$$

2. Für  $\varphi : K^4 \rightarrow K^2$  bedeutet dies:

$$\dim \ker(\varphi) + \dim \operatorname{im}(\varphi) = 4$$

3. Da der Zielraum  $K^2$  ist, gilt  $\dim \operatorname{im}(\varphi) \leq 2$ . Falls  $\dim \ker(\varphi) = 1$ , folgt:

$$1 + \dim \operatorname{im}(\varphi) = 4 \implies \dim \operatorname{im}(\varphi) = 3$$

4. Dies ist jedoch ein Widerspruch, da der Zielraum nur Dimension 2 hat. Daher kann es keine solche Abbildung geben.

**Teil (b)**

- Aufgabe:** Seien  $V, W \subset K^5$  Untervektorräume mit  $\dim V = 3$  und  $\dim W = 4$ .  
4. Zeigen Sie  $\dim(V \cap W) \geq 2$ .

**Beweis:**

1. Für zwei Untervektorräume  $V$  und  $W$  eines Vektorraums  $K^n$  gilt die Dimensionsformel:

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W)$$

2. Da  $V + W \subseteq K^5$ , gilt:

$$\dim(V + W) \leq 5$$

3. Setzen wir die bekannten Dimensionen ein:

$$\dim(V + W) = \dim V + \dim W - \dim(V \cap W)$$

Das ergibt:

$$\dim(V \cap W) = \dim V + \dim W - \dim(V + W) \geq 3 + 4 - 5 = 2$$

4. Damit folgt  $\dim(V \cap W) \geq 2$ .

## Aufgabe 7.3

Sei  $K$  ein Körper.

### Teil (a)

**Aufgabe:** Bestimmen Sie alle linearen Abbildungen  $f : K \rightarrow K$ .

**Beweis:**

1. Eine lineare Abbildung  $f : K \rightarrow K$  ist vollständig durch das Bild des Elements  $1 \in K$  definiert, da  $f$  linear ist und für alle  $\lambda \in K$ :

$$f(\lambda) = \lambda \cdot f(1)$$

2. Bezeichnen wir  $f(1) = c$  mit  $c \in K$ , dann ist die Abbildung durch  $f(\lambda) = c\lambda$  für alle  $\lambda \in K$  gegeben.
3. Somit ist jede lineare Abbildung  $f : K \rightarrow K$  eine Multiplikation mit einem festen Skalar  $c \in K$ .

### Teil (b)

**Aufgabe:** Seien  $a, b \in K$ . Betrachten Sie  $f : K^2 \rightarrow K$  mit  $f(x, y) = ax + by$ . Bestimmen Sie eine Basis von

$$\ker f = \{(x, y) \in K^2 : f(x, y) = 0\}$$

Wann ist  $f$  surjektiv?

**Beweis:**

1. Der Kern von  $f$  ist definiert durch die Gleichung:

$$f(x, y) = ax + by = 0$$

2. Um den Kern zu bestimmen, lösen wir diese Gleichung nach  $y$  auf (falls  $b \neq 0$ ):

$$y = -\frac{a}{b}x$$

3. Der Kern ist dann der Untervektorraum

$$\ker f = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix} \right\},$$

wobei  $b \neq 0$  vorausgesetzt wird. Falls  $b = 0$ , ist  $f(x, y) = ax$ , und der Kern ist

$$\ker f = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

4. Eine Basis des Kerns hängt also von den Werten von  $a$  und  $b$  ab:

- Falls  $b \neq 0$ , ist  $\begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix}$  eine Basis von  $\ker f$ .
- Falls  $b = 0$ , ist  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  eine Basis von  $\ker f$ .

5.  $f$  ist surjektiv, wenn der Bildraum von  $f$  ganz  $K$  ist. Dies ist der Fall, wenn  $a \neq 0$  oder  $b \neq 0$ , da mindestens einer der beiden Koeffizienten ungleich Null sein muss, um alle Werte in  $K$  zu erzeugen.

## Aufgabe 7.4

Sei  $f$  ein Endomorphismus des Vektorraumes  $V$  mit  $f^2 = f$ . Zeigen Sie, dass  $\ker(f)$  und  $\operatorname{im}(f)$  Komplementärräume in  $V$  sind.

**Beweis:**

1. Zunächst zeigen wir, dass  $V = \ker(f) \oplus \operatorname{im}(f)$ , also

$$V = \ker(f) + \operatorname{im}(f) \quad \text{und} \quad \ker(f) \cap \operatorname{im}(f) = \{0\}$$

2. Zeigen von  $V = \ker(f) + \operatorname{im}(f)$ :

(a) Sei  $v \in V$ . Da  $f^2 = f$ , ist  $f$  idempotent, das heißt:

$$f(v) \in \operatorname{im}(f) \quad \text{und} \quad v - f(v) \in \ker(f),$$

da

$$f(v - f(v)) = f(v) - f^2(v) = f(v) - f(v) = 0$$

(b) Somit lässt sich jeder Vektor  $v \in V$  als Summe schreiben:

$$v = f(v) + (v - f(v)),$$

wobei  $f(v) \in \operatorname{im}(f)$  und  $v - f(v) \in \ker(f)$ . Also gilt  $V = \ker(f) + \operatorname{im}(f)$ .

3. Zeigen von  $\ker(f) \cap \operatorname{im}(f) = \{0\}$ :

(a) Sei  $v \in \ker(f) \cap \operatorname{im}(f)$ . Dann gilt:

$$v \in \ker(f) \implies f(v) = 0 \quad \text{und} \quad v \in \operatorname{im}(f) \implies \exists w \in V : v = f(w)$$

(b) Einsetzen von  $v = f(w)$  in  $f(v) = 0$  ergibt:

$$f(v) = f(f(w)) = f(w) = v \implies v = 0$$

(c) Also ist  $\ker(f) \cap \operatorname{im}(f) = \{0\}$ .

4. Da  $V = \ker(f) + \operatorname{im}(f)$  und  $\ker(f) \cap \operatorname{im}(f) = \{0\}$ , folgt:

$$V = \ker(f) \oplus \operatorname{im}(f),$$

und somit sind  $\ker(f)$  und  $\operatorname{im}(f)$  Komplementärräume in  $V$ .

## References