

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



We create chemistry

Polyram® 70 WG

FUNGICIDA - TIOCARBAMATO
METIRAM

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE
CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS
NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Polyram® 70 WG es un fungicida, protectante, que inhibe el proceso de germinación o desarrollo de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochilao equipo accionado por tractor. En banano y cítricos la aplicación puede realizarse con avioneta o helicóptero. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar Polyram® 70 WG, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de cono hueco. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Cuando la aplicación terrestre no sea posible para los cultivos de banano y cítricos, la aplicación aérea se acepta bajo el supuesto de que ocurran riesgos de deriva durante la aplicación. No aplicar con velocidades de viento superiores a las 5 millas por hora (8 km/h), ni cuando la temperatura exceda los 32° C o la humedad relativa sea inferior al 70%. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. En aplicaciones aéreas el volumen de caldo no debe ser menos de 11 L/Ha para banano y 50 L/Ha para cítricos en aplicaciones terrestres use un mínimo de 55 L/Ha banano y 250 L/Ha para cítricos. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. Utilice boquillas de cono hueco. En Costa Rica para aplicaciones aéreas acátase el Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola según Decreto N° 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGSP y Decreto N° 34202-MS-MAG-MOPT-MGSP o el reglamento vigente.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular, Polyram® 70 WG. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

Preparación de Polyram® 70 WG en dispersión en agua:

- De acuerdo con la dosis de Polyram® 70 WG a utilizar, mezclarlo en el tanque con agua limpia hasta la mitad;
- Completar el volumen de agua requerido;
- Agitar para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285-570 litros de agua por hectárea. Polyram® 70 WG en el caso del cultivo de banano y plátano puede ser aplicado en agua, en una emulsión agua-aceite y en una emulsión-agua en mezcla con fungicidas sistémicos.

Preparación de Polyram® 70 WG en emulsión aceite-agua:

- Verter la cantidad de aceite a aplicar (2-7 L/ha) e iniciar agitación.
- Agregar el emulsificante (1% del volumen del aceite), y agitar mínimo durante 5 ó 10 minutos o hasta que se mezcle bien con el aceite.
- Añadir el 50% del volumen de agua requerido, agitar mínimo por 5 minutos más.
- Añadir la cantidad recomendada de Polyram® 70 WG. Mezclar bien durante 5 minutos.
- Con el agitador en movimiento, añadir la cantidad restante del agua requerida, agitar mínimo por 5 minutos más.
- El caldo está listo para la aplicación. En el caso de mezclas con fungicidas sistémicos, preparar la emulsión siguiendo los pasos descritos anteriormente para la preparación de Polyram® 70 WG en emulsión aceite-agua.



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	INTERVALO DE APLICACIÓN	INTERVALO PRE-COSECHA
Banano y Plátano <i>Musa sp.</i>	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1.2-1.4 kg/ha	De 4 a 8 días dependiendo de la presión de la enfermedad. Realizar un máximo de 13 aplicaciones de este producto por año. Utilice preventivamente con una presión de la enfermedad baja, en cualquier etapa de desarrollo de la planta.	0
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>	1.5-3.0 kg/ha	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.	7

Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i>	Mildiu <i>Peronospora destructor</i>	2.0-3.0 kg/ha	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.	7
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemutianum</i> <i>Royadelfrijol</i> <i>Uromyces appendiculatus</i>	1.5-2.0 kg/ha		7
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Manchagris <i>Stemphylium spp.</i>	1.5-2.5 kg/ha		7
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Viruela <i>Septoria spp.</i> Abigarrado <i>Cladosporium spp.</i> Antracnosis <i>Colletotrichum sp.</i>	1.5-2.5 kg/ha	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.	7
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mildiu veloso <i>Peronospora destructor</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i> Alternaria <i>Alternaria cucumerina</i>	1.5-2.0 kg/ha		7
Manzana <i>Malus spp.</i>	Roña <i>Venturia inaequalis</i>	3.0 kg/ha		7
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Verruga <i>Elsinia sp.</i> Melanosis <i>Diaporthe citri</i> Gomosis <i>Phytophthora sp.</i>	2.0-3.0 kg/ha	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.	7
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum sp.</i> Mildiu veloso <i>Peronospora destructor</i>	1.5-2.0 kg/ha		7
Uvas <i>Vitis vinifera</i>	Mildiu <i>Plasmopora sp.</i> Podredumbre negra <i>Guignardia sp.</i>	2.0-3.0 kg/ha		7
Flores y Ornamentales	Pudre netra <i>Phytophthora sp.</i> Roya <i>Uromyces sp.</i> Puccinia <i>Puccinia sp.</i> Alternaria <i>Alternaria sp.</i> Septoria <i>Septoria sp.</i>	3.0 kg/ha	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.	7
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mancha marrón <i>Helminthosporium oryzae</i>	1.0 -1.4 kg/ha		7

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i>	Mildiu <i>Peronospora destructor</i>	2.0-3.0 kg/ha (1.4-2.1 kg/mz)	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad.
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemutianum</i> Roya del frijol <i>Uromyces appendiculatus</i>	1.5-2.0 kg/ha (1.05-2.1 kg/mz)	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Mancha gris <i>Stemphylium spp.</i>	1.5-2.5 kg/ha (1.05-1.75 kg/mz)	
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Viruela <i>Septoria spp.</i> Abigarrado <i>Cladosporium spp.</i> Antracnosis <i>Colletotrichum sp.</i>	1.5-2.5 kg/ha (1.05-1.75 kg/mz)	
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mildiu veloso <i>Peronospora destructor</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i> Alternaria <i>Alternaria cucumerina</i>	1.5-2.0 kg/ha (1.05-2.1 kg/mz)	

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Naranja <i>Citrus sinensis</i> L. Mandarina <i>Citrus reticulata</i> Limon <i>Citrus limon</i>	Roña <i>Venturia inaequalis</i>	1.5-3.0 kg/ha (1.05-2.1 kg/mz)	Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo con la incidencia de la enfermedad. Para cítricos: 100 a 300 gramos por 100 litros de agua. Por bomba de mochila aplica 6 a 8 medidas de 25 cm ³ (1 medida 25 cm ³ de Polyram 70 WG = 16 gramos)
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum</i> sp. Mildiu veloso <i>Peronospora destructor</i>	1.5-2.0 kg/ha (1.05-2.1 kg/mz)	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mancha marrón <i>Helminthosporium oryzae</i>	1-1.4 kg/ha (0.7-0.98 kg/mz)	

CULTIVOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, BELICE, PANAMÁ, HONDURAS:

Banano y plátano	Musa sp
------------------	---------

En banano y plátano utilice preventivamente con una presión de la enfermedad baja en cualquier etapa de desarrollo de la planta.

CULTIVOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, BELICE, HONDURAS Y PANAMÁ:

Manzana	Malus spp
Pera	Pyrus communis
Tabaco	Nicotiana tabacum
Tomate	Lycopersicon esculentum
Melón	Cucumis melo
Pepino	Cucumis sativus
Sandia	Citrullus vulgaris
Frijol	Phaseolus vulgaris
Papa	Solanum tuberosum
Cebolla	Allium cepa
Apio	Apium graveolens
Algodón	Gossypium spp
Mani	Arachis hypogaea
Maíz	Zea mays
Cacao	Theobroma cacao
Cítricos	Citrus spp
Coliflor	Brassica oleracea var. Botrytis
Repollo	Brassica oleracea var. Capitata
Zanahoria	Daucus carota
Espárrago	Asparagus officinalis
Ornamentales	

CULTIVOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

Cucurbitáceas:	
Pepino	Cucumis sativus
Melón	Cucumis melo
Sandia	Citrullus vulgaris
Calabaza, ayote, zapallo	Cucurbita máxima
Ayote	Cucurbita mixta
Ayote	Cucurbita ficifolia
Ayote	Cucurbita moschata
Cundeamor	Momordica Charantia
Pumpkins, zuquini	Cucurbita pepo
Chayote	Sechium edule

PLAGAS A CONTROLAR EN GUATEMALA, BELICE, PANAMÁ, HONDURAS:

Tizón tardío	Phytophthora spp
Tizón temprano	Alternaria spp
Mancha gris	Stemphylium spp
Viruela	Septoria spp
Antracnosis	Colletotrichum spp
Moho azul	Peronospora tabacina
Mal del talluelo	Fusarium spp.
	Rhizoctonia spp
	Pythium spp
Mancha foliar	Mycosphaerella berkeleyi
Roya	Uromyces spp
Antracnosis	Colletotrichum spp
Niebla de maíz	Helminthosporium spp
Pudrición negra del fruto	Phytophthora parasitica
Verrugosis	Elsinoe spp
Melanosis	Diaporthe spp
Gomosis	Phytophthora spp
Antracnosis	Gloeosporium spp
Roña	Venturia spp
Podredumbre negra	Botryosphera obtusa
Mildiu	Peronospora destructor
Mancha anular	Mycosphaerella brassicola
Mildiu	Peronospora parasitica
Roya	Puccinia spp
Manchas negras	Diplocarpum spp
Mancha foliar	Septoria spp
Quemaito	Alternaria porri
Piricularia	Pyricularia oryzae
Helminthosporium	Helminthosporium oryzae
Cercospora	Cercospora oryzae
Escaldado de la hoja	Rhynchosporium oryzae
Mildiu	Pseudoperonospora cubensis
Sigatoka negra	Mycosphaerella fijiensis

DOSIS RECOMENDADAS:

Horlitaliz, cucurbitas, frijol, tabaco, cacao: 2-3 kg/ha Cítricos, rosa, clavel, hortensia: 100a 300 gramos por 100 litros de agua. Por bomba de mochila aplique 6 a 8 medidas de 25 cm³ (1 medida 25 cm³ de Polyram 70 WG= 16 gramos). Banano y plátano: 1.2-1.4 kg/ha. En Panamá: 2kg/ha. Realizar un máximo de 13 aplicaciones de Polyram 70 WG por año.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Deberá aplicarse al observarse la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda hacer aspersiones con intervalos de 8 a 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad. Banano y plátano: 4-8 días, dependiendo de la presión de la enfermedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Horlitaliz, cucurbitas, frijol, tabaco, cacao, cítricos, rosa, clavel, hortensia: Siete días, cuando se usa solo el producto. Banano y plátano: 0 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Después que la mezcla de producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado.

FITOTOXICIDAD: Polyram 70 WG no es fitotóxico a cultivos mencionados si se aplica según nuestras recomendaciones. Lea las etiquetas de todos los productos usados en la mezcla.

COMPATIBILIDAD: este fungicida es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y acaricidas. La mezcla con Diazinon y Malation, deben ser pulverizadas inmediatamente. El Polyram 70 WG no puede ser mezclado con caldosa base de aceite más Parathion. En banano y plátano puede utilizarse en mezcla con Fempropimorph, Epoxiconazol, Boscalid y Pyraclostrobin en aplicaciones en emulsión con aceite. Verifique compatibilidad con otros productos antes de usarlo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte Polyram 70 WG junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor de desecho según la legislación nacional. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ligera irritación en los ojos y piel. Otros síntomas posibles, irritación bronquial, excitación nerviosa y molestias gastro intestinales.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar la boca inmediatamente, dé a beber suficiente agua. Busque ayuda médica.

NO inducir el vómito. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona afectada y lívela a un lugar limpio y ventilado. Manténgala en reposo y pida ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA, ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	2251-3560 / 2232-0735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	EL SALVADOR	2525-5800 Ext. 148/149
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322 / 2232-2415
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	NICARAGUA	22894700 ext. 1294/ 87550983
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028 / 2222-0122 / 911
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	523-4948
HOSPITAL DR. LUIS AYBÁN	REPÚBLICA DOMINICANA	681-2181 / 681-7828
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.		

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO A PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano y deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante solo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGUN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO. Los períodos de carencia indicados en este panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADOR: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Alemania.

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:	BASF Guatemala Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala. Tel.: 2445-7800, Fax: 2445-7698
COSTA RICA:	BASF Costa Rica S. A. Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221
EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
REP. DOMINICANA:	BASF Dominicana S. A. Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio Rogama, 3er piso Ensanche Naco, Santo Domingo Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027
DISTRIBUIDO POR:	

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-35	22-11-12
BELICE	0281-1	14-01-14
EL SALVADOR	2711	21-09-11
HONDURAS	125-63-II	28-01-13
COSTA RICA	2711	21-12-82
PANAMÁ	107Sef	22-09-09