

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



We create chemistry

ZAMPRO® DM 52.5 SC

FUNGICIDA- MORFOLINA, TRIAZOL PIRIMIDINA
DIMETHOMORPH, AMETOCTRADIN



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,114 g/mL a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Fungicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: El Ametoctradin es un fungicida preventivo, que actúa por contacto. Opera inhibiendo la movilidad, diferenciación y germinación de las zoosporas. Ametoctradin: cuando se aplica foliarmente, actúa sobre la superficie de la hoja de forma preventiva al inhibir el desarrollo de las zoosporas y la infección por zoosporas y zoosporangios, no penetra en la planta ni tampoco es traslocado. No actúa de forma sistémica. El Ametoctradin afecta la respiración del hongo mediante la interrupción de la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria en un complejo de la NADH-reductasa. El Dimethomorph cuenta con una actividad translocadora y sistemicidad local, interfiere con los procesos bioquímicos implicados en la biogénesis de la pared celular fúngica, al alterar la formación de la pared celular afecta todos los estados del ciclo de vida del hongo (excepto en la formación de zoosporas). Dimethomorph: cuando se aplica foliarmente, provee de un control protectante al penetrar en la superficie de la hoja y se transloca dentro de la hoja por difusión. Los ingredientes activos de ZAMPRO® DM 52.5 SC presentan sitios de acción diferentes, de esta manera se reduce el riesgo de resistencia cruzada.

El producto fungicida ZAMPRO® DM 52.5 SC está compuesto por Ametoctradin y Dimetomorf, los cuales de acuerdo a su modo de acción (MdA) en el complejo III: citocromo bc1 (ubiquinona reductasa) y durante la biosíntesis de la pared celular a nivel de celulosa sintetasa, pertenecen a los grupos 45 y 40, respectivamente de acuerdo con la Clasificación Internacional FRAC. Es recomendable rotar el uso de ZAMPRO® DM 52.5 SC con fungicidas de grupos de diferente MdA al grupo 5 para evitar exponer generaciones consecutivas de enfermedad al mismo MdA. Se deben usar y respetar las dosis, número máximo de aplicaciones por ciclo, intervalos de aplicación y días a cosecha recomendados en la etiqueta. No seguir estas indicaciones puede poner en riesgo el control, incrementar el riesgo de resistencia de la enfermedad al producto y comprometer el límite máximo de residuos autorizados.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

La aplicación del ZAMPRO® DM 52.5 SC puede realizarse con equipo manual o terrestre. Antes de usar el equipo de aspersión, revise que esté en buen estado de funcionamiento y sin fugas, calíbrelo para asegurar que aplica la dosis correcta. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora se debe utilizar un tazón medidor o recipiente calibrado. En aplicación terrestre se recomienda el uso de boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente, con una presión de 30 a 40 libras por pulgada cuadrada y una altura del aguilón o la boquilla de 50 cm sobre el nivel del suelo. Después de la aplicación lave el equipo de aplicación con

agua y detergente por dentro y por fuera, déle el mantenimiento recomendado (limpieza de boquillas y filtros, engrase, etc.) déjelo secar y guárdelo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Antes de manipular y utilizar ZAMPRO® DM 52.5 SC póngase el equipo de protección personal. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con el producto concentrado o diluido y con la niebla de aspersión. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación del producto.

Verifique la calidad del agua para evitar el uso de aguas duras y así lograr la mayor eficacia del producto. Regule el pH de la solución de manera que se mantenga entre 5 - 6.5. Llene hasta la mitad el tanque con agua, prepare una premezcla al añadir la cantidad de ZAMPRO® DM 52.5 SC recomendada a un poco de agua, vierta esta premezcla al tanque y termine de llenar mientras agita. Agite la mezcla durante todo el proceso de preparación. BASF recomienda la aplicación del ZAMPRO® DM 52.5 SC en mezcla con el coadyuvante Break Thru 100 SL a una relación de 0.03-0.06% v/v para mejorar la cobertura del fungicida. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón Tardío <i>Phytophthora infestans</i>	0.9-1.2 L/Ha (0.56 a 0.84 l/mz) Utilice un volumen de agua de 400-600L/ha (280-420 L/mz)	ZAMPRO® SC se debe aplicar de manera preventiva – curativa temprana o con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad cada 4 a 7 días, dependiendo de la presión del patógeno o de las condiciones ambientales.
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón Tardío <i>Phytophthora infestans</i>	0.9 a 1.2 L/ha (0.64 a 0.86 L/mz) Utilice un volumen de agua de 400-600L/ha (280-420 L/mz)	Se recomienda usar la dosis de 0.9 L/ha bajo condiciones que no favorecen un rápido crecimiento del hongo. Por el contrario, en condiciones de alta presión de la enfermedad es recomendable usar la dosis de 1.2 L/ha.
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildíu <i>Peronospora destructor</i>	0.9 a 1.2 L/ha (0.64 a 0.86 L/mz) Utilice un volumen de agua de 400-600L/ha (280-420 L/mz)	

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación cada 7-10 días. Hacer 4 aplicaciones como máximo durante el ciclo de cultivo. En el caso del cultivo de papa bajo condiciones de alta presión de enfermedad el intervalo puede bajar a 5 días. Cebolla y ajo: Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 a 10 días cuando se presentes los primeros síntomas de la enfermedad ó las condiciones ambientales sean favorables.

República Dominicana: En cebolla y ajo realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 cuando se presentes los primeros síntomas de la enfermedad ó las condiciones ambientales sean favorables.

Panamá: Se recomienda la aplicación cada 7-14 días. Hacer 4 aplicaciones como máximo durante el ciclo de cultivo. En el caso del cultivo de papa bajo condiciones de alta presión de enfermedad el intervalo puede bajar a 5 días. Melón: 3 aplicaciones con intervalos de 7 días.

Costa Rica: Se recomienda hacer aplicaciones cada 4 a 7 días según la presión de la plaga. Hacer un máximo de 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo. Realizar máximo 2 aplicaciones al año.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Tomate, papa, chile, berenjena, tabaco: 7 días. En Nicaragua para Chile de 4 días.

Melón, sandía, pepino, calabaza, cebolla y ajo: 0 días

Panamá: tomate, papa y melón 7 días.

Costa Rica: 7 días para todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que el producto sobre la superficie tratada haya secado. En caso de que se necesite entrar antes de este periodo, utilice los equipos de protección individual recomendados. En **Nicaragua** por recomendación de la autoridad hasta 12 horas después de la aplicación. En **Costa Rica** se recomienda esperar 4 horas después de la aplicación antes del reingreso y utilizar siempre equipo de protección.

FITOTOXICIDAD: ZAMPRO® DM 52.5 SC no debe ser mezclado de productos de reacción fuertemente alcalina. Se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad antes de usar las mezclas.

COMPATIBILIDAD: ZAMPRO® DM 52.5 SC es compatible con la mayoría de los productos que existen en el mercado como por ejemplo productos que contienen Chlorfenapyr, o piretroides. Antes de realizar cualquier mezcla BASF recomienda realizar pruebas de compatibilidad. Se recomienda aplicar las mezclas de tanque inmediatamente después de su preparación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene, **ZAMPRO® DM 52.5 SC** junto con alimentos para humanos, ni animales, medicinas, ropa, artículos de uso doméstico o fertilizantes. Estable bajo condiciones normales. Almacenar el producto en su recipiente original en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de las fuentes de ignición, el calor, las llamas o cargas electrostáticas. Almacénalo protegido de la luz solar. Evite la formación y deposición de polvo. Proteja de temperaturas superiores a los 40 °C. Puede almacenarse por un periodo de 24 meses. Manéjelo con cuidado para evitar derrames, si esto sucede recójalos con aserrín o algún material absorbente (siempre vistiendo el equipo de protección respiratorio) y recolecte en un envase adecuado, el cual deberá ser etiquetado y sellado. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Este producto no es inflamable ni explosivo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación de las vías respiratorias, tos, secreciones nasales, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, dolor y calambres abdominales, diarrea. Enrojecimiento de los ojos, lagrimeo e irritación dérmica. Puede haber somnolencia.

Nocivo por ingestión, inhalación o contacto con la piel. Puede causar irritación respiratoria, secreción nasal, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, dolor y calambres abdominales, diarrea, irritación ocular y cutánea, lagrimeo y somnolencia. Tóxico para la reproducción: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: No es conocido ningún antídoto específico. Trate sintomáticamente (descontaminación, funciones vitales).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	(502) 2251-3560/ 2232-0735
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 2232-2322 (505) 2289-4700 ext. 1294/
Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	Mobile: 87550-983
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 2223-1028
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	PANAMÁ	(507) 523-4948
Hospital Dr. Luis Aybar	REPUBLICA DOMINICANA	681-7828
Hospital Dr. Francisco Moscoso P.		

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS
TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS**



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

PERSISTENTE EN AGUA, NO PERSISTENTE EN SUELO.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DÉRIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DÉRIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor o desechar según la legislación nacional. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los residuos del producto y su envase deben eliminarse con todas las precauciones posibles, según manejo y desecho de residuos peligrosos. Para Nicaragua no transporte ni almacene este producto junto con alimento, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los insecticidas en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacenar bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente. Prohibido disponer los remanentes o empaques en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.

En caso de fuga o derrame:

Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal, tierra de diatomeas).

Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Bombear el producto.

Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD
HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADO POR:

BASF Española S.L, España. Ctra.Nacional 340 km 1156 43006 Tarragona, España. Tel: +27 (0) 11 203 2400
Email: global.info@basf.com

IMPORTADOR:

GUATEMALA: **BASF Guatemala**
15 Calle 7-77 zona 10 Edif. Óptima Centro de Negocios, nivel 2, oficina 203, Guatemala.

COSTA RICA: **BASF Costa Rica S. A.**
Plaza Roble, Edificio Terrazas, 5to piso, Oficentro Regus, Escazú, San José, Costa Rica
Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

EL SALVADOR: **DUWEST El Salvador S.A.** Calle Siemens No 56, zona industrial Santa Elena, calle Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Tel: 2521-1217.
UNIFERSA DISAGRO S.A. DE C.V. Km 12.5 Carretera al puerto de La Libertad #15, Nuevo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Costa Rica 5476