

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



## PYRAZOSULFOZELL 10 WP

HERBICIDA – SULFONILUREA  
PYRAZOSULPHURON-ETHYL

### ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE  
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: herbicida.

#### MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Este producto es de preemergencia o postemergencia temprana, sistémico y selectivo. Se absorbe por las raíces y el follaje y se transloca por xilema y floema a los meristemas de las plantas. Actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Esta acción desencadena una perturbación total del metabolismo, al interrumpir la síntesis proteica, e interfiere con la síntesis de ADN y el crecimiento celular, provocando la muerte de la planta.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

En aplicaciones terrestres utilizar equipos de elevado o bajo volumen. Utilice boquillas de tipo abanico plano. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua con un rango de pH entre 6 y 7. Agite el producto y agregue la dosis recomendada poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla. Los utensilios usados durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo. Brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

Guatemala, Panamá, Costa Rica y Honduras

| CULTIVO                      | MALEZA                                | DOSIS                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Arroz<br><i>Oryza sativa</i> | Junquillo<br><i>Cyperus iria</i>      | Malezas de 1-2 hojas<br>250 g/ha<br>(175 g/mz)                                                                                                                                                  |               |
|                              |                                       | Malezas de 3 hojas:<br>300 g/ha<br>(210 g/mz)                                                                                                                                                   |               |
|                              |                                       | Malezas de 4 hojas:<br>350 g/ha<br>(245 g/mz)                                                                                                                                                   |               |
|                              |                                       | Malezas más de 4<br>hojas:<br>400 g/ha<br>(280 g/mz)                                                                                                                                            |               |
|                              |                                       | Volumen de caldo<br>300-400 L/ha<br>(210-280 L/mz)                                                                                                                                              |               |
|                              | Coquillo<br><i>Cyperus esculentus</i> | Momento de<br>Aplicación:<br>Desde la siembra<br>hasta 30 días<br>después de<br>emergido el arroz.<br>En arroz bajo riego<br>aplicar antes de<br>establecer la lámina<br>de agua<br>permanente. |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              | Coyulillo<br><i>Cyperus rotundus</i>  |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |

#### Nicaragua

| CULTIVO                      | MALEZA                                | DOSIS                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Arroz<br><i>Oryza sativa</i> | Coyulillo<br><i>Cyperus rotundus</i>  | 210-230 g/ha<br>(147-161 g/mz)                                                                                                                                                                  |               |
|                              |                                       | Volumen de caldo<br>300-400 L/ha<br>(210-280 L/mz)                                                                                                                                              |               |
|                              |                                       | Momento de<br>aplicación:<br>Desde la siembra<br>hasta 30 días<br>después de<br>emergido el arroz.<br>En arroz bajo riego<br>aplicar antes de<br>establecer la lámina<br>de agua<br>permanente. |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              | Coquillo<br><i>Cyperus esculentus</i> |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              | Coquito<br><i>Cyperus diffusus</i>    |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |
|                              |                                       |                                                                                                                                                                                                 |               |

INTERVALO DE APLICACIÓN: una sola aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: el producto puede resultar fitotóxico si se exceden las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

COMPATIBILIDAD: no es compatible con productos fitosanitarios de reacción fuertemente alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes y botas de hule, mascarilla, sombrero, protector

de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material impermeable. No lave ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: no transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en lugar fresco y seco, aléjelo del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE  
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL  
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA  
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:  
GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO,  
PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE  
MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL  
IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y  
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE  
TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de ingestión puede causar toxicidad sistémica, presentándose náuseas, vómitos, diarreas y cefalea. Puede provocar fallo hepático. Por contacto, hiperemia de piel y mucosas. Si es inhalado signos de irritación del sistema respiratorio, rinorrea, dificultad respiratoria y broncoespasmo.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE  
INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático, de soporte vital y de fortalecimiento general. Vigile los signos vitales. Garantice la vía aérea permeable. Realice lavado gástrico hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administre carbón activado y posteriormente laxante (si no existe diarrea). Tratamiento sólo por personal médico especializado.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

| PAÍS        | INSTITUCIÓN                                                     | TELÉFONOS                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Guatemala   | Centro de Información y Asistencia Toxicológica                 | (502) 2251-3560/2232-0735                 |
| El Salvador | Hospital Nacional Rosales                                       | (503) 2231-9262                           |
| Honduras    | Hospital Escuela                                                | (504) 232-6105                            |
| Nicaragua   | Centro Nacional de Toxicología                                  | (505) 2289-4700 ext.1294<br>cel.8755-0983 |
| Costa Rica  | Centro Nacional de Intoxicaciones                               | (506) 2223-1028                           |
| Panamá      | Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos | (507) 523-4948                            |

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE****NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

Es persistente en medio acuoso.

En caso de derrames no caminar por encima del material derramado y tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas. Utilizar el equipo de protección y recoger el derrame mediante barrido con cal, aserrín húmedo, arena u otro absorbente inerte. En caso de roturas de envases, reenvasar el producto en un envase apropiado con la indicación del contenido, para su posterior eliminación. Enjuagar el área del derrame con carbonato de sodio diluido y colocarlo en un recipiente para desechos químicos. Poner el barrido del derrame y los materiales con los que se limpió, en varias fundas plásticas bien selladas y depositarlas en el centro de acopio de desechos peligrosos. Entregar al gestor autorizado para el adecuado destino final. Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegurarse que se hace de conformidad con las leyes locales.

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.****NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.****ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.****MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases donde se ha almacenado este producto no son reutilizables. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. No tirar los residuos por el drenaje. Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles y como residuos peligrosos. Los envases vacíos deben ser depositados en el centro de acopio más cercano para su eliminación. Prohibido disponer los remanentes o empaques de este producto en vertederos.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U. garantiza el contenido de este producto según su etiqueta, siempre que se encuentre en el envase original con el sello de garantía íntegro. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U. no asume responsabilidades por uso de este producto, diferente a lo recomendado en este panfleto.

**FORMULADO POR:****NANJING QIAOSHA CHEMICAL Co. Ltd.**

Calle de Hongwu N° 359, Apartamentos 719, 720, 725; Distrito de Qinhua  
Ciudad de Nanjing. República Popular de China.  
info@qiaoshachemical.com

**IMPORTADOR:****ZELL CHEMIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

San José de la Est. De Ferrocarril al Pacífico, 100m Norte y 25m Este. San José (Costa Rica) Teléfono: 2222 5494. Email: zell@zellchemie.com

**ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.**

C/ General Urrutia, 75 – 1 A.  
C.P. 46013 Valencia (ESPAÑA).  
Tlf: (+34) 96 186 21 20 Fax: (+34) 96 185 57 43  
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

**ZELL CHEMIE GUATEMALA, S.A.**

Avenida de la Reforma 8 – 95 Zona 10,  
Apartamento 202 F Edificio Avenida.  
Guatemala  
Teléfono: (+502) 2378 8484.  
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

**PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO**

|            |             |
|------------|-------------|
| COSTA RICA | 8702188     |
| GUATEMALA  | 859-33A     |
| HONDURAS   | 815-256-I   |
| NICARAGUA  | ZC-05F-2016 |
| PANAMÁ     | 1599        |