

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

REGLONE® 20 SL

HERBICIDA – BIPIRIDILO
DIQUAT



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1,17 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

REGLONE® 20 SL es un herbicida de contacto post-emergente que actúa en todos los tejidos vegetales verdes y es particularmente activo contra malezas de hoja ancha y muchas gramíneas. **REGLONE® 20 SL** necesita de la fotosíntesis activa para manifestar su efecto herbicida, que se caracteriza por el colapso de la estructura celular y la desecación. En condiciones cálidas y soleadas, la actividad herbicida se desarrolla en unas pocas horas. En condiciones nubladas o hacia el fin del día, la acción se hace más lenta pero más efectiva. **REGLONE® 20 SL** puede aplicarse en pre y post siembra.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

En general, para los cultivos recomendados en este panfleto: Aspersora de mochila, no debe ser de aluminio, o equipo accionado por tractor. En especial para la desecación de rastrojos de piña: La aplicación debe ser hecha únicamente con equipo accionado por tractor – no utilizar aspersora de mochila.

Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento, sin derrames en ninguna parte del sistema. Antes de aplicar **REGLONE® 20 SL** calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8003 – 8004 o su equivalente.

No se permite aplicar **REGLONE® 20 SL** con atomizador, nebulizador o bomba de espalda motorizada y se prohíben las aplicaciones aéreas. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular **REGLONE® 20 SL**.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular **REGLONE® 20 SL**. Como con todos los productos químicos **evite en lo posible el contacto con la solución**. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

De acuerdo con la dosis de **REGLONE® 20 SL** a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.

Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 325-570 litros de agua por hectárea (228-400 litros de agua por manzana). En aspersoras de espalda, la concentración de la mezcla de **REGLONE® 20 SL** no deberá ser mayor de 2 litros de **REGLONE® 20 SL** en 200 litros de agua.

En el cultivo de piña, para la destrucción del rastrojo de la post-cosecha: Se recomienda un volumen de 2800 hasta 4700 litros de agua por hectárea, según la densidad del rastrojo. La preparación de la mezcla debe ser hecha únicamente a través de un sistema de circuito cerrado que lleve la mezcla directamente hacia el equipo de aplicación accionado por tractor.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR:	
Frijol	<u>Phaseolus spp</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Maíz	<u>Zea mays</u>

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR:

Batatilla	<u>Ipomoea spp</u>
Hierba socialista	<u>Emilia sonchifolia</u>
Pega pega	<u>Desmodium sp</u>
Verdolaga	<u>Portulaca oleracea</u>
Lechosa	<u>Euphorbia hirta</u>
Coquito	<u>Cyperus aggregatus, Cyperus odoratum, Cyperus feraz</u>
Trébol	<u>Oxalis spp</u>
Melón amargo	<u>Momordica charanthia</u>
Hierba mora	<u>Solanum nigrum</u>
Siempre viva	<u>Commelina difusa</u>
Venadillo	<u>Conyza bonariensis</u>
Coyolillo	<u>Cyperus rotundus</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Frijol, como desecante: 1,5 L/ha (1.05 L/mz)

Café: 2,0 L/ha (1,4 L/mz). Aplicar en post-emergencia de malezas y en forma dirigida.

Maíz: 2,0 – 2,5 L/ha (1,4 – 1,75 L/mz)

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, BELICE, HONDURAS Y PANAMÁ:

Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Banano y plátano	<u>Musa spp</u>
Maíz	<u>Zea mays</u>
Sorgo	<u>Sorghum spp</u>
Frijol	<u>Phaseolus spp</u>
Papa	<u>Solanum spp</u>
Caña de Azúcar	<u>Saccharum spp</u>
Hule	<u>Hevea spp</u>
Hortalizas y frutales	

USO AUTORIZADO EN GUATEMALA

Palma africana	<u>Elaeis guineensis</u> Jacq.
----------------	--------------------------------

USO AUTORIZADO EN HONDURAS

Desecante de rastrojos

Piña	<u>Ananas comosus</u>
------	-----------------------

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:

Café	<u>Coffea spp</u>
Banano	<u>Musa spp</u>

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

Papa (semilla)	<u>Solanum tuberosum</u>
Algodón	<u>Gossypium hirsutum</u>
Maíz	<u>Zea mays</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Sorgo	<u>Sorghum spp</u>
Remolacha	<u>Beta vulgaris</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Chile	<u>Capsicum annum</u>
Zanahoria	<u>Daucus carota</u>
Caña de Azúcar	<u>Saccharum spp</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>
Cítricos	<u>Citrus spp</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Aguacate	<u>Persea americana</u>
Manzana	<u>Malus spp</u>
Banano	<u>Musa spp (AAA)</u>
Palma africana	<u>Elaeis guineensis</u> Jacq.

Desecante de rastrojos

Piña	<u>Ananas comosus</u>
------	-----------------------

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:

Banano y plátano	<u>Musa spp</u>
Cítricos	<u>Citrus spp</u>
Cacao	<u>Theobroma cacao</u>
Coco	<u>Cocos nucifera</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Palma africana	<u>Elaeis guineensis</u>
Aguacate	<u>Persea americana</u>
Mango	<u>Mangifera indica</u>
Lechosa	<u>Carica papaya</u>
Caña de Azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>
Habichuela	<u>Phaseolus vulgaris</u>
Algodón	<u>Gossypium hirsutum</u>

Maíz	<u>Zea mays</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>
Sorgo	<u>Sorghum vulgare</u>
Batata	<u>Ipomoea batatas</u>
Yuca	<u>Manihot esculenta</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Piña	<u>Ananas comosus</u>
Cajuil	<u>Anacardia sp</u>

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR:	
Acantospermo	<u>Acanthospermum sp</u>
Huisquilete	<u>Amaranthus spp</u>
Berro	<u>Cardamine sp</u>
Comemano	<u>Sicycoides spp</u>
Cuscuta	<u>Cuscuta sp</u>
Girasol silvestre	<u>Helianthus sp</u>
Campanilla	<u>Ipomoea sp</u>
Cola de león	<u>Leonorus sp</u>
Malva de castilla	<u>Malva parviflora</u>
Belladona	<u>Nicandra physodes</u>
Orobancha	<u>Orobanche sp</u>
Trébol	<u>Oxalis sp</u>
Altamisa	<u>Parthenuim spp</u>
Viernes santo	<u>Phyllantus sp</u>
Lirio de agua	<u>Richardia brasiliensis</u>
Cardo	<u>Salsola spp</u>
Escobillo	<u>Sida spp</u>
Lechugilla	<u>Sonchus spp</u>
Ala de mosca	<u>Stellaria media</u>
Tripa de gallina	<u>Stigmaphyllon lindenianum</u>
Verónica	<u>Veronica sp</u>
Sornia o hierba de papagayo	<u>Blechum pyramidatum</u>
Lechosa	<u>Euphorbia sp</u>
Verdolaga	<u>Portulaca spp</u>
Conde	<u>Phyllodendrum spp</u>
Bejuco	<u>Cissus sicyoides</u>
Croton	<u>Croton hirtus</u>
Navajuela	<u>Cyperus luzulae</u>
Barba de indio	<u>Fimbristylis sp</u>
Pega pega	<u>Desmodium adscendens</u>
Cinquillo	<u>Drymaria cordata</u>
Pata de gallina	<u>Eleusine indica</u>
Pincelillo	<u>Emilia fosbergii</u>
Meloncillo	<u>Melothria pendula</u>
Dormilona	<u>Mimosa pudica L.</u>
Plumilla	<u>Panicum trichoides</u>
Oreja de chanco	<u>Elephantopus mollis</u>
Cordoncillo	<u>Peperonia pellucida</u>
Viernes santo	<u>Phyllanthus niruri</u>
Ojo chino	<u>Spermacoce assurgens</u>
Hierba de papagayo	<u>Blechum brownei</u>
Canutillo	<u>Commelina difusa</u>
Delilia	<u>Delilia biflora</u>
Ortiga	<u>Laporteae aestuanis</u>
Piñita	<u>Murdania nudiflora</u>
Pajilla	<u>Panicum trichiodes</u>
Caminadora	<u>Rottboelia cochichinensis</u>
Coyolillo	<u>Torulinium odoratum</u>
Ventanilla	<u>Syngonium spp</u>

DOSIS RECOMENDADAS:
Cultivos en general: 1 a 3 litros/ha (0,7 a 2,1 litros/mz)
Como desecante: 1 a 3 litros/ha (0,7 a 2,1 litros/mz)
Palma Africana-Costa Rica y Guatemala: 2,5 – 3,0 L/ha (1,75 – 2,1 L/mz). Aplicar volúmenes entre 250 – 300 L/ha (175 – 210 L/mz).
Banano-Costa Rica: 2,0 – 3,0 L/ha (1,4 – 2,1 L/mz). Aplicar volúmenes entre 250 – 300 L/ha (140 – 210 L/mz); la dosis alta cuando predominen gramíneas o con coberturas de arvenses superiores al 40%.
Para ser usado en la destrucción del rastrojo (residuos post-cosecha) en el cultivo de la piña: se recomienda aplicar **Reglone ® 20 SL** en un rango de 12-14 l/Ha. Usar la dosis mayor en rastrojos densos y para una rápida desecación, principalmente en las zonas afectadas por la mosca de la paleta del ganado, que prefiere los tejidos densos para su proliferación. Utilice un volumen desde 2800 hasta 4700 l/Ha, según la densidad del rastrojo. Se recomienda utilizar coadyuvantes no iónicos para mejorar la adherencia y cobertura del rastrojo a desecar en el cultivo de piña.
Es conveniente utilizar **REGLONE® 20 SL** cuando las malezas están pequeñas y tienen una altura menor de 15 cm o estén en pleno crecimiento. En aplicaciones entre hileras, usar preferentemente campana protectora para dirigir la aplicación a la maleza y evitar daños al cultivo. No permita la deriva de la aspersión hacia los cultivos vecinos. No asperjar cuando haya mucho viento. Procurar que la aspersión sea dirigida únicamente a las malezas; evitar que entre en contacto con las partes verdes de las plantas cultivadas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Dependerá de la incidencia de malezas en los cultivos.
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Cero días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
Después que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje de la maleza tratada, lo cual ocurre después de 30 a 45 minutos.

FITOTOXICIDAD:
REGLONE® 20 SL es un herbicida no selectivo; por lo tanto, es fitotóxico a todos los tejidos verdes, no así a los leñosos.

COMPATIBILIDAD:
REGLONE® 20 SL es compatible con la mayoría de los herbicidas comúnmente usados, excepto con herbicidas sistémicos, glifosatos, Fusilade®, etc. No utilice coadyuvantes iónicos ya que pueden disminuir su acción. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
REGLONE® 20 SL no es inflamable pero sí corrosivo. No almacene ni transporte **REGLONE® 20 SL** junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénese y transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Náuseas, vómitos, dolores abdominales, dolor de orofaringe y retroesternal si el producto fue ingerido y sensación de quemadura en la piel si cayó en el cuerpo.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: Administre un **ADSORBENTE** como **TIERRA DE FULLER** (15% en suspensión). **Adultos y niños mayores de 12 años** 100-150 g, **niños menores de 12 años** 2 g/kg de peso corporal o **CARBON ACTIVADO**, administre 30 g por 240 mL.
POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.


ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No tiene antídoto específico. El tratamiento consiste en lavar el estómago y examinar la orina o el aspirado gástrico (si está claro) para ver la presencia del diquat. Administrar por vía oral o tubo gástrico 1 litro de TIERRA de FULLER en suspensión acuosa al 15% junto con un purgante adecuado como Manitol (200 mL de una solución acuosa al 20%). En su defecto, se puede dar sulfato de sodio. Repita cada 4 horas la TIERRA de FULLER y el catártico hasta por 6 dosis. Observe que el catártico cumpla su misión.

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 251-3560, 2232-0735
	Karl Heusner Memorial Hospital	231-548 y 231-639
BELICE	Dr. Hurrisa Hailu	622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro de Toxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	2289-7150, ext. 213
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:
No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente

hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V.
San Lorenzo 1009, Col. Del Valle CP 03100, México, D.F.
Tel.: 52-55-542-26250. Fax: 52-55-568-41024

IMPORTADO POR:

Guatemala:
Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14,
Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel
Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

Belice:
James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street, Ciudad de Belice
Tel. 277-070. Fax: 275-593

El Salvador:
Proagro, S. A.
Edificio Fertica. 5ª. Ave. Norte y 19 Calle Poniente,
San Salvador, El Salvador.
Tel. 503 2234-0444

UNIFERSA-DISAGRO
Kilómetro 9.5 Carretera Puerto La Libertad
Santa Tecla, El Salvador.
Tel.: + 503 2241 5900

Honduras:

Nicaragua:
Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise
media cuadra al sur, Managua Nicaragua.
Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret. Plaza Aeropuerto, Oficina
D1, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:
Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987. Business Park, Costa del
Este. Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá. Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W.
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-64A	23-07-12
BELICE	0238-1	24-11-10
EL SALVADOR	AG-95-05-222	03-05-13
HONDURAS	210-106-I	25-11-11
NICARAGUA	Sy-150-2-92	26-09-12
COSTA RICA	2698	16-12-92
PANAMÁ	5264	12-07-10
REPÚBLICA DOMINICANA	1	07-02-12