

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

GESAPRIM® 90 WG

HERBICIDA – TRIAZINA
ATRAZINE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Gesaprim® 90 WG es un herbicida sistémico selectivo, absorbido principalmente por las raíces y hojas, con traslocación acropetálica en el xilema y acumulación en meristemas apicales y hojas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Gesaprim® 90 WG puede aplicarse con equipos manuales como mochilas, bombas de espalda, tractor o vía aérea. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco de agua, hasta que se forme una pasta uniforme. La misma se vierte en un tanque el cual esté lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar. Para aplicaciones aéreas, usar volúmenes de mezcla mayores de 25 L/ha (5 galones por manzana), con boquillas de abanico plano. Durante la aspersión, use equipo con agitador interno. Para aplicaciones terrestres, se recomienda usar volúmenes de mezcla arriba de 150 L/ha (28 galones por manzana). Usar boquillas de abanico plano. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificadores graduados y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO:

Costa Rica

CULTIVOS	MALEZAS
Maíz <u>Zea mays</u>	Gramíneas:
Sorgo <u>Sorghum vulgare</u>	Pata de gallina <u>Eleusine indica</u>
Caña de <u>Saccharum</u>	Zacate pinto <u>Echinochloa colonum</u>
Azúcar <u>officinatum</u>	Zacate de agua <u>Echinochloa cruz-</u>
Piña <u>Ananas comosus</u>	<u>galli</u>
	Cola de zorro <u>Setaria spp</u>
	Hojas anchas:
	Bledo <u>Amaranthus</u>
	Cadillo <u>Bidens spp</u>
	Apazote <u>Chenopodium album</u>
	Lechosa <u>Euphorbia spp</u>
	Campanilla <u>Ipomoea spp</u>
	Malva <u>Malva spp</u>
	Chilillo <u>Poa annua</u>
	Verdolaga <u>Portulaca oleracea</u>
	Rosilla <u>Galinsoga parviflora</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

*Para Maíz: 1,5 – 2,6 kg/ha (1,05 – 1,82 kg/mz)
*Para Sorgo: 1,3 – 2,3 kg/ha (0,91 – 1,61 kg/mz)
*Para Caña de azúcar: 1,8 – 3,0 kg/ha (1,26 – 2,1 kg/mz)
*Para Piña: 2,0 – 3,0 kg/ha (1,4 – 2,1 kg/mz)

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Maíz: Pre-siembra incorporado (no más de 5 cm de profundidad). En pre-emergencia. En post-emergencia (cuando la maleza no tenga más de 2-3 hojas). Usar pre-siembra incorporado en lugares de poca precipitación pluvial. En aplicaciones de pre y post-emergencia debe de haber humedad en el suelo.

Sorgo: Pre-siembra incorporado (2-3 semanas antes de la siembra, no más de 5 cm de profundidad). En post-emergencia (cuando la maleza no tenga más de 2-3 hojas). No se recomienda aplicar en pre-emergencia. Usar pre-siembra incorporado en lugares de poca precipitación pluvial. En aplicaciones de post-emergencia debe de haber humedad en el suelo.

Caña de azúcar: En pre-emergencia de la caña. En post-emergencia (cuando la maleza no tenga más de 2-3 hojas). En aplicaciones de pre y post-emergencia debe de haber humedad en el suelo.

Piña: En pre-siembra o inmediatamente después de la siembra. Las dosis mayores deben aplicarse en suelos francos o más pesados, donde exista de 3 a 4% de materia orgánica.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una vez por ciclo de cultivo

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No hay restricción alguna

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

No hay restricción alguna.

FITOTOXICIDAD: Gesaprim® 90 WG es fitotóxico para cualquier otro cultivo no recomendado en este panfleto. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD: Gesaprim® 90 WG es compatible con otros herbicidas actualmente en uso. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Gesaprim® 90 WG no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénalo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en envases originales, bien cerrados y debidamente etiquetados, con su correspondiente panfleto. No estibar más de 15 bolsas (base + 14 bolsas).

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Causa irritación de ojos, nariz, garganta y piel. Al ingerirlo, puede causar gastroenteritis, náusea, diarrea, taquicardia, convulsiones y acidosis.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón activado disuelto en grandes cantidades de agua. Llame inmediatamente a un médico.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y expóngala al aire fresco y ventilado. Protéjala de la hipotermia.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos con agua limpia durante varios minutos y llame inmediatamente al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave abundantemente con agua y jabón las partes del cuerpo afectadas.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Aplique terapia sintomática.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. El agua recién tratada no deberá usarse para pasto o alimento y no se debe dar como forraje; alejar al ganado. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Syngenta Crop Protection LLC
3905 Highway, 75 River Road, PO BOX 11
St. Gabriel, LA 70776, USA. Tel.: (225) 642-1100

IMPORTADO POR:

Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica

700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	3526	10-12-93