

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.**



The Chemical Company

Juwel[®] 25 SC

**FUNGICIDA – TRIAZOLE, STROBILURIN
EPOXICONAZOLE, KRESOXIM-METHYL**

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,09 g / cm³ a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL
SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE
CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y
A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:

JUWEL 25 SC es un producto fungicida formulado a base de dos materias activas, Kresoxim-methyl y Epoxiconazole. El Epoxiconazole es un fungicida perteneciente al grupo de los triazoles de actividad sistémica, de amplio espectro, con fuerte acción curativa y erradicante y prolongado efecto residual. Actúa inhibiendo la C-14 demetilasa en la biosíntesis del estero. Después de la aplicación el Epoxiconazole es absorbido por la superficie de la hoja y transportado en el sistema vascular de la planta; el Epoxiconazole tiene una sistemicidad acrópeta desde la base hasta la punta de la hoja.

Kresoxym-Methyl pertenece a la familia de las estrubilurinas y es un inhibidor del transporte de electrones en la mitocondria, con lo cual inhibe la germinación de esporas, el crecimiento del micelio y la formación de esporas. El Kresoxim methyl también tiene actividad sistémica, es absorbido a través de las raíces y translocado vía xilema a los tallos y hojas, o a través de las superficies de las hojas a las puntas de las hojas y los bordes en crecimiento.

JUWEL 25 SC tiene acción preventiva, curativa y erradicante, altamente eficaz para el control de enfermedades foliares en arroz. JUWEL 25 SC presenta prolongada persistencia de acción.

EQUIPO DE APLICACION:

La aplicación de JUWEL 25 SC puede efectuarse manual, por vía aérea o terrestre, con equipo diseñado para hacer una buena distribución en la zona deseada.

Para la carga y aplicación de este producto usar mascarilla, overol, sombrero, botas de hule, guantes de hule, anteojos de seguridad, camisa de manga larga y pantalón. Cambie el filtro de la mascarilla cada quince días de trabajo.

El equipo debe calibrarse antes de aplicar el producto. Verifique que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado y no tenga fugas.

En aplicaciones aéreas el volumen de caldo no debe ser menos de 50 l/ha, en aplicaciones terrestres se usa un mínimo de 200 l/ha.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llene el tanque del pulverizador con agua hasta $\frac{3}{4}$ (tres cuartas) partes. Agite el envase de JUWEL 25 SC, cada vez que lo vaya a utilizar. Adicione la cantidad requerida de JUWEL 25 SC según las indicaciones. Complete con agua a volumen total con agitación constante.

Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular JUWEL 25 SC. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución.

No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

Si bien JUWEL 25 EC no tiene acción sobre el equipo se recomienda lavar el equipo de aplicación después de su uso, así como darle el debido mantenimiento.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA, PANAMA, GUATEMALA, HONDURAS Y REPUBLICA DOMINICANA:

CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Tizón de la hoja	<i>Pyricularia oryzae</i>
	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>
	Complejo del Manchado de grano	<i>Fusarium</i> sp. <i>Pyricularia</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Helminthosporium</i> sp <i>Curvularia</i> sp.
	Sarocladium	<i>Sarocladium oryzae</i>

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR Y COSTA RICA:

CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>
	Complejo del Manchado de grano	<i>Fusarium</i> sp. <i>Pyricularia</i> sp. <i>Cercospora</i> sp. <i>Helminthosporium</i> sp <i>Curvularia</i> sp.

DOSIS RECOMENDADAS:

De 0.7 a 1.0 litro por hectárea. Puede ser asperjado en cualquier etapa del cultivo. Aplicar en diferenciación del primodio y máximo embuchamiento.

INTERVALO DE APLICACION:

JUWEL 25 SC puede aplicarse de manera preventiva o con la aparición de los primeros síntomas. Deben realizarse un máximo de 2 o 3 aplicaciones con intervalos de 10 o 15 días entre ellas. Respete el periodo de carencia.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Treinta y cinco (35 días) como mínimo.

INTERVALO DE REINGRESO:

Una vez que el producto sobre la superficie se haya secado.

FITOTOXICIDAD:

JUWEL 25 SC no es fitotóxico al cultivo del arroz. Evite la deriva de JUWEL 25 SC sobre cultivos susceptibles

como viñas, frutales, frijol y algunas hortalizas. Se ha determinado que la deriva de JUWEL 25 SC no produce fitotoxidad en cebolla, apio, espárrago, lechuga, melón, zanahoria y maíz y canola. No mezclar JUWEL 25 SC con herbicidas sulfonil ureas o Vulcano 70 % WG por posible fitotoxicidad al cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común en arroz. No es compatible con herbicidas sulfonil ureas. En caso de querer realizar mezclas se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previas a la mezcla comercial. Consulte al técnico autorizado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

JUWEL 25 SC no es inflamable ni corrosivo. No transporte ni almacene JUWEL 25 SC junto con alimentos para humanos ni animales, medicinas, ropa, calzado, artículos de uso doméstico o fertilizantes. Almacene en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado con su correspondiente panfleto. Almacene en un lugar seguro, fresco, seco y bien ventilado. Manéjelo con cuidado para evitar que se derrame, si esto sucede, cubra el producto derramado con aserrín o tierra, para absorber lo derramado y luego recoja en un envase plástico con tapa; disponga de él según la Legislación vigente o las instrucciones del distribuidor.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL
MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**

BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

No se conoce síntomas específicos de intoxicación en humanos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN:

Enjuagar la boca inmediatamente y después beber mucha agua. En **República Dominicana** dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito. Obtenga atención médica.

POR INHALACION:

Mantenga la calma. Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS:

Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL:

Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antidoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

Costa Rica:

Centro Nacional de Intoxicaciones

2223-1028/2222-0122/911

Guatemala:

Centro de Información Toxicológica

2232-0735 / 2251-3560

El Salvador:

Hospital San Rafael, Santa Tecla

2525-5800 ext. 148 y 149

Honduras:

Hospital Escuela

2232-2415 / 2232-2322

Nicaragua:

Centro Nacional de Toxicología

2289-7150 / 2289-3328

Panamá:

Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos

523-4948

República Dominicana:

Hospital Dr. Luis Aybar

681-2181

Hospital Dr. Francisco Moscoso P.

681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES

TÓXICO PARA CRUSTACEOS



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EL PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según las instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por causa o consecuencia del uso inadecuado o almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.

FORMULADO POR:**BASF Española S.A.****Ctra. Nacional 340 km 1156, 43006, Tarragona, España****IMPORTADO POR:****COSTA RICA:****BASF DE COSTA RICA S.A.**

Los Balcones, Plaza Roble, Escazú, San José de Costa Rica

Tel: 2201-1900, Fax: 2201-8221

GUATEMALA**BASF DE GUATEMALA.**

Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala.

Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

REPUBLICA DOMINICANA:**BASF DOMINICANA S.A.**

Av. Gustavo Mejía Ricart No. 11, Edif. Rogama, Tercer Nivel

Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: 334-1026, Fax: 334-1027

EL SALVADOR:**Agroquímica Internacional (AGRINTER).** Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador.**Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV).** 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.**Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV.** Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.**DISTRIBUIDO POR:****PAÍS****NÚMERO DE
REGISTRO****FECHA DE
REGISTRO****GUATEMALA****78-130****05-06-12****BELICE****EL SALVADOR****870224****23-02-12****HONDURAS****440-268-II****26-07-12****NICARAGUA****BA-287 C7-2006****23-06-06****COSTA RICA****870224****12-03-09****PANAMA****1917****27-09-06****REP. DOM.****2804****13-11-11**