

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

DUAL® GOLD 96 EC

HERBICIDA – CLOROACETANILIDA
S-METOLACHLOR

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE
SOLVENTE: Mezcla de hidrocarburos aromáticos (Máx. 42,0 g/L)
DENSIDAD: 1,10 g/mL a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: DUAL® GOLD 96 EC es un herbicida sistémico y residual, selectivo de la familia de las cloroacetanilidas. Controla numerosas malezas gramíneas y algunas malezas de hoja ancha que invaden los cultivos para los cuales se recomienda. DUAL® GOLD 96 EC es principalmente absorbido a través de los brotes de las plantas en germinación y de las semillas. Por lo tanto, las malezas mueren antes, durante o inmediatamente después de la emergencia. Su absorción vía raíces de malezas establecidas es baja.

EQUIPO DE APLICACIÓN: DUAL® GOLD 96 EC puede ser aplicado con mochilas de espalda o tractor. Use en los equipos de aplicación con agitador interno, boquillas de abanico plano. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.) Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular DUAL® GOLD 96 EC. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. En un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco de agua hasta que se forme una pasta uniforme. La misma se vierte en un tanque que esté lleno al 50% de su capacidad; agite y luego complete el agua a utilizar. Para aplicaciones terrestres, se recomienda usar volúmenes de mezcla arriba de 150 L/ha (28 galones/mz).



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:	
Maíz	<u>Zea mays</u>
Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>
Yuca	<u>Manihot esculenta</u>
MALEZAS:	
Coyolillo	<u>Cyperus rotundus</u>
Grama	<u>Cynodon dactylon</u>
Digitaria	<u>Digitaria horizontalis</u>
Zacate pinto	<u>Echinochloa colonum</u>
Caperonia	<u>Caperonia sp</u>
Hierba mora	<u>Solanum nigrum</u>
Borreria	<u>Spermacoce sp</u>
Cinquillo	<u>Drymaria cordata</u>
Bolsa mullaca	<u>Physalis sp</u>
Chiquizacillo	<u>Richardia scabra L.</u>
Venadillo	<u>Conyza bonaerensis</u>
Pega pega	<u>Desmodium turtuosum</u>
Paja cortadera	<u>Cyperus iria</u>

DOSIS RECOMENDADAS:
Maíz: 0.9 L/Ha en pre-emergencia total.

Caña de azúcar: 2,5 L/ha. Aplicar en pre-emergencia a la maleza. En post-emergencia temprana (malezas de 2-3 hojas) en mezcla con Gesapax® 50 SC.
Yuca: 2.5 – 3.0 l/ha. Aplicar en preemergencia a la maleza, en los primeros 45 días de siembra del cultivo.

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR:	
Maíz	<u>Zea mays</u>
MALEZAS:	
Coyolillo	<u>Cyperus rotundus</u>
Grama	<u>Cynodon dactylon</u>
Digitaria	<u>Digitaria horizontalis</u>
Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>
MALEZAS:	
Caminadora	<u>Rottboellia exaltata</u>
Caminadora	<u>Rottboellia cochinchinensis</u>

DOSIS RECOMENDADAS:
Maíz: 0.9 L/ha (0.63 L/mz) en pre-emergencia total.
Caña de azúcar: Caña de azúcar en pre-emergencia en dosis de 2,0 L/ha (1.4 L/mz) y post-emergencia temprana, en mezcla con GESAPAX® 50 SC a una dosis de 3,0 Litros de Producto Comercial/ha (2.1 L/mz).

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, HONDURAS Y PANAMÁ:	
Maíz	<u>Zea mays</u>
Sorgo *	<u>Sorghum spp</u>
Soya	<u>Glycine max</u>
Tomate	<u>Lycopersicum esculentum</u>
Algodón	<u>Gossypium hirsutum</u>
Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>

USOS AUTORIZADOS EN BELICE:	
Maíz	<u>Zea mays</u>
Sorgo *	<u>Sorghum spp</u>
Soya	<u>Glycine max</u>
Tomate	<u>Lycopersicum esculentum</u>
Algodón	<u>Gossypium hirsutum</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:	
Maíz	<u>Zea mays</u>
Sorgo *	<u>Sorghum spp</u>
Soya	<u>Glycine max</u>
Maní	<u>Arachis hipogaea</u>
Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:	
Maíz	<u>Zea mays</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>
Tomate	<u>Lycopersicum esculentum</u>
Cebolla, ajo	<u>Allium spp</u>
Tabaco	<u>Nicotiana tabacum</u>

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR:	
Ciperáceas:	
Coyolillo	<u>Cyperus feraz</u>
Junquillo	<u>Cyperus diffusus</u>
Cyperus	<u>Cyperus spp</u>
Fimbristilis	<u>Fimbristylis miliacea</u>
Gramíneas:	
Arrocillo	<u>Echinochloa spp</u>
Zacate de agua	<u>Echinochloa crus-galli</u>
Pangola	<u>Digitaria spp</u>
Cola de zorro	<u>Setaria spp</u>
Guinea	<u>Panicum spp</u>
Muela de caballo	<u>Brachiaria spp</u>
Mozote/Cadillo	<u>Cenchrus spp</u>
Cloris	<u>Chloris virgata</u>
Pata de gallina	<u>Eleusine indica</u>
Caminadora	<u>Rottboellia exaltata</u>
Caminadora	<u>Rottboellia cochinchinensis</u>
Zacate Johnson	<u>Sorghum halepense (semilla)</u>
Zacate Dulce	<u>Ixophorus unisetus</u>

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR:	
** Hojas anchas:	
Bolsa de pastor	<u>Capsella bursa-pastoris</u>
Verdolaga	<u>Portulaca oleracea</u>
Cenizo	<u>Chenopodium album</u>
Bledo	<u>Amaranthus sp</u>
Tomatillo	<u>Nicandra physaloides</u>

DOSIS RECOMENDADAS:
Maíz, sorgo*, maní, frijol: 0,9 – 1,8 L/ha (0,6 – 1,25 L/mz)
Soya, tomate, algodón: 0,9 – 1,55 L/ha (0,6 – 1,08 L/mz)
Cebolla, ajo: 0,6 – 1,25 L/ha (0,4 – 0,9 L/mz)
Tabaco: 1,2 – 1,5 L/ha (0,84 – 1,05 L/mz)
Caña de azúcar: 2,0 L/ha (1,4 L/mz)
Caña de azúcar/Nicaragua: 2,0 – 2,5 L/ha (1,4 – 1,75 L/mz). En post-emergencia temprana, en mezcla con **GESAPAX® 50 SC** a una dosis de 3,0 Litros de Producto Comercial/ha.

EPOCA DE APLICACIÓN:
Maíz, frijol: Pre-siembra incorporado o pre-emergencia de las malezas. Pre-emergencia, inmediatamente después de la siembra.
Sorgo*, soya, maní, algodón: Pre-siembra incorporado o pre-emergencia de las malezas.
Tomate: Pre-siembra incorporado o pre-emergencia de las malezas. Al momento del trasplante o 2-3 días después, pero antes de la emergencia de las malezas. En caso de que hayan germinado algunas gramíneas, mezcle **DUAL GOLD® 96 EC** con un graminicida post-emergente.
Cebolla, ajo, tabaco: Al momento del trasplante o 2-3 días después, pero antes de la emergencia de las malezas. En caso de que hayan germinado algunas gramíneas, mezcle **DUAL® GOLD 96 EC** con un graminicida post-emergente.
Caña de azúcar: En pre-emergencia a las malezas. En post-emergencia temprana, en mezcla con **GESAPAX® 50 SC**.
Yuca: Aplicar en preemergencia a la maleza, en los primeros 45 días de siembra del cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Una vez por ciclo. Aplíquese con buena humedad en el suelo 2-3 días después de la siembra. En el cultivo de maíz, puede mezclarse con **GESAPRIM** a 0,75 – 1,5 kg de ingrediente activo/ha para control de hojas anchas.
Si su campo está infestado de coyolillo/junquillo/cyperus, **DUAL® GOLD 96 EC** puede aplicarse 15 días antes de la siembra, utilizando la dosis más alta del rango. Después de la aplicación, se efectúan dos pases de rastra para incorporar el producto al suelo a una profundidad de 2-4 pulgadas.
En los cultivos de cebolla, tomate y tabaco **DUAL® GOLD 96 EC** no puede aplicarse sobre siembras por semilla. Se debe esperar 15-25 días para realizar las aplicaciones con **DUAL® GOLD 96 EC**. Aplíquese con buena humedad en el suelo.

* Sólo cuando se utilice semilla tratada con protectante **CONCEP III**.
** **NOTA:** Para ampliar el espectro de acción de **DUAL® GOLD 96 EC** contra hojas anchas, se recomienda mezclar con otro herbicida de acción selectiva al cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
No hay restricción alguna.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
No ingrese en áreas tratadas hasta transcurridas 24 horas, a menos que se use la ropa de protección adecuada.

FITOTOXICIDAD: **DUAL® GOLD 96 EC** es fitotóxico para cualquier otro cultivo no recomendado en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: **DUAL® GOLD 96 EC** es compatible con otros herbicidas comúnmente usados en los respectivos cultivos. Se recomienda revisar la compatibilidad localmente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
DUAL® GOLD 96 EC no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Transportelo y almacénelo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto. Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Puede causar sensibilización por contacto dermal, convulsiones y respiración rápida.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: Si es ingerido, acuda al médico inmediatamente y, si es posible, muestre el envase, su etiqueta o este panfleto. No provoque el vómito. Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón activado disuelto en grandes cantidades de agua.
POR INHALACIÓN: Retire al paciente del área contaminada, llévelo a una zona ventilada con aire fresco y protéjalo de la hipotermia. Manténgalo en reposo y vigile la respiración. Obtenga atención médica.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con abundante agua durante un período mínimo de 15 minutos. Obtenga atención médica inmediata.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos. Si la irritación persiste, contacte a un médico inmediatamente.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No existe antídoto específico. Aplique terapia sintomática.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	1-801-00-29832 2251-3560 y 2232-0735 231-548 y 231-639
Karl Heusner Memorial Hospital		622-460
Dr. Hurrisa Hailu		2231-9262
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	232-2322 y 232-2415
Hospital Escuela	HONDURAS	2289-4700, ext. 1294, 87550983
Centro Nacional de Toxicología	NICARAGUA	
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028
Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos		523-4948, 523-4968
Hospital Dr. Luis Aybar		684-3478 y 684-3672
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	DOMINICANA	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No aplique cerca de animales domésticos. No alimentar ganado en áreas que hayan sido tratadas con este producto, hasta transcurrida 1 semana después de efectuada la aplicación.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:
Syngenta, S.A.
Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia.
Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

IMPORTADO POR:
Guatemala:
Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel.
Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

Belice:
James Brodie & Cia. Ltda.
16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel.: 277-070; Fax: 275-593.

El Salvador:
Proagro, S. A.
Edificio Fertica. 5ª. Ave. Norte y 19 Calle Poniente,
San Salvador, El Salvador. Tel. 503 2234-0444

Honduras:

Nicaragua:
Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media
cuadra al sur, Managua Nicaragua.
Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:
Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-243	11-01-13
BELICE	0201-1	28-10-14
EL SALVADOR	AG-2012-08-933	10-08-12
HONDURAS	379-190-I	11-04-13
NICARAGUA	Sy-033D-1-99	03-09-12
COSTA RICA	870269	04-06-09
PANAMÁ	6082	29-11-11
REPUBLICA DOMINICANA	1971	10-09-14