

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



ORTHOCIDE 50 WP

FUNGICIDA – FTALAMIDA

CAPTAN

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

Este producto es un fungicida de contacto, con acción protectora y erradicante de amplio espectro. Afecta al hongo en la membrana citoplasmática y en la producción de energía.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Puede aplicarse con equipo de espalda o equipo terrestre acoplado a un tractor. Antes de cargar el equipo de aplicación cerciórese de que el mismo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. Utilice boquilla de cono hueco. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la llovizna de aspersión.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen. En un balde añada una cantidad pequeña de agua a la cantidad requerida de Orthocide 50 WP y mézclelos bien hasta obtener una pasta. Con el sistema de agitación en movimiento, pasa esta pasta a través del filtro hasta el interior del tanque, añada el agua necesaria para completar el volumen del tanque. No detenga el sistema de agitación. Si la bomba de aplicación se mantenido en reposo por algún tiempo, es necesario darle la agitación necesaria para homogenizar la mezcla antes de proceder con la aplicación. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El equipo y los utensilios en mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.

RECOMENDACIONES DE USO.

PAÍS: COSTA RICA.

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS
MANZANA <i>Prunus</i> sp	Roya del manzano	<u>Venturia inaequalis</u>	Aplique 240g/100 litros de agua; 1,5 kilogramos por hectárea. Tratamiento por inmersión por 1-2 minutos en una solución de Captan al 1-2%.
CÍTRICOS <i>Citrus</i> sp	Gomosis Viruela Antracnosis	<u>Phytophthora citrophthora</u> <u>Mycosphaerella fragariae</u> <u>Colletotrichum</u> spp	Aplique 240g/100 litros de agua; 1,5 kilogramos por hectárea. Tratamiento por inmersión por 1-2 minutos en una solución de Captan al 1-2%.
FRESA <i>Fragaria</i> sp	Tizón tardío Fusarium Pudrición de la fruta Mancha cercospora	<u>Phytophthora infestans</u> <u>Fusarium</u> spp <u>Botrytis cinerea</u> <u>Cercospora</u> spp	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1 Kg/ha.
TOMATE <u>Lycopersicum esculentum</u>	Pythium Tizón temprano Mal del talluelo Tizón tardío Pudrición de la fruta Antracnosis	<u>Pythium</u> sp <u>Alternaria solani</u> <u>Rhizoctonia</u> sp <u>Phytophthora infestans</u> <u>Botrytis cinerea</u> <u>Colletotrichum</u> spp	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1,5 Kg/ha.
MELÓN <u>Cucumis melo</u> SANDÍA <u>Citrullus vulgaris</u>	Pythium Mal del talluelo Mildiu velloso Mildiu velloso Viruela Fusarium	<u>Pythium</u> sp <u>Rhizoctonia</u> sp <u>Plasmopara viticola</u> <u>Pseudoperonospora cubensis</u> <u>Mycosphaerella fragariae</u> <u>Fusarium</u> spp	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1,5 Kg/ha.
CHILE <u>Capsicum annuum</u>	Mal del talluelo Tizón temprano Pudrición de la fruta Fusarium Antracnosis Mancha cercospora Gomosis	<u>Rhizoctonia</u> sp <u>Alternaria solani</u> <u>Botrytis cinerea</u> <u>Fusarium</u> spp <u>Colletotrichum</u> spp <u>Cercospora</u> spp <u>Phytophthora citrophthora</u>	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1,5 Kg/ha.
APIO <u>Apium graveolens</u>	Mancha septoria Mancha cercospora	<u>Septoria</u> spp <u>Cercospora</u> spp	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1 Kg/ha.
LECHUGA <u>Lactuca sativa</u>	Tizón temprano Pudrición de la fruta Mancha cercospora Mal del talluelo	<u>Alternaria solani</u> <u>Botrytis cinerea</u> <u>Cercospora</u> spp <u>Rhizoctonia</u> sp	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1,5 Kg/ha.

ZANAHORIA <u>Daucus carota</u>	Tizón temprano Mancha cercospora Mildiu velloso Mildiu velloso Mal del talluelo	<u>Alternaria solani</u> <u>Cercospora</u> spp <u>Plasmopara viticola</u> <u>Pseudoperonospora cubensis</u> <u>Rhizoctonia</u> sp	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1,5 Kg/ha.
CEBOLLA <u>Allium cepa</u>	Tizón temprano Pudrición de la fruta Mildiu velloso Mildiu velloso Pudrición de la fruta Mal del talluelo	<u>Alternaria solani</u> <u>Botrytis cinerea</u> <u>Plasmopara viticola</u> <u>Pseudoperonospora cubensis</u> <u>Botrytis cinerea</u> <u>Rhizoctonia</u> sp	Utilice 240g en 100 litros de agua, 1 Kg/ha.
SOYA <u>Glycine max</u>	Tizón temprano Pudrición de la fruta Mancha cercospora Fusarium Antracnosis Mildiu velloso Mildiu velloso Pudrición de la fruta Mal del talluelo Pythium	<u>Alternaria solani</u> <u>Botrytis cinerea</u> <u>Cercospora</u> spp <u>Fusarium</u> spp <u>Colletotrichum</u> spp <u>Plasmopara viticola</u> <u>Pseudoperonospora cubensis</u> <u>Botrytis cinerea</u> <u>Rhizoctonia</u> sp <u>Pythium</u> sp	Utilice 240g en 100 litros de agua.
AGUACATE <u>Persea americana</u>	Antracnosis Tizón tardío	<u>Colletotrichum</u> spp <u>Phytophthora infestans</u>	Utilice 240g en 100 litros de agua.

ÉPOCA DE APLICACIÓN.

Se aplica al aparecer los primeros síntomas y repite cada 8-15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA.

El período de seguridad entre la última aplicación y cosecha es de 7 días en todos los cultivos.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Espere a que se seque el rocío aplicado sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico en dosis y cultivos aquí recomendados.

COMPATIBILIDAD.

No mezclar con productos fuertemente alcalinos como el caldo bordelés.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Peligros físico-químicos.

Este producto no es inflamable, no es explosivo ni corrosivo.

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios domésticos. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Diarrea, mareos y vómito si se ingiere. Irritación de piel y ojos.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provoque el vómito dando a beber suficiente agua y tocando la parte posterior de la garganta con el dedo o algún objeto no punzante. **Inhalación:** Retire a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesaria administre respiración artificial.

Contacto con la piel: Quítese las prendas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón. **Contacto con los ojos:** Lávese inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica en todo caso.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO.

Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

INSTITUCIÓN	PAÍS	NÚMERO DE TELÉFONO
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

Tóxico para peces.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad no menor de 40 centímetros del borde superior del mismo, lejos de fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas y casas de habitación. Recoja los derrames de producto o remanentes no utilizables con aserrín, tierra o algún otro material absorbente y entierre en forma similar a los envases desechados.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA.

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.

FORMULADOR: IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: FORMULACIONES QUÍMICAS S.A. Chomes, Puntarenas, Costa Rica. Tel: 2231-1625 • 2638-8283	DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica. info@agrodac.com • www.agrodac.com
--	---

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	NÚMERO DE PERMISO DE REEMPAQUE
Costa Rica	2902	06/11/95	8