

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DAC ETEFON 48 SL
REGULADOR DE CRECIMIENTO – FOSFÓNICO
ETHEPHON

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,21/1,22 A 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.
MODO DE ACCIÓN: DAC ETEFON 48 SL, es un regulador de crecimiento que estimula la producción de etileno en las plantas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado con equipo manual, equipo acoplado a un tractor. El volumen de aplicación varía de los 400 - 600 litros/ha. Utilice en el rociador la boquilla más fina. Cerciórese de que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Este producto es corrosivo y produce gases inflamables a altas temperaturas en contacto con sustancias alcalinas. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la llovizna de aspersión.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta la mitad del agua necesaria en el tanque de la rociadora y agregue la dosis recomendada del producto, finalmente agregue agua hasta completar el volumen del tanque de la rociadora. Agite frecuentemente para mantener la mezcla homogénea. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. El equipo y los utensilios usados en la mezcla y aplicación de este producto deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Durante la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa.



RECOMENDACIONES DE USO: Aplicaciones para uso para Costa Rica.

CULTIVOS	DOSIS		RECOMENDACIONES
PIÑA <i>Ananas comosus</i>	Inducción final	15 ml/15 litros de agua mezclado con 400 gramos de Urea.	Aplique 50 ml de esta mezcla dirigido al cono floral. Aplique en horas muy avanzadas de la tarde con un mínimo de sol, o preferiblemente de noche para mejores resultados. El pH de la solución debe ser 8.
	Maduración	15-30 ml/15 litros de agua.	Aplique esta mezcla dirigida a la fruta de forma uniforme, preferiblemente en horas de la mañana. El pH de la solución debe ser de 2-3.
TABACO <i>Nicotiana tabacum</i>	2-6 litros/100 litros de agua/ha.		Aplique las dosis más elevadas en condiciones difíciles de maduración, como nitrógeno muy elevado, exceso de fertilización o clima muy riguroso.
TOMATE <i>Lycopersicum esculentum</i>	1-2 litros/ha.		Para la maduración del fruto, realice una buena cobertura de esto con la aplicación.

“EL USO DE ESTE PRODUCTO EN EL CULTIVO DEL CAFÉ ESTÁ PROHIBIDO”

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: En piña se aplica para realizar la inducción de la floración y la maduración de los frutos. En el caso del tabaco se hace con la finalidad de provocar su maduración. En el tomate es de 7-14 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en dosis y cultivos aquí recomendados.
COMPATIBILIDAD: No es compatible con sales alcalinas, se recomienda aplicar el producto solo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso domésticos. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos (fungicidas, insecticidas). Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de niños, personas discapacitadas y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Diarrea, vómitos, irritación de piel, además puede causar irritación de la membrana mucosa.
PRIMEROS AUXILIOS:
INGESTIÓN: Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provoque el vómito dado a beber suficiente agua y tocando la parte posterior de la garganta con el dedo o algún objeto no punzocortante.

INHALACIÓN: Retire a la persona afectada a un lugar seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL: Retire las prendas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No hay antídoto específico para este producto. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
Nombre de la institución País No. Teléfono
Centro Nacional de Intoxicaciones Ministerio de Salud Costa Rica (506) 2223-1026

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforéelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADO POR: PHYT ORUS S.A.
4500 000 F R. C.S. Meaux B 341 669 916 Biret 341 669 916 00035, Francia.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
PAÍS NO. REGISTRO FECHA DE REGISTRO
Costa Rica 3820 16-01-96