

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

BASF

We create chemistry

HEAT® 70 WG

HERBICIDA - URACILO
SAFLUFENACIL

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Herbicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

El Heat® 70 WG es un herbicida perteneciente al grupo de las pirimidonas para el control de hojas anchas y ciperáceas de reproducción sexual, de aplicación pre-ermergente al cultivo y pre y post emergente a la maleza. El ingrediente activo del Heat® 70 WG, el saflufenacil, es rápidamente absorbido por el follaje y las raíces y exhibe una buena movilidad dentro de la planta, además tiene una buena acción por contacto. El mecanismo de acción del Heat® 70 WG se basa en ser un potente inhibidor de la PPO (Protoporphyrinogen-IX-Oxidase), la cual es una enzima necesaria para la biosíntesis de la clorofila en las plantas. Los resultados en la planta, son una rápida desintegración de la membrana celular, dando como resultado necrosis y finalmente la muerte de la planta.

Saflufenacil está clasificado dentro del grupo químico E de acuerdo con HRAC. Rotar con productos químicos diferentes del grupo químico E. No seguir estas indicaciones incrementa el riesgo de resistencia de las plagas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Heat® 70 WG puede ser aplicado con equipo manual, terrestre o aéreo. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Antes de utilizar el equipo de aspersión, asegure que esté en buen estado de funcionamiento y calíbrelo para asegurar que aplica la dosis correcta. En aplicaciones aéreas el volumen de caldo no debe ser menos de 50 L/ha (35 L/mz), en aplicaciones terrestres use un mínimo de 200 a 300 L/ha (140 a 210 L/mz). Se recomienda utilizar una boquilla de abanico plano. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar calibre el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Verifique la dirección del viento para evitar posibles daños de deriva a cultivos cercanos. Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular, Heat® 70 WG. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Antes de manipular y utilizar Heat® 70 WG póngase el equipo de protección personal. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con el producto concentrado o diluido y con la niebla de aspersión. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación del producto.

1. Llene el tanque del equipo hasta la mitad con agua.
2. Agregue la dosis recomendada de Heat® 70 WG agitando continuamente.
3. Agregar Dash 37.5 EC (en caso de que haya emergencia abundante de malezas, para favorecer la aplicación y acción, utilice en aplicaciones previas al cultivo y post a la maleza) en una dosis de 0,2% a 0,35% volumen/volumen por hectárea.

4. Complete el volumen de agua y continúe agitando hasta homogenizar la mezcla

5. Se recomienda utilizar un pH del agua entre 5 y 7

Después de la aplicación lave el equipo de aplicación con agua y detergente por dentro y por fuera, dele el mantenimiento recomendado (limpieza de boquillas y filtros, engrase, etc.) déjelo secar y guárdelo.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Eclipta	<i>Eclipta alba</i>	100-125 gramos de Heat® 70 WG /ha. utilizar un volumen de agua de 200 L/ha. (140 L/mz)

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Aplicar en pre-emergencia absoluta al cultivo. Mezcle con Prowl 45.5 CS para lograr control de poáceas.

Maíz <i>Zea mays</i>	HOJA ANCHA:		40-80 g de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 200 a 300 L/Ha. (140 a 210 L/mz)
	<i>Euphorbia hirta</i>		
	<i>Amaranthus spp</i>		
	<i>Baltimora recta</i>		
	<i>Melampodium divaricatum</i>		
	<i>Portulaca oleracea</i>		
	<i>Ipomoea spp</i>		
	<i>Chenopodium spp</i>		
	<i>Bidens pilosa</i>		
	<i>Sonchus oleraceaus</i>		
	<i>Sida acuta</i>		

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE AREAS DE SIEMBRA:

Aplicar Heat® 70 WG antes de la siembra en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paraquat con el propósito de ampliar el control de las malezas gramíneas. Si la siembra se realiza en mínima labranza o dentro de la malezas se debe aplicar Heat® 70 WG en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o Paraquat para ampliar el control de malezas gramíneas ya nacidas. Se recomienda adicionar Prowl® 45.5 CS para dejar un sello preemergente a dosis de 2.0 L/ha (1.4 L/mz) con fines de aumentar la residualidad de control de malezas gramíneas.

APLICACIÓN DENTRO DEL CULTIVO:

Aplicar Heat® 70 WG cuando el maíz tenga más de 75 días de siembra o en Guatemala al momento de la dobla para la preparación de área de segunda siembra de frijol y maíz. La aplicación se realiza de manera general dentro del cultivo en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paraquat con fines de ampliar y mantener buen control durante 30 días de malezas poáceas de reproducción sexual (alturas de 15 a 30 cm), tales como caminadora (*Rottboellia* sp.), plumilla (*Leptochloa filiformis*) y zacate de agua (*Ixophorus unisetus*).

Café <i>Coffea arabica</i>	Siempre viva	<i>Commelina spp.</i>	70 gramos de Heat® 70 WG utilizar un volumen de agua entre 300 - 400 L/ha. (210 a 280 L/mz)
	Bejuco	<i>Ipomoea spp.</i>	
	Oxalis	<i>Oxalis corniculata</i>	
	Comemano	<i>Cissus sp</i>	
	Tripa de gallina	<i>Stigmaphyllon lindenianum</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG puede ser aplicado sobre malezas de hoja ancha, en post-emergencia temprana. Para mejorar su efectividad y espectro de acción, sobre malezas de hoja ancha y gramíneas, en post-emergencia media y tardía, mezclarlo con Glifosato 35.6 SL en dosis de 534 a 712 grs i.a./Ha (1.5 a 2 lts/ha). La mezcla de Heat® 70 WG con Glifosato 35.6 SL, puede ser aplicada en post-emergencia al cultivo, utilizando campana o boquilla de espuma, para evitar el contacto con las bandolas inferiores (en cafetales jóvenes de 1 a 3 años de transplante). Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash 37.5 EC, a concentración de 0.5 % v/v.

Palma aceitera <i>Elaeis guineensis</i> <i>Jacq</i>	Malezas de hojas anchas	40 – 100 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 400 L/ha. (280 L/mz)
---	-------------------------	--

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Las aplicaciones de Heat® 70 WG van dirigidas a la rodaja, entendiéndose por rodaja el área circular alrededor del tallo de la planta de palma aceitera con un radio de 2.0 a 2.5 metros. Realizar de 1 a 2 aplicaciones por semestre.		
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	<i>Ageratum spp</i>	40 – 100 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 150-200 lts/Ha. (105 a 140 l/mz)
	<i>Chamaecybe spp</i>	
	<i>Cleome viscosa L</i>	
	<i>Sida spp</i>	
	<i>Baltimora recta</i>	
	<i>Melampodium divaricatum</i>	
	<i>Portulaca oleracea</i>	
	<i>Ipomoea spp</i>	
	<i>Portulaca oleracea</i>	
	<i>Ipomoea spp</i>	
	<i>Croton lobatus</i>	
	<i>Chenopodium spp</i>	
	<i>Bidens pilosa</i>	
	<i>Sonchus oleraceus</i>	
<i>Cucumis sp</i>		
<i>Phyllanthus spp</i>		
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG debe ser aplicado en preemergencia a la caña, y en pre y post-emergencia temprana a la malezas. Heat® 70 WG es compatible con todos los herbicidas preemergentes utilizados en caña de azúcar. Si existen problemas con las gramíneas de reproducción sexual, aplicarlo, en mezcla con Prowl 50 EC Prowl 45.5 CS en dosis de 2 a 3 L/Ha (en preemergencia a la maleza amínea). Para aplicaciones en soca debe mezclarse con Plateau 70 WG en total preemergencia de la caña y de la maleza.		
APLICACIONES DE CIERRE: Heat® 70 WG es ideal para las aplicaciones de cierre del cultivo, donde se puede combinar con cualquier producto preemergente. Su alta movilidad biológica le permite controlar malezas de tipo vejuco sin requerir su aplicación directa sobre el cultivo, con esto se logra disminuir el daño a la caña y la eficiencia en el costo y el rendimiento de la mano de obra.		
MINIMA LABRANZA Y RONDAS Y QUINELES: Heat® 70 WG es ideal para control de las malezas postemergentes en mezcla con Arsenal® 24 SL y Glifosato 35.6 SL, para ampliar el espectro de control (hojas anchas y gramíneas) porque no existe antagonismo debido a los mecanismos de acción totalmente diferentes. Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash 37.5 EC, a concentración de 0.5 % v/v.		

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG debe ser aplicado en preemergencia a la caña, y en pre y post-emergencia temprana a la malezas. Heat® 70 WG es compatible con todos los herbicidas preemergentes utilizados en caña de azúcar. Si existen problemas con las gramíneas de reproducción sexual, aplicarlo, en mezcla con Prowl 50 EC o Prowl 45.5 CS en dosis de 2 a 3 L/Ha (en preemergencia a la maleza gramínea). Para aplicaciones en soca debe mezclarse con Plateau 70 WG en total preemergencia de la caña y de la maleza.

APLICACIONES DE CIERRE: Heat® 70 WG es ideal para las aplicaciones de cierre del cultivo, donde se puede combinar con cualquier producto preemergente. Su alta movilidad biológica le permite controlar malezas de tipo vejuco sin requerir su aplicación directa sobre el cultivo, con esto se logra disminuir el daño a la caña y la eficiencia en el costo y el rendimiento de la mano de obra.

MINIMA LABRANZA Y RONDAS Y QUINELES: Heat® 70 WG, es ideal para control de las malezas postemergentes en mezcla con Arsenal® 24 SL y Glifosato 35.6 SL, para ampliar el espectro de control (hojas anchas y gramíneas) porque no existe antagonismo debido a los mecanismos de acción totalmente diferentes. Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash 37.5 EC, a concentración de 0.5 % v/v.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Fimbristilis	<i>Fimbristylis spp</i>	100-150 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 300 L/Ha. (210 L/mz)
	Eclipta	<i>Eclipta alba</i>	
	Buche de gallina, lechuga de agua, riñón, oreja de ratón	<i>Heteranthera spp</i>	
	Comelina	<i>Commelina spp</i>	
	Cama de venado, maguey de agua, palo bobo, pega-pega, tamarindillo	<i>Aeschynomene spp</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus spinosus</i>	
	Frijolillo	<i>Cassia guatemalensis</i>	
	Santa Lucia	<i>Ageratum conyzoides</i>	
	Campanilla Quinamul	<i>Convolvulaceae sp.</i>	
	Sensitiva, Zarza dormilona	<i>Mimosa sp.</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Aplicar en pre-emergencia absoluta al cultivo. Mezcle con Prowl 45.5 CS para lograr control de poáceas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA
Maíz <i>Zea mays</i>	HOJA ANCHA: Bledo <i>Amaranthus spinosus</i> Bejuco, campanita <i>Hipomoea spp.</i> Escobilla, escoba <i>Sida acuta</i> Flor amarilla <i>Melampodium divaricatum</i> Hierba de pollo <i>Commelina diffusa</i> Verdolaga de playa <i>Kallstroemia maxima</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Girasol <i>Helianthus annuus</i> Titonia, flor amarilla <i>Tithonia tubaeformis</i> Pica-pica <i>Mucura pruriens</i> Dormilona <i>Mimosa pudica</i>	35 – 50 g de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 285 L/Ha. (199.5 L/mz)
	GRAMINEAS: Gramilla, pangola <i>Digitaria sanguinalis</i> Pasto hoduras <i>Ixophorus unisetus</i> Bermuda <i>Cynodon dactylon</i>	

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	35-71 gramos de Heat® 70 WG /ha (25 a 50 g.i.a/Ha) utilizar un volumen de agua de 200 a 230 lts/Ha. (140 a 161 lts/mz)
	Verdolaga de playa	<i>Kallstroemia maxima</i>	
	Pascuita	<i>Croton lobatus</i>	
	Bejuco	<i>Ipomoea nil</i>	
	Hierba de golondrina	<i>Euphorbia sp</i>	
	Meloncillo	<i>Cucumis sp</i>	
	Bellotía, pepinillo	<i>Momordica charantia</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus sp</i>	
	Mozote, moriseco	<i>Bidens pilosa</i>	
	Miltomate de monte	<i>Physalis angulata</i>	
	Culantrillo	<i>Molugo verticillata</i>	
	Escobilla, escoba	<i>Sida acuta</i>	
	Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	
	Botoncillo	<i>Richardia scabra</i>	
	Frijolillo, pega-pega	<i>Desmodium tortuosum</i>	

	Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Zacate pinto <i>Echinochloa colonum</i> Zacate de agua <i>Echinochloa crus-galli</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i>	
--	---	--

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE ÁREAS DE SIEMBRA:

Aplicar Heat® 70 WG antes de la siembra en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paracuat con el propósito de ampliar el control de las malezas gramíneas.

Si la siembra se realiza en mínima labranza o dentro de la malezas se debe aplicar Heat® 70 WG en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o Paracuat para ampliar el control de malezas gramíneas ya nacidas. Se recomienda adicionar Prowl® 45.5 CS para dejar un sello preemergente a dosis de 2.0 L/ha con fines de aumentar la residualidad de control de malezas gramíneas.

APLICACIÓN DENTRO DEL CULTIVO:

Aplicar Heat® 70 WG cuando el maíz tenga más de 75 días de siembra o en Guatemala al momento de la doble para la preparación de área de segunda siembra de frijol y maíz. La aplicación se realiza de manera general dentro del cultivo en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paracuat con fines de ampliar y mantener buen control durante 30 días de malezas poáceas de reproducción sexual (alturas de 15 a 30 cm), tales como caminadora (*Rottboellia* sp.), plumilla (*Leptochloa filiformis*) y zacate de agua (*Ixophorus unisetus*).

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA
Palma aceitera <i>Elaeis guineensis</i> Jacq	<i>Hybanthus attenuatus</i> <i>Euphorbia graminea</i> <i>Boerhavia erecta</i> <i>Sida</i> spp. <i>Malva</i> spp. <i>Richardia scabra</i> <i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> <i>Panicum</i> spp. <i>Digitaria</i> spp. <i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>	70 gr/ha de Heat® 70 WG . Aplicado en mezcla con 2.0 lts/ha, (1.4 L/mz) de Glifosato o Paraquat para lograr un mejor espectro de acción en hojas anchas y gramíneas. utilizar un volumen de agua de 190 a 286 L/ha. (133 a 200.2 L/mz).

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Las aplicaciones Heat® 70 WG van dirigidas a la rodaja, entiéndase por rodaja el área circular alrededor del tallo de la planta de palma aceitera con un radio de 2.0 a 2.5 metros. Realizar de 1 a 2 aplicaciones por semestre.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Café <i>Coffea arabica</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	35-71 gramos de Heat® 70 WG /ha (25 a 50 g.i.a/ha) utilizar un volumen de agua de 286 L/ha. (200.2 L/mz)
	Pascuita	<i>Croton lobatus</i>	
	Bejuco	<i>Ipomoea nil</i>	
	Hierba de golondrina	<i>Euphorbia</i> sp	
	Bledo	<i>Amaranthus</i> sp	
	Mozote, moriseco	<i>Bidens pilosa</i>	
	Miltomate de monte	<i>Physalis angulata</i>	
	Escobilla, escoba	<i>Sida acuta</i>	
	Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	
	Botoncillo	<i>Richardia scabra</i>	
	Frijolillo, pega-pega	<i>Desmodium tortuosum</i>	
	Virginia	<i>Acalypha alopecuroides</i>	
	Chupamiel, hierba buenilla	<i>Cuphea micrantha</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG puede ser aplicado sobre malezas de hoja ancha, en post-emergencia temprana. Para mejorar su efectividad y espectro de acción, sobre malezas de hoja ancha y gramíneas, en post-emergencia media y tardía, mezclarlo con Glifosato 35.6 SL en dosis de 534 a 712 grs i.a./Ha (1.5 a 2 lts/ha). La mezcla Heat® 70 WG con Glifosato 35.6 SL, puede ser aplicada en post-emergencia al cultivo, utilizando campana o boquilla de espuma, para evitar el contacto con las bandolas inferiores (en cafetales jóvenes de 1 a 3 años de transplante). Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash 37.5 EC, a concentración de 0.5 % v/v.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Cítricos <i>Citrus</i> spp	Conyza	<i>Conyza apurensis</i>	35-70 gramos de Heat® 70 WG / ha utilizar un volumen de agua 286 l/ha (200.2 L/mz).
	Hierba de golondrina, Lechosa	<i>Euphorbia hirta</i>	
	Pepperonia	<i>Pepperonia</i> spp	
	Pilea	<i>Pilea</i> spp	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Las aplicaciones Heat® 70 WG van dirigidas a la rodaja dentro de la línea de goteo del árbol evitando aplicar las hojas bajas. En mezcla con una fuente de glifosato a 534 g i.a/ha y Dash® 37,5 EC. El volumen total a utilizar es de 200 litros/ha.

CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	35 – 70 gramos de Heat® 70 WG /ha (24.5 – 49 gr/mz) utilizar un volumen de agua de 94 L/ha.	Realizar una aplicación en pre-cosecha, Volumen de agua de 240-450 L/ha (168-315 L/mz). No aplicar el producto en papas destinadas a producción de semilla.

USOS AUTORIZADOS EN HONDURAS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	35-71 gramos de Heat® 70 WG /ha (25 a 50 g.i.a/ha) utilizar un volumen de agua de 200 a 230 lts/ha. (140 a 161 lts/mz)
	Verdolaga de playa	<i>Kallstroemia maxima</i>	
	Pascuita	<i>Croton lobatus</i>	
	Bejuco	<i>Ipomoea nil</i>	
	Hierba de golondrina	<i>Euphorbia</i> sp	
	Meloncillo	<i>Cucumis</i> sp	
	Bellotía, pepinillo	<i>Momordica charantia</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus</i> sp	
	Mozote, moriseco	<i>Bidens pilosa</i>	
	Miltomate de monte	<i>Physalis angulata</i>	
	Culantrillo	<i>Molugo verticillata</i>	
	Escobilla, escoba	<i>Sida acuta</i>	
	Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	
	Botoncillo	<i>Richardia scabra</i>	
	Frijolillo, pega-pega	<i>Desmodium tortuosum</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG debe ser aplicado en preemergencia a la caña, y en pre y post-emergencia temprana a la malezas. Heat® 70 WG es compatible con todos los herbicidas preemergentes utilizados en caña de azúcar. Si existen problemas con las gramíneas de reproducción sexual, aplicarlo, en mezcla con Prowl 50 EC o Prowl 45.5 CS en dosis de 2 a 3 L/Ha (en preemergencia a la maleza gramínea). Para aplicaciones en soca debe mezclarse con Plateau 70 WG en total preemergencia de la caña y de la maleza.

APLICACIONES DE CIERRE: Heat® 70 WG es ideal para las aplicaciones de cierre del cultivo, donde se puede combinar con cualquier producto preemergente. Su alta movilidad biológica le permite controlar malezas de tipo vejugo sin requerir su aplicación directa sobre el cultivo, con esto se logra disminuir el daño a la caña y la eficiencia en el costo y el rendimiento de la mano de obra.

MINIMA LABRANZA Y RONDAS Y QUINELES: Heat® 70 WG, es ideal para control de las malezas postemergentes en mezcla con Arsenal® 24 SL y Glifosato 35.6 SL, para ampliar el espectro de control (hojas anchas y gramíneas) porque no existe antagonismo debido a los mecanismos de acción totalmente diferentes. Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash 37.5 EC, a concentración de 0.5 % v/v.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Fimbristilis	<i>Fimbristylis spp</i>	100-150 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 300 L/Ha. (210 L/mz)
	Eclipta	<i>Eclipta alba</i>	
	Buche de gallina, lechuga de agua, riñón, oreja de ratón	<i>Heteranthera spp</i>	
	Comelina	<i>Commelina spp</i>	
	Cama de venado, maguey de agua, palo bobo, pega-pega, tamarindillo	<i>Aeschynomene spp</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus spinosus</i>	
	Frijolillo	<i>Cassia guatemalensis</i>	
	Santa Lucia	<i>Ageratum conyzoides</i>	
	Campanilla Quinamul	<i>Convolvulaceae sp.</i>	
	Sensitiva, Zarza dormilona	<i>Mimosa sp.</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Aplicar en pre-emergencia absoluta al cultivo. Mezcle con Prowl 45.5 CS para lograr control de poáceas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA
Maíz <i>Zea mays</i>	HOJA ANCHA: Bledo <i>Amaranthus spinosus</i> Bejuco, campanita <i>Hipomoea spp.</i> Escobilla, escoba <i>Sida acuta</i> Flor amarilla <i>Melampodium divaricatum</i> Hierba de pollo <i>Commelina diffusa</i> Verdolaga de playa <i>Kallstroemia maxima</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Girasol <i>Helianthus annuus</i> Titonia, flor amarilla <i>Tithonia tubaeformis</i> Pica-pica <i>Mucura pruriens</i> Dormilona <i>Mimosa pudica</i>	35 – 50 g de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 285 L/Ha. (199.5 L/mz)
	GRAMINEAS: Gramilla, pangola <i>Digitaria sanguinalis</i> Pasto hoduras <i>Ixophorus unisetus</i> Bermuda <i>Cynodon dactylon</i>	

Caminadora *Rottboellia cochinchinensis*
Zacate pinto *Echinochloa colorum*
Zacate de agua *Echinochloa crus-galli*
Pata de gallina *Eleusine indica*
Plumilla *Leptochloa filiformis*

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE AREAS DE SIEMBRA:

Aplicar Heat® 70 WG antes de la siembra en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paracuat con el propósito de ampliar el control de las malezas gramíneas.

Si la siembra se realiza en mínima labranza o dentro de la malezas se debe aplicar Heat® 70 WG en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o Paracuat para ampliar el control de malezas gramíneas ya nacidas. Se recomienda adicionar Prowl® 45.5 CS para dejar un sello preemergente a dosis de 2.0 L/ha con fines de aumentar la residualidad de control de malezas gramíneas.

APLICACIÓN DENTRO DEL CULTIVO:

Aplicar Heat® 70 WG cuando el maíz tenga más de 75 días de siembra o en Guatemala al momento de la dobla para la preparación de área de segunda siembra de frijol y maíz. La aplicación se realiza de manera general dentro del cultivo en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paracuat con fines de ampliar y mantener buen control durante 30 días de malezas poáceas de reproducción sexual (alturas de 15 a 30 cm), tales como caminadora (*Rottboellia sp.*), plumilla (*Leptochloa filiformis*) y zacate de agua (*Ixophorus unisetus*).

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Café <i>Coffea arabica</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	50 a 70 gr/ha de Heat® 70 WG utilizar un volumen de agua de 200 L/Ha. (140 L/mz)
	Pascuita	<i>Croton lobatus</i>	
	Bejuco	<i>Ipomoea nil</i>	
	Hierba de golondrina	<i>Euphorbia sp</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus sp</i>	
	Mozote, moriseco	<i>Bidens pilosa</i>	
	Miltomate de monte	<i>Physalis angulata</i>	
	Escobilla, escoba	<i>Sida acuta</i>	
	Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	
	Botoncillo	<i>Richardia scabra</i>	
	Frijolillo, pega-pega	<i>Desmodium tortuosum</i>	
	Virginia	<i>Acalypha alopecuroides</i>	
	Chupamiel, hierba buenilla	<i>Cuphea micrantha</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG puede ser aplicado sobre malezas de hoja ancha, en post-emergencia temprana. Para mejorar su efectividad y espectro de acción, sobre malezas de hoja ancha y gramíneas, en post-emergencia media y tardía, mezclarlo con Glifosato 35.6 SL en dosis de 534 a 712 grs i.a./Ha (1.5 a 2 lts/Ha). La mezcla de Heat® 70 WG con Glifosato 35.6 SL, puede ser aplicada en post-emergencia al cultivo, utilizando campana o boquilla de espuma, para evitar el contacto con las bandolas inferiores (en cafetales jóvenes de 1 a 3 años de transplante). Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash 37.5 EC, a concentración de 0.5 % v/v.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Cítricos <i>Citrus spp</i>	Conyza	<i>Conyza apurensis</i>	35-70 gramos de Heat® 70 WG / ha utilizar un volumen de agua entre 175 - 286 L/Ha. (200.2 L/mz)
	Hierba de golondrina, Lechosa	<i>Euphorbia hirta</i>	
	Pepperonia	<i>Pepperonia spp</i>	
	Pilea	<i>Pilea spp</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Las aplicaciones Heat® 70 WG van dirigidas a la rodaja dentro de la línea de goteo del árbol evitando aplicar las hojas bajas. En mezcla con una fuente de glifosato a 534 g i.a/ha y Dash® 37,5 EC. El volumen total a utilizar es de 200 litros/ha.		
CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA
Palma aceitera <i>Elaeis guineensis</i> Jacq	<i>Hybanthus attenuatus</i> <i>Euphorbia graminea</i> <i>Boerhavia erecta</i> <i>Sida spp.</i> <i>Malva spp.</i> <i>Richardia scabra</i> <i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> <i>Panicum spp</i> <i>Digitaria spp</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i>	70 gr/ha de Heat® 70 WG . Aplicado en mezcla con 2.0 lts/ha, (1.4 L/mz) de Glifosato o Paraquat para lograr un mejor espectro de acción en hojas anchas y gramíneas. utilizar un volumen de agua de 190 a 286 L/ha. (133 a 200.2 L/mz).
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Las aplicaciones Heat® 70 WG van dirigidas a la rodaja, entiéndase por rodaja el área circular alrededor del tallo de la planta de palma aceitera con un radio de 2.0 a 2.5 metros. Realizar de 1 a 2 aplicaciones por semestre.		
CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	35 – 70 gramos de Heat® 70 WG /ha (24.5 – 49 gr/mz) utilizar un volumen de agua de 94 L/ha.	Realizar una aplicación en pre-cosecha, Volumen de agua de 240-450 L/ha (168-315 L/mz). No aplicar el producto en papas destinadas a producción de semilla.

	Caperonia (<i>Caperonia palustris</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa colona</i>) Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>) Coyolillo (<i>Cyperus iria</i>)			
Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	Borlita (<i>Emilia sonchifolia</i>)	0,35 – 0,50 Kg/ha	250 L/ha. (175 L/mz)	Aplicación terrestre. 1 aplicación post-emergencia cuando la maleza tenga de 10 a 20 cm. Las aplicaciones van dirigidas a la rodaja dentro de la línea de goteo del árbol evitando aplicar las hojas bajas. La dosis debe estar calculada con base en el área efectiva de aplicación (rodaja).

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

CULTIVO			
CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Fimbristilis, Barba de Indio	<i>Fimbristylis spp</i>	100 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 200 L/Ha. (140 L/mz)
	Palo de agua	<i>Ludwigia spp</i>	
	Caperonia	<i>Caperonia palustris</i>	
	Boton blanco	<i>Eclipta alba</i>	
	Hierba de golondrina, Lechosa	<i>Euphorbia spp</i>	
	Hierba de sapo	<i>Chamaesyce hirta</i>	
	Cola de alacrán	<i>Heliotropium indicum</i>	
	Buche de gallina, lechuga de agua, riñón, oreja de ratón	<i>Heteranthera spp</i>	
	Cangrejillo	<i>Murdannia nudiflora</i>	
	Botoncillo	<i>Ammania coccinea</i>	
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Aplicar en pre-emergencia absoluta al cultivo. Mezcle con Prowl 45.5 CS para lograr control de poáceas.			

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Bledo	<i>Amaranthus spinosus</i>	100-150 gramos de Heat® 70 WG /ha (70 a 105 gramos/mz) utilizar un volumen de agua de 300 L/ha. (210 L/mz)
	Frijolillo	<i>Cassia guatemalensis</i>	
	Santa Lucía	<i>Ageratum conyzoides</i>	
	Campanilla Quinamul	<i>Convolvulaceae sp</i>	
Maíz <i>Zea mays</i>	HOJA ANCHA: Flor amarilla <i>Melampodium divaricatum</i> Flor amarilla <i>Cleome viscosa</i> Pascua <i>Euphorbia heterophylla</i> Pata de paloma <i>Boerhavia erecta</i> Flor morada <i>Hybanthus attenuatus</i>		35 - 50 gramos de Heat® 70 WG /ha (24.5 - 35 g i.a/mz) utilizar un volumen de agua de 285 L/ha. (199.5 L/mz)

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE AREAS DE SIEMBRA:

Aplicar Heat® 70 WG antes de la siembra en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paraquat con el propósito de ampliar el control de las malezas gramíneas.

Si la siembra se realiza en mínima labranza o dentro de la malezas se debe aplicar Heat® 70 WG en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o Paraquat para ampliar el control de malezas gramíneas ya nacidas. Se recomienda adicionar Prowl® 45.5 CS para dejar un sello preemergente a dosis de 2.0 L/ha (1.4 L/mz) con fines de aumentar la residualidad de control de malezas gramíneas.

APLICACIÓN DENTRO DEL CULTIVO:

Aplicar Heat® 70 WG cuando el maíz tenga más de 75 días de siembra o en Guatemala al momento de la dobla para la preparación de área de segunda siembra de frijol y maíz. La aplicación se realiza de manera general dentro del cultivo en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paraquat con fines de ampliar y mantener buen control durante 30 días de malezas poáceas de reproducción sexual (alturas de 15 a 30 cm), tales como caminadora (*Rottboellia* sp.), plumilla (*Leptochloa filiformis*) y zacate de agua (*Ixophorus unisetus*).

Café <i>Coffea arabica</i>	Bejuco	<i>Ipomoea spp.</i>	50 a 70 gr/ha de Heat® 70 WG (35 a 49 gr/mz de Heat® 70 WG)
	Hierba golondrina	<i>Euphorbia spp.</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus sp</i>	

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	VOLUMEN DE APLICACIÓN	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Fimbristilis, Pelo de chino, Junquillo (<i>Fimbristylis dichotoma</i>)	0,10 – 0,125 Kg/ha	200-300 L/ha. (140-210 L/mz)	Aplicación terrestre. Aplicar en pre-emergencia absoluta al cultivo. No se utilice en arroz inundado. Mezcle con Prowl 45.5 CS para lograr control de poáceas.
	Fimbristilis, Pelo de chino, Junquillo (<i>Fimbristylis littoralis</i>)			
	Eclipta (<i>Eclipta alba</i>)			
	Palo de agua (<i>Ludwigia spp</i>)			

	Oxalis	<i>Oxalis corniculata</i>	utilizar un volumen de agua de 200 L/Ha. (140 L/mz)
	Hierba de pollo, siempre viva	<i>Commelina spp.</i>	
	Cortadera, Paraguas	<i>Cissus spp.</i>	
	Tripa de Gallina	<i>Stigmaphyllon lindenianum</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG Puede ser aplicado sobre malezas de hoja ancha, en post-emergencia temprana. Para mejorar su efectividad y espectro de acción, sobre malezas de hoja ancha y gramíneas, en post-emergencia media y tardía, mezclarlo con Glifosato 35.6 SL en dosis de 534 grs i.a./Ha (373.8 grs i.a./Mz) (1.5 lts/Ha (1.05 lts/Mz)). La mezcla de Heat® 70 WG con Glifosato 35.6 SL, puede ser aplicada en post-emergencia al cultivo, utilizando campana ó boquilla de espuma, para evitar el contacto con las bandolas inferiores (en cafetales jóvenes de 1 a 3 años de transplante).

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	40-50 gramos de Heat® 70 WG /ha (28 a 35 g.i.a./Ha) utilizar un volumen de agua de 200 a 230 L/Ha. (140 a 161L/mz)
	Bejuco	<i>Ipomoea nil</i>	
	Campanilla		
	Hierba de golondrina	<i>Euphorbia sp</i>	
	Meloncillo	<i>Cucumis sp</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus sp</i>	
	Escobilla, escoba	<i>Sida acuta</i>	
	Cabeza de pollo	<i>Chamaecyze spp</i>	
	Mostacilla	<i>Cleome viscosa</i>	
	Flor amarilla	<i>Baltimora recta</i>	
	Botón de oro	<i>Melampodium divaricatum</i>	
		<i>Chenopodium spp</i>	
	Aceitillo	<i>Bidens pilosa</i>	
	Lechuguilla	<i>Sonchus oleraceus</i>	
		<i>Phyllanthus spp</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG debe ser aplicado en preemergencia a la caña, y en pre y post-emergencia temprana a la malezas. Heat® 70 WG es compatible con todos los herbicidas preemergentes utilizados en caña de azúcar. Si existen problemas con las gramíneas de reproducción sexual, aplicarlo, en mezcla con Prowl 45.5 CS en dosis de 2 a 3 L/Ha (1.4 -2.1 l/mz) (en preemergencia a la maleza gramínea). Para aplicaciones en soca debe mezclarse con Plateau 70 WG en total preemergencia de la caña y de la maleza.

APLICACIONES DE CIERRE: Heat® 70 WG es ideal para las aplicaciones de cierre del cultivo, donde se puede combinar con cualquier producto preemergente. Su alta movilidad biológica le permite controlar malezas de tipo veteado sin requerir su aplicación directa sobre el cultivo, con esto se logra disminuir el daño a la caña y la eficiencia en el costo y el rendimiento de la mano de obra.

MINIMA LABRANZA Y RONDAS Y QUINELES: Heat® 70 WG, es ideal para control de las malezas postemergentes en mezcla con Arsenal® 24 SL y Glifosato 35.6 SL, para ampliar el espectro de control (hojas anchas y gramíneas) porque no existe antagonismo debido a los mecanismos de acción totalmente diferentes. Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash® 37.5 EC concentración de 0.5 % v/v.

Cítricos <i>Citrus spp</i>	Conyza	<i>Conyza apurensis</i>	142.86 gramos de Heat® 70 WG / ha (100 g/Mz) utilizar un volumen de agua entre 175 - 286 L/Ha. (122.50 - 200.2 L/mz)
	Hierba de golondrina, Lechosa	<i>Euphorbia hirta</i>	
	Pepperonia	<i>Pepperonia spp</i>	
	Pilea	<i>Pilea spp</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Las aplicaciones Heat® 70 WG van dirigidas a la rodaja dentro de la línea de goteo del árbol evitando aplicar las hojas bajas. En mezcla con una fuente de glifosato a 534 g i.a/ha y Dash® 37.5 EC. El volumen total a utilizar es de 200 litros/ha.

CULTIVO	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN
---------	-------------------	-----------------------------

Papa <i>Solanum tuberosum</i>	35 – 70 gramos de Heat® 70 WG /ha (24.5 – 49 gr/mz) utilizar un volumen de agua de 94 L/Ha.	Realizar una aplicación en pre-cosecha, Volumen de agua de 240-450 L/Ha (168-315 L/mz). No aplicar el producto en papas destinadas a producción de semilla.
----------------------------------	---	---

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	35-71 gramos de Heat® 70 WG /ha (25 a 50 g.i.a./Ha) utilizar un volumen de agua de 200 a 230 lts/Ha. (140 a 161 lts/mz)
	Verdolaga de playa	<i>Kallstroemia maxima</i>	
	Pascuita	<i>Croton lobatus</i>	
	Bejuco	<i>Ipomoea nil</i>	
	Hierba de golondrina	<i>Euphorbia sp</i>	
	Meloncillo	<i>Cucumis sp</i>	
	Bellotía, pepinillo	<i>Momordica charantia</i>	
	Bledo	<i>Amaranthus sp</i>	
	Mozote, moriseco	<i>Bidens pilosa</i>	
	Miltomate de monte	<i>Physalis angulata</i>	
	Culantrillo	<i>Molugo verticillata</i>	
	Escobilla, escoba	<i>Sida acuta</i>	
	Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	
	Botoncillo	<i>Richardia scabra</i>	
	Frijolillo, pega-pega	<i>Desmodium tortuosum</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG debe ser aplicado en preemergencia a la caña, y en pre y post-emergencia temprana a la malezas. Heat® 70 WG es compatible con todos los herbicidas preemergentes utilizados en caña de azúcar.

APLICACIONES DE CIERRE: Heat® 70 WG es ideal para las aplicaciones de cierre del cultivo, donde se puede combinar con cualquier producto preemergente. Su alta movilidad biológica le permite controlar malezas de tipo veteado sin requerir su aplicación directa sobre el cultivo, con esto se logra disminuir el daño a la caña y la eficiencia en el costo y el rendimiento de la mano de obra.

MINIMA LABRANZA Y RONDAS Y QUINELES: Heat® 70 WG, es ideal para control de las malezas postemergentes en mezcla con Arsenal® 24 SL y Glifosato 35.6 SL, para ampliar el espectro de control (hojas anchas y gramíneas) porque no existe antagonismo debido a los mecanismos de acción totalmente diferentes. Para mayor efectividad, utilizar el coadyuvante Dash 37.5 EC, a concentración de 0.5 % v/v.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Fimbristilis	<i>Fimbristylis spp</i>	100 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 300 L/Ha. (210 L/mz)
	Eclipta	<i>Eclipta alba</i>	
	Buche de gallina, lechuga de agua, riñón, oreja de ratón	<i>Heteranthera spp</i>	
	Comelina	<i>Commelina spp</i>	
	Cama de venado, maguey de agua, palo bobo, pega-pega, tamarindillo	<i>Aeschynomene spp</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Después de realizar el trasplante del arroz permita que el suelo preparado elimine el exceso de agua (drenado), una vez alcanzado esto, realice la aplicación de Heat® 70 WG a una dosis de 100 g de producto comercial (70 g la/Ha).

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN ARROZ – SIEMBRA MECANIZADA: Aplicar en pre-emergencia absoluta al cultivo.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA
Maíz <i>Zea mays</i>	HOJA ANCHA: Bledo <i>Amaranthus spinosus</i> Bejuco, campanita <i>Hipomoea spp.</i> Escobilla, escoba <i>Sida acuta</i> Flor amarilla <i>Melampodium divaricatum</i> Hierba de pollo <i>Commelina diffusa</i> Verdolaga de playa <i>Kallstroemia maxima</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Girasol <i>Helianthus annuus</i> Titonia, flor amarilla <i>Tithonia tubaeformis</i> Pica-pica <i>Mucura pruriens</i> Dormilona <i>Mimosa pudica</i> GRAMINEAS: Gramilla, pangola <i>Digitaria sanguinalis</i> Pasto hoduras <i>Ixophorus unisetus</i> Bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Zacate pinto <i>Echinochloa colonum</i> Zacate de agua <i>Echinochloa crus-galli</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i>	35 – 50 g de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 285 L/Ha. (199.5 L/mz)

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN:
PREPARACION DE AREAS DE SIEMBRA:
Aplicar Heat® 70 WG antes de la siembra con el propósito de ampliar el control de las malezas gramíneas.

Si la siembra se realiza en mínima labranza o dentro de las malezas se debe aplicar Heat® 70 WG para ampliar el control de malezas gramíneas ya nacidas.

APLICACIÓN DENTRO DEL CULTIVO:

Aplicar Heat® 70 WG cuando el maíz tenga más de 75 días de siembra o en Guatemala al momento de la doble para la preparación de área de segunda siembra de frijol y maíz. La aplicación se realiza de manera general dentro del cultivo con fines de ampliar y mantener buen control durante 30 días de malezas poáceas de reproducción sexual (alturas de 15 a 30 cm), tales como caminadora (*Rottboellia sp.*), plumilla (*Leptochloa filiformis*) y zacate de agua (*Ixophorus unisetus*).

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Café <i>Coffea arabica</i>	Siempre Viva	<i>Commelina spp</i>	70 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen de agua de 300 L/Ha. (210 L/mz)
	Bejuco	<i>Ipomoea spp</i>	
	Oxalis	<i>Oxalis corniculata</i>	
	Comemano	<i>Cissus spp</i>	
	Tripa de gallina	<i>Stigmaphylon lindenianum</i>	

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Heat® 70 WG puede ser aplicado en malezas de hoja ancha, en emergencia temprana.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS RECOMENDADA
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
Cítricos <i>Citrus spp</i>	Conyza	<i>Conza apurensis</i>	355-0 gramos de Heat® 70 WG /ha utilizar un volumen
	Hierba de golondrina, Lechosa	<i>Euphorbia hirta</i>	

	Pepperonia	<i>Pepperonia spp</i>	de agua de 300 L/Ha. (210 L/mz)
	Pilea	<i>Pilea spp</i>	
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Las aplicaciones de Heat® 70 WG van dirigidas a la rodaja dentro de la línea de goteo del árbol evitando aplicar a las hojas bajas. El volumen			
CULTIVO	MALEZA		DOSIS RECOMENDADA
Papa <i>Solanum Tuberosum</i>	Desecante precosecha		100-150 g/Ha Usar un volumen de agua de 300-400 L/Ha
RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN: Realizar 1 aplicación foliar al menos 14 días antes de la cosecha,			

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplicar Heat® 70 WG antes de la siembra en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o paracuat con el propósito de ampliar el control de las malezas gramíneas.

Si la siembra se realiza en mínima labranza o dentro de la maleza se debe aplicar Heat® 70 WG en mezcla con glifosato, glufosinato de amonio y/o Paracuat para ampliar el control de malezas gramíneas ya nacidas. Se recomienda adicionar Prowl® 45.5 SC para dejar un sello preemergente a dosis de 2.0 L/ha (1.4 L/mz) con fines de aumentar la residualidad de control de malezas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Arroz, café, papa, caña, maíz y cítricos: No aplica, el Heat® 70 WG se aplica pre-emergente al cultivo cuando se utiliza en post-emergencia no entra en contacto directo con los frutos (cítricos).

Palma aceitera: 15 días.

Para Costa Rica: Arroz: No aplica, el Heat® 70 WG se aplica antes de la siembra. Naranja: 1 aplicación Post-emergencia cuando la maleza tenga de 10 a 20 cm, el producto no debe entrar en contacto directo con los frutos (cítricos)

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que el producto sobre la superficie tratada haya secado.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y bajo las recomendaciones dados en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: No se ha demostrado la incompatibilidad de Heat 70 WG con otros productos. No debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina. Verifique la compatibilidad con otros productos antes de realizar mezclas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene Heat 70 WG, junto con alimentos para humanos, ni animales, medicinas, ropa, artículos de uso doméstico o fertilizantes. Estable bajo condiciones normales. Almacenar el producto en su recipiente original en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de las fuentes de ignición, el calor, las llamas o cargas electrostáticas. Almacene protegido de la luz solar. Evite la formación y deposición de polvo. El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Proteja de temperaturas superiores a los 40 °C. Puede almacenarse por un periodo de 24 meses. Manéjelo con cuidado para evitar que se derrame, si esto sucede cubra el producto derramado con aserrín o tierra y luego maneje los desechos según la legislación nacional. No existe riesgo de explosión, no es inflamable, ni corrosivo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No se conocen síntomas de intoxicación en humanos. Por inhalación y contacto puede irritar los ojos y la piel. Es nocivo por ingestión. Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito ni suministre algo por la boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Lave inmediatamente la boca y de a beber abundante agua. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua limpia de 15 a 20 minutos y los párpados abiertos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	(502) 2251-3560/ 2232-0735
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	(504) 2232-2322 (505) 2289-4700 ext. 1294/ Mobile: 8755-0983
NICARAGUA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
COSTA RICA	Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	(507) 523-4948
PANAMÁ	Hospital Dr. Luis Aybar	
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco Moscoso P.	(+1) 681-7828

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

NO PERSISTENTE EN SUELO Y AGUA.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor o desechar según la legislación nacional. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, deseche las bolsas/envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue ésta al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. Los residuos del producto y su bolsa/envase deben eliminarse con

todas las precauciones posibles, según manejo y desecho de residuos peligrosos.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADO POR:

BASF Agricultural Products de Puerto Rico, State Road #2 Km 47.2, Manatí, Puerto Rico 00674, Estados Unidos de Norteamérica. Teléfono: (787) 621-1700, Fax: (787) 621-1670. global.info@basf.com.

IMPORTADOR:

GUATEMALA:	BASF Guatemala Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala. Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698
COSTA RICA:	BASF Costa Rica S. A. Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221
EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER), Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A. DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. EL SURCO SA DE CV. 4ª. Avenida sur y calle Daniel Hernández No. 2-9 B, Santa Tecla
República Dominicana	BASF Dominicana S.A. Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio Rogama, 3er piso En sanche Naco, Santo Domingo. Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027.

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Belice	0353-1
Costa Rica	5348
El Salvador	AG.2013-01-0943
Guatemala	78-125
Honduras	745-185-I
Nicaragua	BA-001-6-2009
Panamá	6105ab
República Dominicana	3541

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN
Fitosanitario del Estado
COSTA RICA

APROBADO

* 13 OCT. 2023 *

FUNCIONARIO: *Andrés Barrantes Salas*

FIRMA: *Andrés Barrantes Salas*